

BEST AVAILABLE COPY

PCT/JP00/05636

日 本 国 特 許 庁

23.08.00

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:


1999年10月22日

出 願 番 号
Application Number:

平成11年特許願第338334号

出 願 人
Applicant (s):

中外製薬株式会社



4


**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 9月29日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3078757

【書類名】 特許願

【整理番号】 P11-2513

【提出日】 平成11年10月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 A61K 31/565
C07C 13/10
C07C 13/18

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県御殿場市駒門1丁目135番地 中外製薬株式会
社内

【氏名】 海宝 晋一

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県御殿場市駒門1丁目135番地 中外製薬株式会
社内

【氏名】 大泉 徹雄

【発明者】

【住所又は居所】 東京都北区浮間5丁目5番1号 中外製薬株式会社内

【氏名】 田村 邦雄

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県御殿場市駒門1丁目135番地 中外製薬株式会
社内

【氏名】 加藤 伸明

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県御殿場市駒門1丁目135番地 中外製薬株式会
社内

【氏名】 米屋 孝明

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県御殿場市駒門1丁目135番地 中外製薬株式会
社内

【氏名】 橘 一生

【特許出願人】

【識別番号】 000003311

【氏名又は名称】 中外製薬株式会社

【代表者】 永山 治

【連絡先】 中外製薬株式会社 知的財産部

【電話番号】 03(3273)1139

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成11年特許願第274956号

【出願日】 平成11年 8月23日

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1


【書類名】 明細書

【発明の名称】 抗アンドロゲン剤


【特許請求の範囲】

【請求項 1】 一般式 (I)

【化 1】



【式中、 X^1 及び X^2 は、独立して水素原子、又は一般式 (II)



で表される基を示し、 R^a は、水素原子又は水酸基の保護基を示し、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒に、保護されていて、 $-(C=O)-$ を示し、破線は、実線と共に、単結合又は二重結合を形成していることを示す。


更に、 Ar は、単結合又は芳香族炭化水素基を示し、 A は、メチレン基又は $-O-$ を示し、 R^1 は、置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいアルケニル基、又は置換されていてもよいアルキニル基を示す。

ただし、 X^1 及び X^2 は、同時に水素原子であることはない。]

で表される化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項 2】 R^1 が、 R^{1a}


【ここで、 R^{1a} は、一般式 (III)























【式中、 G は、置換されていてもよい炭素数 2~30 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキレン基、置換されていてもよい炭素数 2~30 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニレン基、又は置換されていてもよい炭素数 2~30 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニレン基を示し、 E は、単結合又は $-O-$ を示し、 J は、単結合、置換されていてもよい芳香族炭化水素基、又は置換されていてもよい複素環基を示し、 Y は、単結合又は $-O-$ を示し、 L は、単結合、炭素数 1~10 の直鎖

もしくは分岐鎖状のアルキレン基、炭素数 2 ～ 1 0 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニレン基、又は炭素数 2 ～ 1 0 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニレン基を示し、Q は、単結合、又は下記式：

【化 2】




【化 3】



、及び

【化 4】



(ここで、 R^7 は、水素原子、又は炭素数 1～6 の直鎖もしくは分岐鎖状の低級アルキル基を示し、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、及び R^{11} は、それぞれ独立して、水素原子、又は炭素数 1～3 の直鎖もしくは分岐鎖状の低級アルキル基を示す。)
 から選択される 1 つの基を示し、Z は、水素原子、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数 1～10 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数 2～10 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニル基、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数 2～10 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニル基、 $-O-R^d$ (ここで、 R^d は、水素原子、又は水酸基の保護基を

示す)、又は -COOH を示す。)を示す。}]

で表される、請求項1記載の化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項3】 Q が、 Q^2 [ここで、 Q^2 は、単結合、 Q^{62} 、 Q^{63} 、 Q^{64} 、 Q^3 (更にここで、 R^8 は、前記と同義である。)、 Q^4 (更にここで、 R^8 は、前記と同義である。)、 Q^{17} (更にここで、 R^7 は、前記と同義である。)、 Q^{32} (更にここで、 R^7 は、前記と同義である。)、又は Q^{27} (更にここで、 R^7 は、前記と同義である。)]を示す。]である、請求項1又は2記載の化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項4】 X^1 が -Ar-A-R^1 (式中、 Ar 、 A 及び R^1 は前記と同義である)であり、かつ、 X^2 が水素原子である、請求項1～3のいずれか1項記載の化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項5】 X^1 が水素原子であり、かつ、 X^2 が -Ar-A-R^1 (式中、 Ar 、 A 及び R^1 は前記と同義である)である、請求項1～3のいずれか1項記載の化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項6】破線が、実線と共に、単結合を形成している、請求項1～5のいずれか1項記載の化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項7】11位の X^1 の立体配置が、 β 配置である、請求項1又は2又は3又は4又は6記載の化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項8】7位の X^2 の立体配置が、 α 配置である、請求項1又は2又は3又は5又は6記載の化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項9】 Z が、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数1～10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基である、請求項1～8のいずれか1項記載の化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項10】 Z が、4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチル基である、請求項9記載の化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

グ。

【請求項 11】 J が、単結合である、請求項 1～10 のいずれか 1 項記載の化合物その薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項 12】 Ar が、単結合である、請求項 1～11 のいずれか 1 項記載の化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項 13】 A が、メチレン基である、請求項 1～12 のいずれか 1 項記載の化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項 14】 Q が、 Q^{62} 、 Q^{63} 、又は Q^{64} である、請求項 1～13 のいずれか 1 項記載の化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項 15】 Q が、 R^8 が水素原子である Q^3 、又は R^8 が水素原子である Q^4 である、請求項 1～13 のいずれか 1 項記載の化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項 16】 Q が、 R^7 が水素原子である Q^{17} 、 R^7 が水素原子である Q^3 、又は R^7 が水素原子である Q^{27} である、請求項 1～13 のいずれか 1 項記載の化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項 17】 Ar が、芳香族炭化水素基であり、かつ A が、 $-O-$ である、請求項 1～11 のいずれか 1 項記載の化合物その薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項 18】 G が、置換されていてもよい炭素数 2～15 の直鎖状のアルキレン基である、請求項 1～17 のいずれか 1 項記載の化合物その薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項 19】 G が、置換されていてもよい炭素数 2～13 の直鎖状のアルキレン基である、請求項 18 記載の化合物その薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【請求項 20】 17β -ヒドロキシ- 11β -{ $10-(4, 4, 5, 5, 5$ -ペンタフルオロペンチルスルフィニル) デシル} アンドロスタン-3-オン;
 17β -ヒドロキシ- 11β -{ $11-(4, 4, 5, 5, 5$ -ペンタフルオロペンチルスルフィニル) ウンデシル} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{12-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル) ドデシル} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{10-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルホニル) デシル} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{11-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルホニル) ウンデシル} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{12-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルホニル) ドデシル} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[10-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチル) アミノカルボニル} デシル] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[11-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチル) アミノカルボニル} ウンデシル] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[9-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペンタフルオロヘキサノイル) アミノ} ノニル] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[10-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペンタフルオロヘキサノイル) アミノ} デシル] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{9-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル) ノニルオキシ} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{10-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル) デシルオキシ} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{11-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル) ウンデシルオキシ} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{9-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルホニル) ノニルオキシ} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{10-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルホニル) デシルオキシ} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{11-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルホニル) ウンデシルオキシ} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[9-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル

オロペンチル) アミノカルボニル} ノニルオキシ] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[10-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
オロペンチル) アミノカルボニル} デシルオキシ] アンドロスタン-3-オン

;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[8-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペンタフル
オロヘキサノイル) アミノ} オクチルオキシ] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[9-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペンタフル
オロヘキサノイル) アミノ} ノニルオキシ] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[4-{8-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
オロペンチルスルフィニル) オクチルオキシ} フェニル] アンドロスタン-3-
オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[4-{9-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
オロペンチルスルフィニル) ノニルオキシ} フェニル] アンドロスタン-3-オ
ン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[4-{8-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
オロペンチルスルホニル) オクチルオキシ} フェニル] アンドロスタン-3-オ
ン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[4-{9-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
オロペンチルスルホニル) ノニルオキシ} フェニル] アンドロスタン-3-オン

17 β -ヒドロキシ-11 β -(4-[8-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペン
タフルオロペンチル) アミノカルボニル} オクチルオキシ] フェニル) アンドロ
スタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(4-[9-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペン
タフルオロペンチル) アミノカルボニル} ノニルオキシ] フェニル) アンドロス
タン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(4-[7-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペン
タフルオロヘキサノイル) アミノ} ヘプチルオキシ] フェニル) アンドロスタン
-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(4-[8-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペン

タフルオロヘキサノイル) アミノ} オクチルオキシ] フェニル) アンドロスタン
-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(6-[4-{N-(4,4,5,5,5-ペン
タフルオロペンチル) アミノカルボニル} フェニル] ヘキシル) アンドロスタン
-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(5-[4-{N-(4,4,5,5,5-ペン
タフルオロペンチル) アミノカルボニル} フェニル] ペンチルオキシ) アンドロ
スタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -トリデシルオキシアンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(11-カルボキシ-15,15,16,16,
16-ペンタフルオロヘキサデシル) アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[4-{ {2-ヒドロキシ-3-(4,4,5,
5,5-ペンタフルオロペンチルスルフィニルエチルオキシ) プロピル} オキシ
} フェニル] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(4-ヒドロキシ-9-(4,4,5,5,5-
ペンタフルオロペンチルスルフィニル) ノニル) アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(10-カルボキシ-14,14,15,15,
15-ペンタフルオロペンタデシルオキシ) アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(9-カルボキシ-13,13,14,14,1
4-ペンタフルオロテトラデシルオキシ) アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(6-カルボキシ-10,10,11,11,1
1-ペンタフルオロウンデシル) アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(10-カルボキシ-14,14,15,15,
15-ペンタフルオロペンタデシル) アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(14-カルボキシ-18,18,19,19,
19-ペンタフルオロノナデシル) アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(9-カルボキシノニルオキシ) アンドロスタン
-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(6-カルボキシヘキシル) アンドロスタン-3

－オン；

1 7 β －ヒドロキシ－1 1 β －（1 0－カルボキシデシル）アンドロスタン－3
－オン；

1 7 β －ヒドロキシ－1 1 β －（1 4－カルボキシテトラデシル）アンドロスタ
ン－3－オン；

1 7 β －ヒドロキシ－1 1 β －[3－{4－（4－カルボキシブチル）フェニル
} プロピル] アンドロスタン－3－オン；

1 7 β －ヒドロキシ－1 1 β －[3－{4－（4－カルボキシ－8, 8, 9, 9
, 9－ペンタフルオロノニル）フェニル} プロピル] アンドロスタン－3－オン

1 7 β －ヒドロキシ－1 1 β －{5－（4, 4, 5, 5, 5－ペンタフルオロペ
ンチルスルフィニル）ペンチル} アンドロスタン－3－オン；

1 7 β －ヒドロキシ－1 1 β －{9－（4, 4, 5, 5, 5－ペンタフルオロペ
ンチルスルフィニル）ノニル} アンドロスタン－3－オン；

1 7 β －ヒドロキシ－1 1 β －{1 3－（4, 4, 5, 5, 5－ペンタフルオロ
ペンチルスルフィニル）トリデシル} アンドロスタン－3－オン；

1 7 β －ヒドロキシ－1 1 β －{4－ヒドロキシ－1 0－（4, 4, 5, 5, 5
－ペンタフルオロペンチルスルフィニル）デシル} アンドロスタン－3－オン；

1 7 β －ヒドロキシ－1 1 β －（4－ヒドロキシ－1 5, 1 5, 1 6, 1 6, 1
6－ペンタフルオロヘキサデデシル）アンドロスタン－3－オン；

1 7 β －ヒドロキシ－1 1 β －[9－{N－（4, 4, 5, 5, 5－ペンタフル
オロペンチル）アミノカルボニル} ノニル] アンドロスタン－3－オン；

及び1 7 β －ヒドロキシ－1 1 β －[8－{N－（5, 5, 6, 6, 6－ペンタ
フルオロヘキサノイル）アミノ} オクチル] アンドロスタン－3－オンから選択
される請求項 1～3 のいずれか 1 項記載の化合物その薬学上許容しうる塩あるい
はそれらのプロドラッグ。

【請求項 2 1】 アンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、かつ
アゴニストとして作用しない物質又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらの
プロドラッグ。

【請求項 2 2】 請求項 1～2 1 のいずれか 1 項記載の化合物もしくは物質又はそ

これらの薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグを有効成分として含有する医薬組成物。

【請求項 23】 請求項 1～21 のいずれか 1 項記載の化合物もしくは物質又はこれらの薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグを有効成分として含有する抗アンドロゲン剤。

【請求項 24】 請求項 1～21 のいずれか 1 項記載の化合物もしくは物質又はこれらの薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグを有効成分として含有する、前立腺癌、前立腺肥大症、男性型脱毛症、性的早熟、尋常性座瘡、脂漏症及び多毛症から選択される疾患の予防もしくは治療剤。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、7 位もしくは 11 位に種々の置換基を有するアンドロスタン誘導体；アンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、かつアゴニストとして作用しない物質；及び上記アンドロスタン誘導体及び上記物質を含む医薬に関する。

【0002】

【従来の技術】

これまでに、前立腺癌、前立腺肥大症、男性型脱毛症、性的早熟、尋常性座瘡、脂漏症及び多毛症と男性ホルモンであるアンドロゲンとが深く関わっていることが知られてきている。例えば、去勢された人や性腺不全症の人には前立腺癌、及び前立腺肥大症がほとんどみられないことが知られている。

すでに抗アンドロゲン剤、すなわちアンドロゲン受容体のアンタゴニストとして、例えば、酢酸シプロテロン、酢酸クロルマジノン、フルタミド、ピカルタミドなどが用いられている。酢酸シプロテロンは、十代の人の座瘡の進行や禿頭の発生を抑制することが知られている。また、酢酸シプロテロンは、女性においては、男性化と脱毛症の治療に用いられている。フルタミド、ピカルタミドは、前立腺癌治療薬として使用されている。

【0003】

これらの抗アンドロゲン剤は、前立腺癌における薬物治療を始めとする多くの例で奏効し、有効な治療剤の一つとなっているが、問題点の1つとして、抗アンドロゲン剤が奏効しても2年から5年後にはほとんどの場合再発症してしまうこと、つまりアンドロゲン抵抗性になってしまうことが知られている。

ところで、最近、フルタミドの活性本体のヒドロキシフルタミドが $10\mu\text{mol/L}$ の濃度で、アンドロゲンレセプターの転写活性を上昇させることが報告された。またフルタミドで治療を受けている前立腺癌患者のヒドロキシフルタミドの血中濃度は数 $\mu\text{mol/L}$ で、この濃度は、上記の報告によると、アゴニスト作用を示す濃度である（J. Biol. Chem., vol. 270, 1998-2003, 1995を参照）。また、去勢ラットに酢酸シプロテロン及び酢酸クロルマジノンと2週間連続投与すると、前立腺重量が増加することが報告されている（日内分泌会誌、vol. 66 597-606, 1990）。また、フルタミド及びピカルタミドについては、肝毒性などの副作用の報告例もある。

【0004】

一方、核内受容体に対して、アンタゴニストとして作用し、かつアゴニストとして作用しない物質、すなわち完全に受容体の働きを阻害できる物質、いわゆる純アンタゴニストは、エストロゲン受容体について知られている（WO98/25916号公報、ヨーロッパ特許公開0138504号公報、米国特許4,659,516号公報及びCancer Res., 1991, 51, 3867等を参照）。また、核内受容体のホルモン結合ドメインの分子構造は、X線結晶構造解析等により、RXR (retinoid-X receptor)、RAR (retinoic acid receptor) などで明らかになってきている（例えば、Nature, vol. 375, 377-382, 1995等を参照）。

WO97/49709には、非ステロイド型の4環系化合物であるアンドロゲン受容体調節剤が開示されている。

7位にアミノカルボニルアルキル基又は17位にアミノカルボニルアルキル基を有するステロイド化合物としては、WO91/00732号公報記載のもの

が知られている。

11位に芳香環又はアルキルオキシ基を有するステロイド化合物としては、例えばWO95/17192号公報記載の、RU486が、多剤耐性の改善剤として知られている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の一つの目的は、7位もしくは11位に種々の置換基を有するアンドロスタン誘導体又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグを提供することである。

本発明の別の目的は、アンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、かつアゴニストとして作用しない物質又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグを提供することである。

本発明のさらに別の目的は、上記アンドロスタン誘導体を含む医薬及び上記物質を含む医薬を提供することである。

【0006】

【発明を解決するための手段】

本発明者は、上記課題を解決することを目的として、従来知られたアンドロゲン受容体のアンタゴニストの、アンドロゲン抵抗性及び前立腺重量の増加などの副作用は、該アンタゴニストが有するアゴニスト作用によりアンドロゲン応答性の細胞（前立腺細胞等）が増殖することが、原因の1つであると推定し、アンドロゲン受容体に対してアゴニストとして作用しないアンタゴニスト、すなわちアンドロゲン受容体に対する純アンタゴニストを見いだせば、長期投与によるアンドロゲン抵抗性の発現や肝毒性などの副作用を示さない抗アンドロゲン剤を見いだすことができると期待し、該アンタゴニストの設計に着手した。第1に、既存のRXR, RAR等の核内受容体からアンドロゲン受容体を、Homology (MSI社)、Look (MAG社)等のソフトウェアを用いるホモロジー法でモデリングし、第2に、アンドロゲン受容体における純アンタゴニストを、テストステロン及び／又はジヒドロテストステロンをリガンドとして用い、得られた該リガンドとアンドロゲン受容体との複合体モデルを利用して、適当な位置に


、受容体との相互作用を形成する、適当な長さの官能基を有する側鎖を導入することにより設計すれば、アンドロゲン受容体に対する純アンタゴニストであると期待できる物質もしくは化合物、及び／又は、肝毒性等の副作用が軽減された抗アンドロゲン剤が設計できることを見だし、本発明を完成するに至った。

【0007】

本発明の第1の側面によれば、一般式（I）

【0008】

【化5】



【0009】

[式中、 X^1 及び X^2 は、独立して水素原子、又は一般式（II）



で表される基を示し、 R^a は、水素原子又は水酸基の保護基を示し、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって、保護されていてもよい $-(C=O)-$ を示し、破線は、実線と共に、単結合又は二重結合を形成していることを示す。

更に、 Ar は、単結合又は芳香族炭化水素基を示し、 A は、メチレン基又は $-O-$ を示し、 R^1 は、置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいアルケニル基、又は置換されていてもよいアルキニル基を示す。

ただし、 X^1 及び X^2 は、同時に水素原子であることはない。]

で表される化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグが提供される。

本発明の第2の側面によれば、アンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、かつアゴニストとして作用しない物質又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグが提供される。

本発明の第3の側面によれば、一般式（I）で表される化合物を含む医薬、及

び、アンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、かつアゴニストとして作用しない物質を含む医薬が提供される。

【0010】

本明細書において、炭素数1～3の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基としては、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、及び*i*-プロピル基が挙げられる。

また、炭素数1～6の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基としては、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、*i*-プロピル基、*n*-ブチル基、*s*-ブチル基、*i*-ブチル基、*t*-ブチル基、*n*-ペンチル基、3-メチルブチル基、2-メチルブチル基、1-メチルブチル基、1-エチルプロピル基、及び*n*-ヘキシル基等が挙げられる。

本明細書において、 ω 位とは、2価基における、1位とは異なる、もう1つの末端位を意味する。例えば、ヘキサン-1, 6-ジイル基において、 ω 位は6位である。

本明細書において、単結合とは、該基が存在せず、該基の両隣の基が、直接単結合を形成していることを意味する。例えば、一般式(II)で表される基において、Arが単結合であるとは、一般式(I)で表される化合物におけるステロイド環の7位及び／又は11位とAとが直接単結合を形成していることを示す。

本明細書において、破線は、実線と共に、単結合又は二重結合を形成しているとは、例えば、一般式(I)で表される化合物において、破線が存在するステロイド環の4位と5位の間の結合が、単結合又は二重結合であることを意味する。後述する、A法における化合物(2)においても、破線が存在するステロイド環の5位と6位の間の結合が、単結合又は二重結合であることを意味する。

【0011】

一般式(I)で表される化合物の定義において、 X^1 及び X^2 は、独立して水素原子、又は一般式(II)



(ここで、更に、Arは、単結合又は芳香族炭化水素基を示し、Aは、メチレン基又は-O-を示し、 R^1 は、置換基されていてもよいアルキル基、置換基されていてもよいアルケニル基、又は置換基されていてもよいアルキニル基を示す

。)

で表される基を示すが、好ましくは、 X^1 が $-Ar-A-R^1$ (式中、 Ar 、 A 及び R^1 は前記と同義である) であり、かつ、 X^2 が水素原子である場合、及び X^1 が水素原子であり、かつ、 X^2 が $-Ar-A-R^1$ (式中、 Ar 、 A 及び R^1 は前記と同義である) である場合が挙げられる。さらに、ステロイド環の 1 位の X^1 の立体配置が、 β 配置であるもの、及び 7 位の X^2 の立体配置が、 α 配置であるものが好ましい。ただし、 X^1 及び X^2 は、同時に水素原子であることはない。

【0012】

R^a は、水素原子又は水酸基の保護基を示すが、好ましくは水素原子を示す。水酸基の保護基としては、ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、イソバレリル基、ピバロイル基、カプロイル基、トリフルオロアセチル基、及びベンゾイル基等のアシル基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、アリルオキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基、及びフェノキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル基、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリイソプロピルシリル基、ジメチルイソプロピルシリル基、ジエチルイソプロピルシリル基、ジメチルテキシルシリル基、 t -ブチルジメチルシリル基、 t -ブチルジフェニルシリル基、トリベンジルシリル基、トリ- p -キシリルシリル基、トリフェニルシリル基、ジフェニルメチルシリル基、及び t -ブチルメトキシフェニルシリル基等の置換シリル基、メトキシメチル基、メトキシエトキシメチル基、メチルチオメチル基、 t -ブチルチオメチル基、 β -トリクロロエチルオキシメチル基、トリメチルシリルエトキシメチル基、 p -メトキシベンジルオキシメチル基、及び p -クロロベンジルオキシメチル基等の置換メチル基、テトラヒドロフラリル、及びテトラヒドロピラニル基等の 2-オキサシクロアルキル基、並びにベンジル基等のアラルキル基が挙げられる。中でもトリメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリイソプロピルシリル基、ジメチルイソプロピルシリル基、ジエチルイソプロピルシリル基、ジメチルテキシルシリル基、 t -ブチルジメチルシリル基、 t -ブチルジフェニルシリル基、トリベン

ジルシリル基、トリ-p-キシリルシリル基、トリフェニルシリル基、ジフェニルメチルシリル基、及びt-ブチルメトキシフェニルシリル基等の置換シリル基、並びにメトキシメチル基、メトキシエトキシメチル基、メチルチオメチル基、t-ブチルチオメチル基、 β -トリクロロエチルオキシメチル基、トリメチルシリルエトキシメチル基、p-メトキシベンジルオキシメチル基、及びp-クロロベンジルオキシメチル基等の置換メチル基が好ましく、t-ブチルジメチルシリル基及びメトキシメチル基が特に好ましい。

【0013】

R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって、保護されていてもよい $-(C=O)-$ を示すが、好ましくは $-(C=O)-$ を示す。保護されている $-(C=O)-$ としては、ジメトキシメチレン、ビス(2, 2, 2-トリクロロエチルオキシ)メチレン、ジベンジルメチレン、ビス(2-ニトロベンジルオキシ)メチレン、ビス(アセチルオキシ)メチレン、ビス(メチルチオ)メチレン、ビス(エチルチオ)メチレン、ビス(プロピルチオ)メチレン、ビス(ブチルチオ)メチレン、ビス(フェニルチオ)メチレン、ビス(ベンジルチオ)メチレン、ビス(アセチルチオ)メチレン、トリメチルシリルオキシメチルチオメチレン、トリメチルシリルオキシエチルチオメチレン、トリメチルシリルオキシフェニルチオメチレン、メチルオキシメチルチオメチレン、メチルオキシフェニルチオメチレン、メチルオキシ-2-(メチルチオ)エチルチオメチレン、ビス(メチルセレネニル)メチレン、及びビス(フェニルセレネニル)メチレン等の非環状であるアセタールもしくはケタール、並びに1, 3-ジオキサン、5, 5-ジブromo-1, 3-ジオキサン、5-(2-ピリジル)-1, 3-ジオキサン、1, 3-ジオキソラン、4-bromoメチル-1, 3-ジオキソラン、4-(3-ブテニル)-1, 3-ジオキソラン、4-フェニル-1, 3-ジオキソラン、4-(2-ニトロフェニル)-1, 3-ジオキソラン、4, 5-ジメトキシメチル-1, 3-ジオキソラン、1, 5-ジヒドロ-3H-2, 4-ベンゾジオキセピン、1, 3-ジチアン、1, 3-ジチオラン、1, 5-ジヒドロ-3H-2, 4-ベンゾジチエピン、1, 3-オキサチオラン等の環状であるアセタールもしくはケタールを挙げることができるが、好ましくは1, 3-ジオキサ

ン、1, 3-ジオキソラン、及び1, 3-ジチアン等が挙げられ、特に好ましくは1, 3-ジオキソラン等が挙げられる。

【0014】

破線は、実線と共に、単結合又は二重結合を形成していること、すなわち、ステロイド環の4位と5位との間の結合としては、単結合及び二重結合が挙げられることを示すが、好ましくは単結合を形成していることを示す。破線が実線と共に、単結合を形成する場合は、ステロイド環の5位の水素原子は α 配置であるのが好ましい。

【0015】

一般式(II)で表される基において、Arは、単結合又は芳香族炭化水素基を示すが、単結合であるのが好ましい。

Arにおける芳香族炭化水素基の、芳香族炭化水素環としては、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、ナフタセン環、ペンタセン環、ヘキサセン環、フェナントレン環、トリフェニレン環、ピレン環、クリセン環、ピセン環、ペリレン環、ペンタフェン環、コロネン環、ヘプタフェン環、ピラントレン環、及びオバレン環等が挙げられるが、好ましくはベンゼン環が挙げられる。Arにおける芳香族炭化水素基は、これらの芳香族炭化水素環中の、異なる2つの位置に、1個ずつ結合手を有する基を意味するが、好ましくは、p-フェニレン基が挙げられる。

Aは、メチレン基又は-O-を示すが、メチレン基であるのが好ましい。中でも、Arが単結合であり、かつAがメチレン基であるのが更に好ましい。

また、Arが芳香族炭化水素基である場合は、Aが-O-であるのが好ましい。

【0016】

R^1 は、置換基されていてもよいアルキル基、置換基されていてもよいアルケニル基、又は置換基されていてもよいアルキニル基を示すが、好ましくは、 R^{1a} は、 R^{1a}
























[ここで、 R^{1a} は、一般式(III)



{式中、Gは、置換されていてもよい炭素数2～30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキレン基、置換されていてもよい炭素数2～30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニレン基、又は置換されていてもよい炭素数2～30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニレン基を示し、Eは、単結合又は-O-を示し、Jは、単結合、置換されていてもよい芳香族炭化水素基、又は置換されていてもよい複素環基を示し、Yは、単結合又は-O-を示し、Lは、単結合、炭素数1～10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキレン基、炭素数2～10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニレン基、又は炭素数2～10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニレン基を示し、Qは、単結合、又は下記式：

【0 0 1 7】





















【化 6】



【0 0 1 8】

【0 0 1 9】

【化 7】




【0020】

、及び

【0021】

【化 8】



【0022】

(ここで、 R^7 は、水素原子、又は炭素数 1～6 の直鎖もしくは分岐鎖状の低級アルキル基を示し、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、及び R^{11} は、それぞれ独立して、水素原子、又は炭素数 1～3 の直鎖もしくは分岐鎖状の低級アルキル基を示す。) から選択される 1 つの基を示し、Z は、水素原子、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数 1～10 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数 2～10 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニル基、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数 2～10 の直鎖もしくは分岐鎖状の

アルキニル基、 $-O-R^d$ (ここで、 R^d は、水素原子、又は水酸基の保護基を示す)、又は $-COOH$ を示す。)を示す。)] である。

【0023】

Gにおける、置換されていてもよい炭素数2～30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキレン基、置換されていてもよい炭素数2～30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニレン基、及び置換されていてもよい炭素数2～30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニレン基の置換基としては、 $-(CH_2)_m-COOR^{7a}$ 、 $-(CH_2)_p-CONR^{8a}R^{9a}$ 、 $-NR^{8b}R^{9b}$ 、水酸基、及びオキソ基等が挙げられる。ここで、m及びpは、独立して、0又は1を示し、 R^{7a} は、水素原子、又は炭素数1～6の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基を示し、 R^{8a} 、 R^{9a} 、 R^{8b} 、及び R^{9b} は、それぞれ独立して、水素原子、又は炭素数1～3の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基を示す。また、この置換基は、存在しないか又は水酸基であるのが好ましく、存在しないのが特に好ましい。なお、Gが置換されている場合、この置換基の数は、1個～4個であり、好ましくは1個である。

【0024】

Gにおける、置換されていてもよい炭素数2～30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキレン基の、炭素数2～30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキレン基としては、エタン-1，2-ジイル基、プロパン-1，3-ジイル基、ブタン-1，4-ジイル基、ペンタン-1，5-ジイル基、ヘキサン-1，6-ジイル基、ヘプタン-1，7-ジイル基、オクタン-1，8-ジイル基、ノナン-1，9-ジイル基、デカン-1，10-ジイル基、ウンデカン-1，11-ジイル基、ドデカン-1，12-ジイル基、トリデカン-1，13-ジイル基、テトラデカン-1，14-ジイル基、ペンタデカン-1，15-ジイル基、ヘキサデカン-1，16-ジイル基、ヘプタデカン-1，17-ジイル基、オクタデカン-1，18-ジイル基、ノナデカン-1，19-ジイル基、イコサン-1，20-ジイル基、ヘニコサン-1，21-ジイル基、ドコサン-1，22-ジイル基、トリコサン-1，23-ジイル基、テトラコサン-1，24-ジイル基、ペンタコサン-1，25-ジイル基、ヘキサコサン-1，26-ジイル基、ヘプタコサン-1，2

7-ジイル基、オクタコサン-1, 28-ジイル基、ノナコサン-1, 29-ジイル基、及びトリアコンタン-1, 30-ジイル基である直鎖状のアルキレン基

【0025】

並びに2-メチルプロパン-1, 3-ジイル基、2-メチルブタン-1, 4-ジイル基、3-メチルブタン-1, 4-ジイル基、2, 3-ジメチルブタン-1, 4-ジイル基、2-メチルペンタン-1, 5-ジイル基、3-メチルペンタン-1, 5-ジイル基、4-メチルペンタン-1, 5-ジイル基、2, 3-ジメチルペンタン-1, 5-ジイル基、2, 4-ジメチルペンタン-1, 5-ジイル基、3, 3-ジメチルペンタン-1, 5-ジイル基、3, 4-ジメチルペンタン-1, 5-ジイル基、2, 3, 4-トリメチルペンタン-1, 5-ジイル基、3-エチルペンタン-1, 5-ジイル基、3-エチル-2-メチルペンタン-1, 5-ジイル基、3-エチル-4-メチルペンタン-1, 5-ジイル基、2, 4-ジメチル-3-エチルペンタン-1, 5-ジイル基、2-メチルヘキサン-1, 6-ジイル基、3-メチルヘキサン-1, 6-ジイル基、4-メチルヘキサン-1, 6-ジイル基、5-メチルヘキサン-1, 6-ジイル基、2, 3-ジメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、2, 4-ジメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、2, 5-ジメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、3, 3-ジメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、3, 4-ジメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、3, 5-ジメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、4, 4-ジメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、4, 5-ジメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、2, 3, 3-トリメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、2, 3, 4-トリメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、2, 3, 5-トリメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、2, 4, 4-トリメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、2, 4, 5-トリメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、3, 3, 4-トリメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、3, 3, 5-トリメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、3, 4, 5-トリメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、4, 4, 5-トリメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、2, 3, 4, 5-テトラメチルヘキサン-1, 6-ジイル基、3-エチルヘキサン-1, 6-ジイル基、4-エチルヘキサン-1, 6-ジイル基、3-エチル-2-メチル

ヘキサン-1, 6-ジイル基、3-エチル-4-メチルヘキサン-1, 6-ジイル基、3-エチル-5-メチルヘキサン-1, 6-ジイル基、4-エチル-2-メチルヘキサン-1, 6-ジイル基、4-エチル-3-メチルヘキサン-1, 6-ジイル基、4-エチル-5-メチルヘキサン-1, 6-ジイル基、2, 4-ジメチル-3-エチルヘキサン-1, 6-ジイル基、2, 5-ジメチル-3-エチルヘキサン-1, 6-ジイル基、4, 5-ジメチル-3-エチルヘキサン-1, 6-ジイル基、2, 3-ジメチル-4-エチルヘキサン-1, 6-ジイル基、2, 5-ジメチル-4-エチルヘキサン-1, 6-ジイル基、3, 5-ジメチル-4-エチルヘキサン-1, 6-ジイル基、3, 4-ジエチルヘキサン-1, 6-ジイル基、

【0026】

2-メチルヘプタン-1, 7-ジイル基、3-メチルヘプタン-1, 7-ジイル基、4-メチルヘプタン-1, 7-ジイル基、5-メチルヘプタン-1, 7-ジイル基、6-メチルヘプタン-1, 7-ジイル基、2, 3-ジメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、2, 4-ジメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、2, 5-ジメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、2, 6-ジメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、3, 3-ジメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、3, 4-ジメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、3, 5-ジメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、3, 6-ジメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、4, 4-ジメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、4, 5-ジメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、4, 6-ジメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、5, 5-ジメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、5, 6-ジメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、2, 3, 3-トリメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、2, 3, 4-トリメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、2, 3, 5-トリメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、2, 3, 6-トリメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、2, 4, 4-トリメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、2, 4, 5-トリメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、2, 4, 6-トリメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、2, 5, 5-トリメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、2, 5, 6-トリメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、3, 3, 4-トリメチルヘプタン-1, 7-ジイル基、3, 3, 5-トリメチルヘプタン-1

、7-ジイル基、3、3、6-トリメチルヘプタン-1、7-ジイル基、3、4、4-トリメチルヘプタン-1、7-ジイル基、3、4、5-トリメチルヘプタン-1、7-ジイル基、3、4、6-トリメチルヘプタン-1、7-ジイル基、3、5、5-トリメチルヘプタン-1、7-ジイル基、3、5、6-トリメチルヘプタン-1、7-ジイル基、4、4、5-トリメチルヘプタン-1、7-ジイル基、4、4、6-トリメチルヘプタン-1、7-ジイル基、4、5、5-トリメチルヘプタン-1、7-ジイル基、4、5、6-トリメチルヘプタン-1、7-ジイル基、3-エチルヘプタン-1、7-ジイル基、4-エチルヘプタン-1、7-ジイル基、5-エチルヘプタン-1、7-ジイル基、3-エチル-2-メチルヘプタン-1、7-ジイル基、3-エチル-4-メチルヘプタン-1、7-ジイル基、3-エチル-5-メチルヘプタン-1、7-ジイル基、3-エチル-6-メチルヘプタン-1、7-ジイル基、4-エチル-2-メチルヘプタン-1、7-ジイル基、4-エチル-3-メチルヘプタン-1、7-ジイル基、4-エチル-4-メチルヘプタン-1、7-ジイル基、4-エチル-5-メチルヘプタン-1、7-ジイル基、4-エチル-6-メチルヘプタン-1、7-ジイル基、5-エチル-2-メチルヘプタン-1、7-ジイル基、5-エチル-3-メチルヘプタン-1、7-ジイル基、5-エチル-4-メチルヘプタン-1、7-ジイル基、5-エチル-5-メチルヘプタン-1、7-ジイル基、5-エチル-6-メチルヘプタン-1、7-ジイル基、4-n-プロピルヘプタン-1、7-ジイル基、4-i-プロピルヘプタン-1、7-ジイル基、

【0027】

2-メチルオクタン-1、8-ジイル基、3-メチルオクタン-1、8-ジイル基、3-メチルオクタン-1、8-ジイル基、4-メチルオクタン-1、8-ジイル基、5-メチルオクタン-1、8-ジイル基、6-メチルオクタン-1、8-ジイル基、7-メチルオクタン-1、8-ジイル基、2、3-ジメチルオクタン-1、8-ジイル基、2、4-ジメチルオクタン-1、8-ジイル基、2、5-ジメチルオクタン-1、8-ジイル基、2、6-ジメチルオクタン-1、8-ジイル基、2、7-ジメチルオクタン-1、8-ジイル基、3、3-ジメチルオクタン-1、8-ジイル基、3、4-ジメチルオクタン-1、8-ジイル基、3

, 5-ジメチルオクタン-1, 8-ジイル基, 3, 6-ジメチルオクタン-1, 8-ジイル基, 3, 7-ジメチルオクタン-1, 8-ジイル基, 4, 4-ジメチルオクタン-1, 8-ジイル基, 4, 5-ジメチルオクタン-1, 8-ジイル基, 4, 6-ジメチルオクタン-1, 8-ジイル基, 4, 7-ジメチルオクタン-1, 8-ジイル基, 5, 5-ジメチルオクタン-1, 8-ジイル基, 5, 6-ジメチルオクタン-1, 8-ジイル基, 5, 7-ジメチルオクタン-1, 8-ジイル基, 6, 6-ジメチルオクタン-1, 8-ジイル基, 6, 7-ジメチルオクタン-1, 8-ジイル基, 3-エチルオクタン-1, 8-ジイル基, 4-エチルオクタン-1, 8-ジイル基, 5-エチルオクタン-1, 8-ジイル基, 6-エチルオクタン-1, 8-ジイル基, 2-メチルノナン-1, 9-ジイル基, 3-メチルノナン-1, 9-ジイル基, 4-メチルノナン-1, 9-ジイル基, 5-メチルノナン-1, 9-ジイル基, 6-メチルノナン-1, 9-ジイル基, 7-メチルノナン-1, 9-ジイル基, 8-メチルノナン-1, 9-ジイル基,

【0028】

2-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 3-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 4-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 5-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 6-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 7-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 8-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 4-エチルデカン-1, 10-ジイル基, 5-エチルデカン-1, 10-ジイル基, 6-エチルデカン-1, 10-ジイル基, 7-エチルデカン-1, 10-ジイル基, 5-n-プロピルデカン-1, 10-ジイル基, 6-n-プロピルデカン-1, 10-ジイル基, 3-エチル-2-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 4-エチル-2-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 5-エチル-2-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 6-エチル-2-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 7-エチル-2-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 3-エチル-3-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 4-エチル-3-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 5-エチル-3-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 6-エチル-3-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 7-エチル-3-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 3-エチル-4-メチルデカン-1, 10-ジイル基, 4-エチル-4-メチルデ

カン-1, 10-ジイル基、5-エチル-4-メチルデカン-1, 10-ジイル基、6-エチル-4-メチルデカン-1, 10-ジイル基、7-エチル-4-メチルデカン-1, 10-ジイル基、3-エチル-5-メチルデカン-1, 10-ジイル基、4-エチル-5-メチルデカン-1, 10-ジイル基、5-エチル-5-メチルデカン-1, 10-ジイル基、6-エチル-5-メチルデカン-1, 10-ジイル基、7-エチル-5-メチルデカン-1, 10-ジイル基、

【0029】

2-メチルウンデカン-1, 11-ジイル基、3-メチルウンデカン-1, 11-ジイル基、4-メチルウンデカン-1, 11-ジイル基、5-メチルウンデカン-1, 11-ジイル基、6-メチルウンデカン-1, 11-ジイル基、7-メチルウンデカン-1, 11-ジイル基、8-メチルウンデカン-1, 11-ジイル基、9-メチルウンデカン-1, 11-ジイル基、10-メチルウンデカン-1, 11-ジイル基、3-エチルウンデカン-1, 11-ジイル基、4-エチルウンデカン-1, 11-ジイル基、5-エチルウンデカン-1, 11-ジイル基、6-エチルウンデカン-1, 11-ジイル基、7-エチルウンデカン-1, 11-ジイル基、8-エチルウンデカン-1, 11-ジイル基、9-エチルウンデカン-1, 11-ジイル基、

2-メチルドデカン-1, 12-ジイル基、3-メチルドデカン-1, 12-ジイル基、4-メチルドデカン-1, 12-ジイル基、5-メチルドデカン-1, 12-ジイル基、6-メチルドデカン-1, 12-ジイル基、7-メチルドデカン-1, 12-ジイル基、8-メチルドデカン-1, 12-ジイル基、9-メチルドデカン-1, 12-ジイル基、10-メチルドデカン-1, 12-ジイル基、11-メチルドデカン-1, 12-ジイル基、

3-エチルドデカン-1, 12-ジイル基、4-エチルドデカン-1, 12-ジイル基、5-エチルドデカン-1, 12-ジイル基、6-エチルドデカン-1, 12-ジイル基、7-エチルドデカン-1, 12-ジイル基、8-エチルドデカン-1, 12-ジイル基、9-エチルドデカン-1, 12-ジイル基、10-エチルドデカン-1, 12-ジイル基、

2-メチルトリデカン-1, 13-ジイル基、3-メチルトリデカン-1, 13

ージイル基、4-メチルトリデカン-1, 13-ジイル基、5-メチルトリデカン-1, 13-ジイル基、6-メチルトリデカン-1, 13-ジイル基、7-メチルトリデカン-1, 13-ジイル基、8-メチルトリデカン-1, 13-ジイル基、9-メチルトリデカン-1, 13-ジイル基、10-メチルトリデカン-1, 13-ジイル基、11-メチルトリデカン-1, 13-ジイル基、12-メチルトリデカン-1, 13-ジイル基、

【0030】

3-エチルトリデカン-1, 13-ジイル基、4-エチルトリデカン-1, 13-ジイル基、5-エチルトリデカン-1, 13-ジイル基、6-エチルトリデカン-1, 13-ジイル基、7-エチルトリデカン-1, 13-ジイル基、8-エチルトリデカン-1, 13-ジイル基、9-エチルトリデカン-1, 13-ジイル基、10-エチルトリデカン-1, 13-ジイル基、11-エチルトリデカン-1, 13-ジイル基、

2-メチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、3-メチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、4-メチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、5-メチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、6-メチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、7-メチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、8-メチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、9-メチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、10-メチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、11-メチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、12-メチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、13-メチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、

3-エチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、4-エチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、5-エチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、6-エチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、7-エチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、8-エチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、9-エチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、10-エチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、11-エチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、12-エチルテトラデカン-1, 14-ジイル基、

2-メチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、3-メチルペンタデカン-1,

15-ジイル基、4-メチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、5-メチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、6-メチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、7-メチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、8-メチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、9-メチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、10-メチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、11-メチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、12-メチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、13-メチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、14-メチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、

3-エチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、4-エチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、5-エチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、6-エチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、7-エチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、8-エチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、9-エチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、10-エチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、11-エチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、12-エチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、13-エチルペンタデカン-1, 15-ジイル基、

【0031】

2-メチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、3-メチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、4-メチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、5-メチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、6-メチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、7-メチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、8-メチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、9-メチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、10-メチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、11-メチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、12-メチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、13-メチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、14-メチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、15-メチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、

3-エチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、4-エチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、5-エチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、6-エチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、7-エチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、8-エチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、9-エチルヘキサデカン-

1, 16-ジイル基、10-エチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、11-エチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、12-エチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、13-エチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、14-エチルヘキサデカン-1, 16-ジイル基、

2-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、3-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、4-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、5-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、6-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、7-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、8-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、9-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、10-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、11-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、12-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、13-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、14-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、15-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、16-メチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、

3-エチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、4-エチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、5-エチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、6-エチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、7-エチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、8-エチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、9-エチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、10-エチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、11-エチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、12-エチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、13-エチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、14-エチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、15-エチルヘプタデカン-1, 17-ジイル基、

【0032】

2-メチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、3-メチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、4-メチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、5-メチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、6-メチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、7-メチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、8-メチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、9-メチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、10-メ

チルオクタデカン-1, 18-ジイル基、11-メチルオクタデカン-1, 18-
 ジイル基、12-メチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、13-メチルオ
 クタデカン-1, 18-ジイル基、14-メチルオクタデカン-1, 18-ジイ
 ル基、15-メチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、16-メチルオクタデ
 カン-1, 18-ジイル基、17-メチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、
 3-エチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、4-エチルオクタデカン-1,
 18-ジイル基、5-エチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、6-エチルオ
 クタデカン-1, 18-ジイル基、7-エチルオクタデカン-1, 18-ジイル
 基、8-エチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、9-エチルオクタデカン-
 1, 18-ジイル基、10-エチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、11-
 エチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、12-エチルオクタデカン-1, 1
 8-ジイル基、13-エチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、14-エチル
 オクタデカン-1, 18-ジイル基、15-エチルオクタデカン-1, 18-ジ
 イル基、16-エチルオクタデカン-1, 18-ジイル基、
 2-メチルノナデカン-1, 19-ジイル基、3-メチルノナデカン-1, 19-
 ジイル基、4-メチルノナデカン-1, 19-ジイル基、5-メチルノナデカ
 ン-1, 19-ジイル基、6-メチルノナデカン-1, 19-ジイル基、7-メ
 チルノナデカン-1, 19-ジイル基、8-メチルノナデカン-1, 19-ジイ
 ル基、9-メチルノナデカン-1, 19-ジイル基、10-メチルノナデカン-
 1, 19-ジイル基、11-メチルノナデカン-1, 19-ジイル基、12-メ
 チルノナデカン-1, 19-ジイル基、13-メチルノナデカン-1, 19-ジ
 イル基、14-メチルノナデカン-1, 19-ジイル基、15-メチルノナデカ
 ン-1, 19-ジイル基、16-メチルノナデカン-1, 19-ジイル基、17-
 メチルノナデカン-1, 19-ジイル基、18-メチルノナデカン-1, 19-
 ジイル基、
 3-エチルノナデカン-1, 19-ジイル基、4-エチルノナデカン-1, 19-
 ジイル基、5-エチルノナデカン-1, 19-ジイル基、6-エチルノナデカ
 ン-1, 19-ジイル基、7-エチルノナデカン-1, 19-ジイル基、8-エ
 チルノナデカン-1, 19-ジイル基、9-エチルノナデカン-1, 19-ジイ

ル基、10-エチルノナデカン-1, 19-ジイル基、11-エチルノナデカン-1, 19-ジイル基、12-エチルノナデカン-1, 19-ジイル基、13-エチルノナデカン-1, 19-ジイル基、14-エチルノナデカン-1, 19-ジイル基、15-エチルノナデカン-1, 19-ジイル基、16-エチルノナデカン-1, 19-ジイル基、17-エチルノナデカン-1, 19-ジイル基、

【0033】

2-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、3-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、4-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、5-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、6-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、7-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、8-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、9-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、10-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、11-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、12-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、13-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、14-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、15-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、16-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、17-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、18-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、19-メチルイコサン-1, 20-ジイル基、

3-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、4-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、5-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、6-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、7-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、8-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、9-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、10-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、11-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、12-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、13-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、14-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、15-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、16-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、17-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、18-エチルイコサン-1, 20-ジイル基、

【0034】

2-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、3-メチルヘニコサン-1, 21

ージイル基、4-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、5-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、6-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、7-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、8-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、9-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、10-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、11-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、12-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、13-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、14-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、15-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、16-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、17-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、18-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、19-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、20-メチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、

3-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、4-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、5-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、6-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、7-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、8-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、9-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、10-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、11-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、12-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、13-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、14-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、15-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、16-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、17-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、18-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、19-エチルヘニコサン-1, 21-ジイル基、

【0035】

2-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、3-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、4-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、5-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、6-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、7-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、8-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、9-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、10-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、11-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、12-メチルドコサン-1, 2

2-ジイル基、13-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、14-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、15-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、16-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、17-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、18-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、19-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、20-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、21-メチルドコサン-1, 22-ジイル基、

3-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、4-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、5-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、6-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、7-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、8-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、9-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、10-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、11-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、12-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、13-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、14-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、15-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、16-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、17-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、18-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、19-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、20-エチルドコサン-1, 22-ジイル基、

【0036】

2-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、3-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、4-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、5-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、6-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、7-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、8-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、9-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、10-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、11-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、12-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、13-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、14-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、15-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、16-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、17-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、18-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、19-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、20-メチルトリ

コサン-1, 23-ジイル基、21-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、
 22-メチルトリコサン-1, 23-ジイル基、
 3-エチルトリコサン-1, 23-ジイル基、4-エチルトリコサン-1, 23-
 ジイル基、5-エチルトリコサン-1, 23-ジイル基、6-エチルトリコサ
 ン-1, 23-ジイル基、7-エチルトリコサン-1, 23-ジイル基、8-エ
 チルトリコサン-1, 23-ジイル基、9-エチルトリコサン-1, 23-ジイ
 ル基、10-エチルトリコサン-1, 23-ジイル基、11-エチルトリコサン
 -1, 23-ジイル基、12-エチルトリコサン-1, 23-ジイル基、13-
 エチルトリコサン-1, 23-ジイル基、14-エチルトリコサン-1, 23-
 ジイル基、15-エチルトリコサン-1, 23-ジイル基、16-エチルトリコ
 サン-1, 23-ジイル基、17-エチルトリコサン-1, 23-ジイル基、1
 8-エチルトリコサン-1, 23-ジイル基、19-エチルトリコサン-1, 2
 3-ジイル基、20-エチルトリコサン-1, 23-ジイル基、21-エチルト
 リコサン-1, 23-ジイル基、

【0037】

2-メチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、3-メチルテトラコサン-1,
 24-ジイル基、4-メチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、5-メチルテ
 トラコサン-1, 24-ジイル基、6-メチルテトラコサン-1, 24-ジイル
 基、7-メチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、8-メチルテトラコサン
 -1, 24-ジイル基、9-メチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、10-メ
 チルテトラコサン-1, 24-ジイル基、11-メチルテトラコサン-1, 24
 -ジイル基、12-メチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、13-メチルテ
 トラコサン-1, 24-ジイル基、14-メチルテトラコサン-1, 24-ジイ
 ル基、15-メチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、16-メチルテトラコ
 サン-1, 24-ジイル基、17-メチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、
 18-メチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、19-メチルテトラコサン
 -1, 24-ジイル基、20-メチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、21-
 メチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、22-メチルテトラコサン-1, 2
 4-ジイル基、23-メチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、

3-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、4-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、5-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、6-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、7-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、8-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、9-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、10-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、11-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、12-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、13-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、14-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、15-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、16-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、17-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、18-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、19-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、20-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、21-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、22-エチルテトラコサン-1, 24-ジイル基、

【0038】

2-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、3-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、4-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、5-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、6-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、7-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、8-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、9-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、10-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、11-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、12-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、13-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、14-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、15-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、16-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、17-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、18-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、19-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、20-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、21-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、22-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、23-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、24-メチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、

3-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、4-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、5-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、6-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、7-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、8-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、9-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、10-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、11-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、12-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、13-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、14-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、15-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、16-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、17-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、18-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、19-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、20-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、21-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、22-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、23-エチルペンタコサン-1, 25-ジイル基、

【0039】

2-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、3-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、4-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、5-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、6-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、7-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、8-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、9-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、10-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、11-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、12-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、13-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、14-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、15-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、16-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、17-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、18-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、19-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、20-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、21-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、22-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、23-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、24-メチル

ヘキサコサン-1, 26-ジイル基、25-メチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、

3-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、4-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、5-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、6-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、7-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、8-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、9-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、10-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、11-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、12-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、13-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、14-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、15-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、16-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、17-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、18-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、19-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、20-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、21-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、22-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、23-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、24-エチルヘキサコサン-1, 26-ジイル基、

【0040】

2-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、3-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、4-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、5-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、6-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、7-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、8-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、9-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、10-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、11-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、12-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、13-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、14-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、15-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、16-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、17-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、18-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、19-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、20-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、21-

メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、22-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、23-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、24-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、25-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、26-メチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、

3-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、4-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、5-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、6-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、7-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、8-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、9-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、10-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、11-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、12-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、13-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、14-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、15-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、16-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、17-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、18-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、19-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、20-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、21-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、22-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、23-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、24-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、25-エチルヘプタコサン-1, 27-ジイル基、

2-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、3-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、4-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、5-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、6-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、7-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、8-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、9-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、10-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、11-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、12-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、13-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、14-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、15-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、16-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、17-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、

18-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、19-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、20-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、21-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、22-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、23-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、24-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、25-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、26-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、27-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、

3-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、4-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、5-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、6-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、7-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、8-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、9-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、10-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、11-メチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、12-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、13-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、14-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、15-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、16-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、17-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、18-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、19-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、20-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、21-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、22-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、23-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、24-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、25-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、26-エチルオクタコサン-1, 28-ジイル基、

【0041】

2-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、3-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、4-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、5-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、6-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、7-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、8-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、9-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、10-メチルノナコサン-

1, 29-ジイル基、11-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、12-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、13-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、14-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、15-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、16-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、17-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、18-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、19-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、20-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、21-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、22-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、23-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、24-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、25-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、26-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、27-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基、及び28-メチルノナコサン-1, 29-ジイル基等の分岐鎖状のアルキレン基が挙げられる。

【0042】

Gにおける、置換されていてもよい炭素数2~30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニレン基の、炭素数2~30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニレン基としては、エチレン-1, 2-ジイル基、1-プロペン-1, 3-ジイル基、2-プロペン-1, 3-ジイル基、1-ブテン-1, 4-ジイル基、2-ブテン-1, 4-ジイル基、3-ブテン-1, 4-ジイル基、1, 3-ブタジエン-1, 4-ジイル基、2-ペンテン-1, 5-ジイル基、3-ペンテン-1, 5-ジイル基、2, 4-ペンタジエン-1, 5-ジイル基、2-ヘキセン-1, 6-ジイル基、3-ヘキセン-1, 6-ジイル基、4-ヘキセン-1, 6-ジイル基、2, 4-ヘキサジエン-1, 6-ジイル基、2-ヘプテン-1, 7-ジイル基、3-ヘプテン-1, 7-ジイル基、4-ヘプテン-1, 7-ジイル基、5-ヘプテン-1, 7-ジイル基、2, 4-ヘプタジエン-1, 7-ジイル基、2, 5-ヘプタジエン-1, 7-ジイル基、3, 5-ヘプタジエン-1, 7-ジイル基、2-オクテン-1, 8-ジイル基、3-オクテン-1, 8-ジイル基、4-オクテン-1, 8-ジイル基、5-オクテン-1, 8-ジイル基、6-オクテン-1, 8-ジイル基、2, 4-オクタジエン-1, 8-ジイル基、2, 5-オクタジエン-1, 8-ジイル基、2, 6-オクタジエン-1, 8-ジイル基、2, 4, 6-

オクタトリエン-1, 8-ジイル基、2-ノネン-1, 9-ジイル基、3-ノネン-1, 9-ジイル基、4-ノネン-1, 9-ジイル基、5-ノネン-1, 9-ジイル基、6-ノネン-1, 9-ジイル基、7-ノネン-1, 9-ジイル基、2-デセン-1, 10-ジイル基、3-デセン-1, 10-ジイル基、4-デセン-1, 10-ジイル基、5-デセン-1, 10-ジイル基、6-デセン-1, 10-ジイル基、7-デセン-1, 10-ジイル基、8-デセン-1, 10-ジイル基、

【0043】

2-ウンデセン-1, 11-ジイル基、3-ウンデセン-1, 11-ジイル基、4-ウンデセン-1, 11-ジイル基、5-ウンデセン-1, 11-ジイル基、6-ウンデセン-1, 11-ジイル基、7-ウンデセン-1, 11-ジイル基、8-ウンデセン-1, 11-ジイル基、9-ウンデセン-1, 11-ジイル基、2-ドデセン-1, 12-ジイル基、3-ドデセン-1, 12-ジイル基、4-ドデセン-1, 12-ジイル基、5-ドデセン-1, 12-ジイル基、6-ドデセン-1, 12-ジイル基、7-ドデセン-1, 12-ジイル基、8-ドデセン-1, 12-ジイル基、9-ドデセン-1, 12-ジイル基、10-ドデセン-1, 12-ジイル基、

2-トリデセン-1, 13-ジイル基、3-トリデセン-1, 13-ジイル基、4-トリデセン-1, 13-ジイル基、5-トリデセン-1, 13-ジイル基、6-トリデセン-1, 13-ジイル基、7-トリデセン-1, 13-ジイル基、8-トリデセン-1, 13-ジイル基、9-トリデセン-1, 13-ジイル基、10-トリデセン-1, 13-ジイル基、11-トリデセン-1, 13-ジイル基、

2-テトラデセン-1, 14-ジイル基、3-テトラデセン-1, 14-ジイル基、4-テトラデセン-1, 14-ジイル基、5-テトラデセン-1, 14-ジイル基、6-テトラデセン-1, 14-ジイル基、7-テトラデセン-1, 14-ジイル基、8-テトラデセン-1, 14-ジイル基、9-テトラデセン-1, 14-ジイル基、10-テトラデセン-1, 14-ジイル基、11-テトラデセン-1, 14-ジイル基、12-テトラデセン-1, 14-ジイル基、

2-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、3-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、4-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、5-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、6-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、7-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、8-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、9-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、10-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、11-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、12-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、13-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、

【0044】

2-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、3-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、4-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、5-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、6-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、7-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、8-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、9-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、10-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、11-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、12-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、13-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、14-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、
2-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、3-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、4-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、5-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、6-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、7-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、8-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、9-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、10-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、11-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、12-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、13-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、14-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、
15-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、

2-オクタデセン-1, 18-ジイル基、3-オクタデセン-1, 18-ジイル基、4-オクタデセン-1, 18-ジイル基、5-オクタデセン-1, 18-ジイル基、6-オクタデセン-1, 18-ジイル基、7-オクタデセン-1, 18-ジイル基、8-オクタデセン-1, 18-ジイル基、9-オクタデセン-1, 18-ジイル基、10-オクタデセン-1, 18-ジイル基、11-オクタデセン-1, 18-ジイル基、12-オクタデセン-1, 18-ジイル基、13-オ

クタデセン-1, 18-ジイル基、14-オクタデセン-1, 18-ジイル基、
15-オクタデセン-1, 18-ジイル基、16-オクタデセン-1, 18-ジ
イル基、

2-ノナデセン-1, 19-ジイル基、3-ノナデセン-1, 19-ジイル基、
4-ノナデセン-1, 19-ジイル基、5-ノナデセン-1, 19-ジイル基、
6-ノナデセン-1, 19-ジイル基、7-ノナデセン-1, 19-ジイル基、
8-ノナデセン-1, 19-ジイル基、9-ノナデセン-1, 19-ジイル基、
10-ノナデセン-1, 19-ジイル基、11-ノナデセン-1, 19-ジイル
基、12-ノナデセン-1, 19-ジイル基、13-ノナデセン-1, 19-ジ
イル基、14-ノナデセン-1, 19-ジイル基、15-ノナデセン-1, 19
-ジイル基、16-ノナデセン-1, 19-ジイル基、17-ノナデセン-1,
19-ジイル基、

【0045】

2-イコセン-1, 20-ジイル基、3-イコセン-1, 20-ジイル基、4-
イコセン-1, 20-ジイル基、5-イコセン-1, 20-ジイル基、6-イコ
セン-1, 20-ジイル基、7-イコセン-1, 20-ジイル基、8-イコセン
-1, 20-ジイル基、9-イコセン-1, 20-ジイル基、10-イコセン-
1, 20-ジイル基、11-イコセン-1, 20-ジイル基、12-イコセン-
1, 20-ジイル基、13-イコセン-1, 20-ジイル基、14-イコセン-
1, 20-ジイル基、15-イコセン-1, 20-ジイル基、16-イコセン-
1, 20-ジイル基、17-イコセン-1, 20-ジイル基、18-イコセン-
1, 20-ジイル基、

2-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、3-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、
4-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、5-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、
6-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、7-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、
8-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、9-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、
10-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、11-ヘニコセン-1, 21-ジイル
基、12-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、13-ヘニコセン-1, 21-ジ
イル基、14-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、15-ヘニコセン-1, 21

ージイル基、16-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、17-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、18-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、19-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、

2-ドコセン-1, 22-ジイル基、3-ドコセン-1, 22-ジイル基、4-ドコセン-1, 22-ジイル基、5-ドコセン-1, 22-ジイル基、6-ドコセン-1, 22-ジイル基、7-ドコセン-1, 22-ジイル基、8-ドコセン-1, 22-ジイル基、9-ドコセン-1, 22-ジイル基、10-ドコセン-1, 22-ジイル基、11-ドコセン-1, 22-ジイル基、12-ドコセン-1, 22-ジイル基、13-ドコセン-1, 22-ジイル基、14-ドコセン-1, 22-ジイル基、15-ドコセン-1, 22-ジイル基、16-ドコセン-1, 22-ジイル基、17-ドコセン-1, 22-ジイル基、18-ドコセン-1, 22-ジイル基、19-ドコセン-1, 22-ジイル基、20-ドコセン-1, 22-ジイル基、

【0046】

2-トリコセン-1, 23-ジイル基、3-トリコセン-1, 23-ジイル基、4-トリコセン-1, 23-ジイル基、5-トリコセン-1, 23-ジイル基、6-トリコセン-1, 23-ジイル基、7-トリコセン-1, 23-ジイル基、8-トリコセン-1, 23-ジイル基、9-トリコセン-1, 23-ジイル基、10-トリコセン-1, 23-ジイル基、11-トリコセン-1, 23-ジイル基、12-トリコセン-1, 23-ジイル基、13-トリコセン-1, 23-ジイル基、14-トリコセン-1, 23-ジイル基、15-トリコセン-1, 23-ジイル基、16-トリコセン-1, 23-ジイル基、17-トリコセン-1, 23-ジイル基、18-トリコセン-1, 23-ジイル基、19-トリコセン-1, 23-ジイル基、20-トリコセン-1, 23-ジイル基、21-トリコセン-1, 23-ジイル基、

【0047】

2-テトラコセン-1, 24-ジイル基、3-テトラコセン-1, 24-ジイル基、4-テトラコセン-1, 24-ジイル基、5-テトラコセン-1, 24-ジイル基、6-テトラコセン-1, 24-ジイル基、7-テトラコセン-1, 24

ージイル基、8-テトラコセン-1, 24-ジイル基、9-テトラコセン-1,
24-ジイル基、10-テトラコセン-1, 24-ジイル基、11-テトラコセ
ン-1, 24-ジイル基、12-テトラコセン-1, 24-ジイル基、13-テ
トラコセン-1, 24-ジイル基、14-テトラコセン-1, 24-ジイル基、
15-テトラコセン-1, 24-ジイル基、16-テトラコセン-1, 24-ジ
イル基、17-テトラコセン-1, 24-ジイル基、18-テトラコセン-1,
24-ジイル基、19-テトラコセン-1, 24-ジイル基、20-テトラコセ
ン-1, 24-ジイル基、21-テトラコセン-1, 24-ジイル基、22-テ
トラコセン-1, 24-ジイル基、

2-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、3-ペンタコセン-1, 25-ジイル
基、4-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、5-ペンタコセン-1, 25-ジ
イル基、6-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、7-ペンタコセン-1, 25
-ジイル基、8-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、8-ペンタコセン-1,
25-ジイル基、9-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、10-ペンタコセン
-1, 25-ジイル基、11-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、12-ペン
タコセン-1, 25-ジイル基、13-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、1
4-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、15-ペンタコセン-1, 25-ジイ
ル基、16-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、17-ペンタコセン-1, 2
5-ジイル基、18-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、19-ペンタコセン
-1, 25-ジイル基、20-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、21-ペン
タコセン-1, 25-ジイル基、22-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、2
3-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、

【0048】

2-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、3-ヘキサコセン-1, 26-ジイル
基、4-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、5-ヘキサコセン-1, 26-ジ
イル基、6-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、7-ヘキサコセン-1, 26
-ジイル基、8-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、9-ヘキサコセン-1,
26-ジイル基、10-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、11-ヘキサコセ
ン-1, 26-ジイル基、12-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、13-ヘ

キサコセン-1, 26-ジイル基、14-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、
 15-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、16-ヘキサコセン-1, 26-ジ
 イル基、17-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、18-ヘキサコセン-1,
 26-ジイル基、19-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、20-ヘキサコセ
 ン-1, 26-ジイル基、21-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、22-ヘ
 キサコセン-1, 26-ジイル基、23-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、
 24-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、
 2-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、3-ヘプタコセン-1, 27-ジイル
 基、4-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、5-ヘプタコセン-1, 27-ジ
 イル基、6-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、7-ヘプタコセン-1, 27
 -ジイル基、8-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、9-ヘプタコセン-1,
 27-ジイル基、10-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、11-ヘプタコセ
 ン-1, 27-ジイル基、12-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、13-ヘ
 プタコセン-1, 27-ジイル基、14-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、
 15-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、16-ヘプタコセン-1, 27-ジ
 イル基、17-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、18-ヘプタコセン-1,
 27-ジイル基、19-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、20-ヘプタコセ
 ン-1, 27-ジイル基、21-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、22-ヘ
 プタコセン-1, 27-ジイル基、23-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、
 24-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、25-ヘプタコセン-1, 27-ジ
 イル基、

【0049】

2-オクタコセン-1, 28-ジイル基、3-オクタコセン-1, 28-ジイル
 基、4-オクタコセン-1, 28-ジイル基、5-オクタコセン-1, 28-ジ
 イル基、6-オクタコセン-1, 28-ジイル基、7-オクタコセン-1, 28
 -ジイル基、8-オクタコセン-1, 28-ジイル基、9-オクタコセン-1,
 28-ジイル基、10-オクタコセン-1, 28-ジイル基、11-オクタコセ
 ン-1, 28-ジイル基、12-オクタコセン-1, 28-ジイル基、13-オ
 クタコセン-1, 28-ジイル基、14-オクタコセン-1, 28-ジイル基、

15-オクタコセン-1, 28-ジイル基、16-オクタコセン-1, 28-ジイル基、17-オクタコセン-1, 28-ジイル基、18-オクタコセン-1, 28-ジイル基、19-オクタコセン-1, 28-ジイル基、20-オクタコセン-1, 28-ジイル基、21-オクタコセン-1, 28-ジイル基、22-オクタコセン-1, 28-ジイル基、23-オクタコセン-1, 28-ジイル基、24-オクタコセン-1, 28-ジイル基、25-オクタコセン-1, 28-ジイル基、26-オクタコセン-1, 28-ジイル基、

2-ノナコセン-1, 29-ジイル基、3-ノナコセン-1, 29-ジイル基、4-ノナコセン-1, 29-ジイル基、5-ノナコセン-1, 29-ジイル基、6-ノナコセン-1, 29-ジイル基、7-ノナコセン-1, 29-ジイル基、8-ノナコセン-1, 29-ジイル基、9-ノナコセン-1, 29-ジイル基、10-ノナコセン-1, 29-ジイル基、11-ノナコセン-1, 29-ジイル基、12-ノナコセン-1, 29-ジイル基、13-ノナコセン-1, 29-ジイル基、14-ノナコセン-1, 29-ジイル基、15-ノナコセン-1, 29-ジイル基、16-ノナコセン-1, 29-ジイル基、17-ノナコセン-1, 29-ジイル基、18-ノナコセン-1, 29-ジイル基、19-ノナコセン-1, 29-ジイル基、20-ノナコセン-1, 29-ジイル基、21-ノナコセン-1, 29-ジイル基、22-ノナコセン-1, 29-ジイル基、23-ノナコセン-1, 29-ジイル基、24-ノナコセン-1, 29-ジイル基、25-ノナコセン-1, 29-ジイル基、26-ノナコセン-1, 29-ジイル基、27-ノナコセン-1, 29-ジイル基、

2-トリアコンテン-1, 30-ジイル基、3-トリアコンテン-1, 30-ジイル基、4-トリアコンテン-1, 30-ジイル基、5-トリアコンテン-1, 30-ジイル基、6-トリアコンテン-1, 30-ジイル基、7-トリアコンテン-1, 30-ジイル基、8-トリアコンテン-1, 30-ジイル基、9-トリアコンテン-1, 30-ジイル基、10-トリアコンテン-1, 30-ジイル基、11-トリアコンテン-1, 30-ジイル基、12-トリアコンテン-1, 30-ジイル基、13-トリアコンテン-1, 30-ジイル基、14-トリアコンテン-1, 30-ジイル基、15-トリアコンテン-1, 30-ジイル基、16

ートリアコンテン-1, 30-ジイル基、17-ートリアコンテン-1, 30-ジイル基、18-ートリアコンテン-1, 30-ジイル基、19-ートリアコンテン-1, 30-ジイル基、20-ートリアコンテン-1, 30-ジイル基、21-ートリアコンテン-1, 30-ジイル基、22-ートリアコンテン-1, 30-ジイル基、23-ートリアコンテン-1, 30-ジイル基、24-ートリアコンテン-1, 30-ジイル基、25-ートリアコンテン-1, 30-ジイル基、26-ートリアコンテン-1, 30-ジイル基、27-ートリアコンテン-1, 30-ジイル基、及び28-ートリアコンテン-1, 30-ジイル基等の直鎖状のアルケニレン基、

【0050】

並びに1-メチルエチレン-1, 2-ジイル基、2-メチル-1-プロペン-1, 3-ジイル基、2-メチル-2-プロペン-1, 3-ジイル基、2-メチル-1-ブテン-1, 4-ジイル基、3-メチル-2-ブテン-1, 4-ジイル基、2-メチル-3-ブテン-1, 4-ジイル基、2, 3-ジメチル-1, 3-ブタジエン-1, 4-ジイル基、3-エチル-2-プロペン-1, 5-ジイル基、4-メチル-3-プロペン-1, 5-ジイル基、3-メチル-2, 4-プロバジエン-1, 5-ジイル基、3, 4-ジエチル-2-ヘキセン-1, 6-ジイル基、4-メチル-3-ヘキセン-1, 6-ジイル基、2-メチル-4-ヘキセン-1, 6-ジイル基、3, 5-ジメチル-2, 4-ヘキサジエン-1, 6-ジイル基、5-エチル-3-メチル-2-ヘプテン-1, 7-ジイル基、5-メチル-3-ヘプテン-1, 7-ジイル基、4-n-プロピル-4-ヘプテン-1, 7-ジイル基、3, 6-ジメチル-5-ヘプテン-1, 7-ジイル基、5-エチル-2, 4-ヘプタジエン-1, 7-ジイル基、2, 6-ジメチル-2, 5-ヘプタジエン-1, 7-ジイル基、4-エチル-3, 5-ヘプタジエン-1, 7-ジイル基、4-エチル-6, 6-ジメチル-2-オクテン-1, 8-ジイル基、5-n-プロピル-3-オクテン-1, 8-ジイル基、3-エチル-4-オクテン-1, 8-ジイル基、4-エチル-2-メチル-6-i-プロピル-5-オクテン-1, 8-ジイル基、3, 4, 5-トリメチル-6-オクテン-1, 8-ジイル基、5-エチル-7-メチル-2, 4-オクタジエン-1, 8-ジイル基、3-メチル-2, 5-オクタジエン-1, 8-ジイル基、5-n-プロピル-2, 6-

オクタジエン-1, 8-ジイル基、4-メチル-2, 4, 6-オクタトリエン-1, 8-ジイル基、5-エチル-2-ノネン-1, 9-ジイル基、3, 5, 6-トリメチル-3-ノネン-1, 9-ジイル基、2, 4, 5, 7-テトラメチル-4-ノネン-1, 9-ジイル基、3, 4-ジエチル-5-ノネン-1, 9-ジイル基、4-i-プロピル-6-ノネン-1, 9-ジイル基、3-エチル-7-ノネン-1, 9-ジイル基、5-n-ブチル-2-デセン-1, 10-ジイル基、6-i-プロピル-3-デセン-1, 10-ジイル基、5-エチル-4-デセン-1, 10-ジイル基、6, 7-ジメチル-5-デセン-1, 10-ジイル基、4-エチル-6-デセン-1, 10-ジイル基、5-メチル-7-デセン-1, 10-ジイル基、6-エチル-4-メチル-8-デセン-1, 10-ジイル基、6-メチル-2-ウンデセン-1, 11-ジイル基、4-エチル-3-ウンデセン-1, 11-ジイル基、5-メチル-4-ウンデセン-1, 11-ジイル基、7-エチル-5-ウンデセン-1, 11-ジイル基、5-メチル-6-ウンデセン-1, 11-ジイル基、9-エチル-7-ウンデセン-1, 11-ジイル基、3-メチル-8-ウンデセン-1, 11-ジイル基、4-エチル-9-ウンデセン-1, 11-ジイル基、

【0051】

4-エチル-2-ドデセン-1, 12-ジイル基、5-メチル-3-ドデセン-1, 12-ジイル基、6-エチル-4-ドデセン-1, 12-ジイル基、7-メチル-5-ドデセン-1, 12-ジイル基、8-エチル-6-ドデセン-1, 12-ジイル基、9-メチル-7-ドデセン-1, 12-ジイル基、10-エチル-8-ドデセン-1, 12-ジイル基、2-メチル-9-ドデセン-1, 12-ジイル基、5-エチル-10-ドデセン-1, 12-ジイル基、4, 7, 9-トリメチル-2-トリデセン-1, 13-ジイル基、10-メチル-3-トリデセン-1, 13-ジイル基、8-エチル-4-トリデセン-1, 13-ジイル基、4-メチル-5-トリデセン-1, 13-ジイル基、5-エチル-6-トリデセン-1, 13-ジイル基、3, 6-ジエチル-7-トリデセン-1, 13-ジイル基、5-メチル-8-トリデセン-1, 13-ジイル基、7-エチル-9-トリデセン-1, 13-ジイル基、4-メチル-10-トリデセン

-1, 13-ジイル基、6-エチル-11-トリデセン-1, 13-ジイル基、
7-メチル-2-テトラデセン-1, 14-ジイル基、8-エチル-3-テトラ
デセン-1, 14-ジイル基、6-n-プロピル-4-テトラデセン-1, 14
-ジイル基、8-メチル-5-テトラデセン-1, 14-ジイル基、3-エチル
-6-テトラデセン-1, 14-ジイル基、10-メチル-7-テトラデセン-
1, 14-ジイル基、6-i-プロピル-8-テトラデセン-1, 14-ジイル
基、5, 7, 11-トリメチル-9-テトラデセン-1, 14-ジイル基、5-
エチル-10-テトラデセン-1, 14-ジイル基、6-メチル-11-テトラ
デセン-1, 14-ジイル基、4-n-ブチル-12-テトラデセン-1, 14
-ジイル基、

【0052】

4-メチル-2-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、6-エチル-3-ペンタ
デセン-1, 15-ジイル基、8-メチル-4-ペンタデセン-1, 15-ジイ
ル基、10-エチル-5-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、4, 9-ジメチ
ル-6-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、10-エチル-7-ペンタデセン
-1, 15-ジイル基、6-メチル-8-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、
8-n-プロピル-9-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、5-メチル-10
-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、4, 7-ジエチル-11-ペンタデセン
-1, 15-ジイル基、5-メチル-12-ペンタデセン-1, 15-ジイル基
、8-エチル-13-ペンタデセン-1, 15-ジイル基、

8-i-プロピル-2-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、6-メチル-3
-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、8-エチル-4-ヘキサデセン-1, 1
6-ジイル基、9-メチル-5-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、10-エ
チル-6-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、5-メチル-7-ヘキサデセン
-1, 16-ジイル基、5, 10-ジメチル-8-ヘキサデセン-1, 16-ジ
イル基、5-エチル-9-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、7, 12-ジエ
チル-10-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、5-エチル-7-メチル-1
1-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、5-メチル-12-ヘキサデセン-1
、16-ジイル基、8-s-ブチル-13-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基

、5-エチル-14-ヘキサデセン-1, 16-ジイル基、
 11-メチル-2-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、9-エチル-3-ヘプ
 タデセン-1, 17-ジイル基、6-i-プロピル-4-ヘプタデセン-1, 1
 7-ジイル基、8-メチル-5-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、4-エチ
 ル-6-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、10-メチル-7-ヘプタデセン
 -1, 17-ジイル基、5, 11-ジメチル-8-ヘプタデセン-1, 17-ジ
 イル基、5-エチル-9-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、8-エチル-1
 0-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、7-メチル-11-ヘプタデセン-1
 , 17-ジイル基、5-i-プロピル-12-ヘプタデセン-1, 17-ジイル
 基、9-エチル-13-ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、8-メチル-14
 -ヘプタデセン-1, 17-ジイル基、7-s-ブチル-15-ヘプタデセン-
 1, 17-ジイル基、

【0053】

10, 15-ジメチル-2-オクタデセン-1, 18-ジイル基、6-エチル-
 3-オクタデセン-1, 18-ジイル基、10-メチル-4-オクタデセン-1
 , 18-ジイル基、11-メチル-5-オクタデセン-1, 18-ジイル基、1
 2-エチル-6-オクタデセン-1, 18-ジイル基、10-メチル-7-オク
 タデセン-1, 18-ジイル基、5-メチル-8-オクタデセン-1, 18-ジ
 イル基、8-エチル-9-オクタデセン-1, 18-ジイル基、7-メチル-1
 0-オクタデセン-1, 18-ジイル基、9-n-ブチル-11-オクタデセン
 -1, 18-ジイル基、7-メチル-12-オクタデセン-1, 18-ジイル基
 、9-エチル-13-オクタデセン-1, 18-ジイル基、10-i-プロピル
 -14-オクタデセン-1, 18-ジイル基、7-メチル-15-オクタデセン
 -1, 18-ジイル基、10-エチル-16-オクタデセン-1, 18-ジイル
 基、

10-メチル-2-ノナデセン-1, 19-ジイル基、10, 12-ジエチル-
 3-ノナデセン-1, 19-ジイル基、6-メチル-4-ノナデセン-1, 19
 -ジイル基、7-エチル-5-ノナデセン-1, 19-ジイル基、9-n-プロ
 ピル-6-ノナデセン-1, 19-ジイル基、10-メチル-7-ノナデセン-

1, 19-ジイル基、12-i-プロピル-8-ノナデセン-1, 19-ジイル基、5, 15-ジメチル-9-ノナデセン-1, 19-ジイル基、7-エチル-13-メチル-10-ノナデセン-1, 19-ジイル基、6-メチル-11-ノナデセン-1, 19-ジイル基、6-エチル-12-ノナデセン-1, 19-ジイル基、7, 15-ジエチル-13-ノナデセン-1, 19-ジイル基、9-s-ブチル-14-ノナデセン-1, 19-ジイル基、8-メチル-15-ノナデセン-1, 19-ジイル基、10-エチル-16-ノナデセン-1, 19-ジイル基、10-i-プロピル-17-ノナデセン-1, 19-ジイル基、

【0054】

8-メチル-2-イコセン-1, 20-ジイル基、6-エチル-3-イコセン-1, 20-ジイル基、10-i-プロピル-4-イコセン-1, 20-ジイル基、11-n-プロピル-5-イコセン-1, 20-ジイル基、12-メチル-6-イコセン-1, 20-ジイル基、11-エチル-7-イコセン-1, 20-ジイル基、13-n-プロピル-8-イコセン-1, 20-ジイル基、8-i-プロピル-9-イコセン-1, 20-ジイル基、8-n-プロピル-10-イコセン-1, 20-ジイル基、7-メチル-11-イコセン-1, 20-ジイル基、8-エチル-12-イコセン-1, 20-ジイル基、10-n-プロピル-13-イコセン-1, 20-ジイル基、9-i-プロピル-14-イコセン-1, 20-ジイル基、10-n-ブチル-15-イコセン-1, 20-ジイル基、8-s-ブチル-16-イコセン-1, 20-ジイル基、7-i-ブチル-17-イコセン-1, 20-ジイル基、9-メチル-18-イコセン-1, 20-ジイル基、

11-メチル-2-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、12-n-ブチル-3-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、10-n-ペンチル-4-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、8-エチル-5-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、10-i-プロピル-6-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、5-n-プロピル-7-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、13-n-ブチル-8-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、15-s-ブチル-9-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、5-メチル-10-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、15-エチル-6-メチル-1

1-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、8-エチル-12-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、7-メチル-13-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、11-エチル-14-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、6-エチル-15-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、9-メチル-16-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、5-エチル-9-メチル-17-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、10, 10-ジメチル-18-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、9-エチル-19-ヘニコセン-1, 21-ジイル基、

11-メチル-2-ドコセン-1, 22-ジイル基、12-エチル-3-ドコセン-1, 22-ジイル基、13-i-プロピル-4-ドコセン-1, 22-ジイル基、10-n-プロピル-5-ドコセン-1, 22-ジイル基、10-n-ブチル-6-ドコセン-1, 22-ジイル基、15-s-ブチル-7-ドコセン-1, 22-ジイル基、11-i-ブチル-8-ドコセン-1, 22-ジイル基、5, 15-ジメチル-9-ドコセン-1, 22-ジイル基、8, 14-ジエチル-10-ドコセン-1, 22-ジイル基、5-メチル-11-ドコセン-1, 22-ジイル基、7-エチル-12-ドコセン-1, 22-ジイル基、10-メチル-13-ドコセン-1, 22-ジイル基、10-エチル-14-ドコセン-1, 22-ジイル基、9-エチル-15-ドコセン-1, 22-ジイル基、8-メチル-16-ドコセン-1, 22-ジイル基、7-i-プロピル-17-ドコセン-1, 22-ジイル基、10-i-ブチル-18-ドコセン-1, 22-ジイル基、9, 10-ジメチル-19-ドコセン-1, 22-ジイル基、13-エチル-20-ドコセン-1, 22-ジイル基、

【0055】

19-メチル-2-トリコセン-1, 23-ジイル基、10, 15-ジメチル-3-トリコセン-1, 23-ジイル基、3, 11, 16-トリメチル-4-トリコセン-1, 23-ジイル基、12-エチル-5-トリコセン-1, 23-ジイル基、6, 13-ジエチル-6-トリコセン-1, 23-ジイル基、4, 12, 18-トリエチル-7-トリコセン-1, 23-ジイル基、18-i-プロピル-8-トリコセン-1, 23-ジイル基、14-n-プロピル-9-トリコセン-1, 23-ジイル基、8-n-ブチル-10-トリコセン-1, 23-ジイル

基、15-s-ブチル-11-トリコセン-1, 23-ジイル基、5-i-ブチル-12-トリコセン-1, 23-ジイル基、7-エチル-9-メチル-13-トリコセン-1, 23-ジイル基、9-メチル-14-トリコセン-1, 23-ジイル基、4, 18-ジメチル-15-トリコセン-1, 23-ジイル基、3, 4, 11-トリメチル-16-トリコセン-1, 23-ジイル基、9-エチル-17-トリコセン-1, 23-ジイル基、10, 13-ジエチル-18-トリコセン-1, 23-ジイル基、5, 8, 21-トリエチル-19-トリコセン-1, 23-ジイル基、15-i-プロピル-20-トリコセン-1, 23-ジイル基、17-n-プロピル-21-トリコセン-1, 23-ジイル基、

【0056】

16-n-ブチル-2-テトラコセン-1, 24-ジイル基、11-s-ブチル-3-テトラコセン-1, 24-ジイル基、8-i-ブチル-4-テトラコセン-1, 24-ジイル基、18-エチル-9-メチル-5-テトラコセン-1, 24-ジイル基、13-メチル-6-テトラコセン-1, 24-ジイル基、4, 19-ジメチル-7-テトラコセン-1, 24-ジイル基、5, 10, 17-トリエチル-8-テトラコセン-1, 24-ジイル基、6-エチル-9-テトラコセン-1, 24-ジイル基、7, 16-ジエチル-10-テトラコセン-1, 24-ジイル基、5, 9, 18-トリエチル-11-テトラコセン-1, 24-ジイル基、10-n-プロピル-12-テトラコセン-1, 24-ジイル基、20-i-プロピル-13-テトラコセン-1, 24-ジイル基、9-n-ブチル-14-テトラコセン-1, 24-ジイル基、11-s-ブチル-15-テトラコセン-1, 24-ジイル基、13-i-ブチル-16-テトラコセン-1, 24-ジイル基、10-エチル-13-メチル-17-テトラコセン-1, 24-ジイル基、6-メチル-18-テトラコセン-1, 24-ジイル基、5, 7-ジメチル-19-テトラコセン-1, 24-ジイル基、4, 8, 13-トリメチル-20-テトラコセン-1, 24-ジイル基、18-エチル-21-テトラコセン-1, 24-ジイル基、6, 10-ジエチル-22-テトラコセン-1, 24-ジイル基、

9, 13, 16-トリメチル-2-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、12-

n-プロピル-3-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、11-i-プロピル-4-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、20-n-ブチル-5-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、17-i-ブチル-6-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、15-s-ブチル-7-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、15-エチル-23-メチル-8-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、11-メチル-8-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、13, 17-ジメチル-9-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、5, 8, 21-トリメチル-10-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、17-エチル-11-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、8, 18-ジエチル-12-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、10, 15, 18-トリメチル-13-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、4-n-プロピル-14-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、20-i-プロピル-15-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、8-n-ブチル-16-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、11-s-ブチル-17-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、5, 22-ジメチル-18-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、5-i-ブチル-19-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、9-メチル-13-エチル-20-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、15-メチル-21-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、6, 13-ジメチル-22-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、4, 8, 12-トリメチル-23-ペンタコセン-1, 25-ジイル基、

【0057】

13-エチル-2-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、5, 16-ジエチル-3-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、7, 11, 16-トリメチル-4-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、12-n-プロピル-5-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、21-i-プロピル-6-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、6-n-ブチル-7-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、13-s-ブチル-8-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、19-i-ブチル-9-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、13-エチル-18-メチル-10-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、10-メチル-11-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、10, 20-ジメチル-12-ヘキサコセン-1, 26-ジイル基、7, 9

、17-トリメチル-13-ヘキサコセン-1、26-ジイル基、8-エチル-14-ヘキサコセン-1、26-ジイル基、5、22-ジエチル-15-ヘキサコセン-1、26-ジイル基、7、10、21-トリメチル-16-ヘキサコセン-1、26-ジイル基、15-n-プロピル-17-ヘキサコセン-1、26-ジイル基、13-i-プロピル-18-ヘキサコセン-1、26-ジイル基、8-n-ブチル-19-ヘキサコセン-1、26-ジイル基、11-s-ブチル-20-ヘキサコセン-1、26-ジイル基、14-i-ブチル-21-ヘキサコセン-1、26-ジイル基、5-エチル-21-メチル-22-ヘキサコセン-1、26-ジイル基、7-メチル-23-ヘキサコセン-1、26-ジイル基、8、14-ジメチル-24-ヘキサコセン-1、26-ジイル基、

【0058】

7、16、24-トリメチル-2-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、9-エチル-3-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、7、16-ジメチル-4-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、9、13、21-トリメチル-5-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、13-n-プロピル-6-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、10-i-プロピル-7-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、16-n-プロピル-8-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、18-メチル-9-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、9-i-プロピル-10-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、15-エチル-7-メチル-11-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、25-メチル-12-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、8、21-ジメチル-13-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、5、11、23-トリメチル-14-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、9-エチル-15-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、8、20-ジメチル-16-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、4、8、19-トリメチル-17-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、7-n-プロピル-18-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、21-i-プロピル-19-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、14-n-プロピル-20-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、8-エチル-21-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、11-i-プロピル-22-ヘプタコセン-1、27-ジイル基、5-エチル-13-メチル-23-ヘプタコセン-1、27-

ジイル基、16-メチル-24-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、7-エチル-25-ヘプタコセン-1, 27-ジイル基、

14-エチル-2-オクタコセン-1, 28-ジイル基、20-メチル-3-オクタコセン-1, 28-ジイル基、7, 22-ジメチル-4-オクタコセン-1, 28-ジイル基、19-エチル-5-オクタコセン-1, 28-ジイル基、11-メチル-6-オクタコセン-1, 28-ジイル基、13, 16-ジメチル-7-オクタコセン-1, 28-ジイル基、13-エチル-8-オクタコセン-1, 28-ジイル基、6-メチル-9-オクタコセン-1, 28-ジイル基、9, 16-ジメチル-10-オクタコセン-1, 28-ジイル基、7-エチル-11-オクタコセン-1, 28-ジイル基、16-メチル-12-オクタコセン-1, 28-ジイル基、6, 15-ジメチル-13-オクタコセン-1, 28-ジイル基、22-エチル-14-オクタコセン-1, 28-ジイル基、6-メチル-15-オクタコセン-1, 28-ジイル基、8, 11-ジメチル-16-オクタコセン-1, 28-ジイル基、23-エチル-17-オクタコセン-1, 28-ジイル基、4-メチル-18-オクタコセン-1, 28-ジイル基、7, 14-ジメチル-19-オクタコセン-1, 28-ジイル基、13-エチル-20-オクタコセン-1, 28-ジイル基、8-メチル-21-オクタコセン-1, 28-ジイル基、11, 17-ジメチル-22-オクタコセン-1, 28-ジイル基、10-エチル-23-オクタコセン-1, 28-ジイル基、9-メチル-24-オクタコセン-1, 28-ジイル基、7, 19-ジメチル-25-オクタコセン-1, 28-ジイル基、12-エチル-26-オクタコセン-1, 28-ジイル基、

【0059】

15-メチル-2-ノナコセン-1, 29-ジイル基、14-メチル-3-ノナコセン-1, 29-ジイル基、12-メチル-4-ノナコセン-1, 29-ジイル基、13-メチル-5-ノナコセン-1, 29-ジイル基、11-メチル-6-ノナコセン-1, 29-ジイル基、10-メチル-7-ノナコセン-1, 29-ジイル基、25-メチル-8-ノナコセン-1, 29-ジイル基、24-メチル-9-ノナコセン-1, 29-ジイル基、23-メチル-10-ノナコセン-

1, 29-ジイル基、22-メチル-11-ノナコセン-1, 29-ジイル基、
 21-メチル-12-ノナコセン-1, 29-ジイル基、20-メチル-13-
 ノナコセン-1, 29-ジイル基、19-メチル-14-ノナコセン-1, 29-
 ジイル基、18-メチル-15-ノナコセン-1, 29-ジイル基、27-メ
 チル-16-ノナコセン-1, 29-ジイル基、26-メチル-17-ノナコセ
 ン-1, 29-ジイル基、25-メチル-18-ノナコセン-1, 29-ジイル
 基、24-メチル-19-ノナコセン-1, 29-ジイル基、23-メチル-2
 0-ノナコセン-1, 29-ジイル基、20-メチル-21-ノナコセン-1,
 29-ジイル基、19-メチル-22-ノナコセン-1, 29-ジイル基、18-
 メチル-23-ノナコセン-1, 29-ジイル基、17-メチル-24-ノナ
 コセン-1, 29-ジイル基、16-メチル-25-ノナコセン-1, 29-ジ
 イル基、6-メチル-26-ノナコセン-1, 29-ジイル基、及び5-メチル
 -27-ノナコセン-1, 29-ジイル基等の分岐鎖状のアルケニレン基が挙げ
 られる。

【0060】

Gにおける、置換されていてもよい炭素数2~30の直鎖もしくは分岐鎖状の
 アルキニレン基の、炭素数2~30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニレン基と
 しては、アセチレン-1, 2-ジイル基、1-プロピン-1, 3-ジイル基、2-
 プロピン-1, 3-ジイル基、1-ブチン-1, 4-ジイル基、2-ブチン-
 1, 4-ジイル基、3-ブチン-1, 4-ジイル基、1, 3-ブタジイン-1,
 4-ジイル基、2-ペンチン-1, 5-ジイル基、3-ペンチン-1, 5-ジイ
 ル基、2, 4-ペンタジイン-1, 5-ジイル基、2-ヘキシン-1, 6-ジイ
 ル基、3-ヘキシン-1, 6-ジイル基、4-ヘキシン-1, 6-ジイル基、2,
 4-ヘキサジイン-1, 6-ジイル基、2-ヘプチン-1, 7-ジイル基、3-
 ヘプチン-1, 7-ジイル基、4-ヘプチン-1, 7-ジイル基、5-ヘプチ
 ン-1, 7-ジイル基、2, 4-ヘプタジイン-1, 7-ジイル基、2, 5-ヘ
 プタジイン-1, 7-ジイル基、3, 5-ヘプタジイン-1, 7-ジイル基、2-
 オクチン-1, 8-ジイル基、3-オクチン-1, 8-ジイル基、4-オクチ
 ン-1, 8-ジイル基、5-オクチン-1, 8-ジイル基、6-オクチン-1,

8-ジイル基、2, 4-オクタジイン-1, 8-ジイル基、2, 5-オクタジイン-1, 8-ジイル基、2, 6-オクタジイン-1, 8-ジイル基、2, 4, 6-オクタトリイン-1, 8-ジイル基、2-ノニン-1, 9-ジイル基、3-ノニン-1, 9-ジイル基、4-ノニン-1, 9-ジイル基、5-ノニン-1, 9-ジイル基、6-ノニン-1, 9-ジイル基、7-ノニン-1, 9-ジイル基、2-デシン-1, 10-ジイル基、3-デシン-1, 10-ジイル基、4-デシン-1, 10-ジイル基、5-デシン-1, 10-ジイル基、6-デシン-1, 10-ジイル基、7-デシン-1, 10-ジイル基、8-デシン-1, 10-ジイル基、

2-ウンデシン-1, 11-ジイル基、3-ウンデシン-1, 11-ジイル基、4-ウンデシン-1, 11-ジイル基、5-ウンデシン-1, 11-ジイル基、6-ウンデシン-1, 11-ジイル基、7-ウンデシン-1, 11-ジイル基、8-ウンデシン-1, 11-ジイル基、9-ウンデシン-1, 11-ジイル基、

【0061】

2-ドデシン-1, 12-ジイル基、3-ドデシン-1, 12-ジイル基、4-ドデシン-1, 12-ジイル基、5-ドデシン-1, 12-ジイル基、6-ドデシン-1, 12-ジイル基、7-ドデシン-1, 12-ジイル基、8-ドデシン-1, 12-ジイル基、9-ドデシン-1, 12-ジイル基、10-ドデシン-1, 12-ジイル基、

2-トリデシン-1, 13-ジイル基、3-トリデシン-1, 13-ジイル基、4-トリデシン-1, 13-ジイル基、5-トリデシン-1, 13-ジイル基、6-トリデシン-1, 13-ジイル基、7-トリデシン-1, 13-ジイル基、8-トリデシン-1, 13-ジイル基、9-トリデシン-1, 13-ジイル基、10-トリデシン-1, 13-ジイル基、11-トリデシン-1, 13-ジイル基、

2-テトラデシン-1, 14-ジイル基、3-テトラデシン-1, 14-ジイル基、4-テトラデシン-1, 14-ジイル基、5-テトラデシン-1, 14-ジイル基、6-テトラデシン-1, 14-ジイル基、7-テトラデシン-1, 14-ジイル基、8-テトラデシン-1, 14-ジイル基、9-テトラデシン-1,

14-ジイル基、10-テトラデシン-1, 14-ジイル基、11-テトラデシン-1, 14-ジイル基、12-テトラデシン-1, 14-ジイル基、
2-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、3-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、4-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、5-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、6-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、7-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、8-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、9-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、10-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、11-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、12-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、13-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、

2-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、3-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、4-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、5-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、6-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、7-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、8-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、9-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、10-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、11-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、12-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、13-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、14-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、

【0062】

2-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、3-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、4-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、5-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、6-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、7-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、8-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、9-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、10-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、11-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、12-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、13-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、14-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、15-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、

2-オクタデシン-1, 18-ジイル基、3-オクタデシン-1, 18-ジイル基、4-オクタデシン-1, 18-ジイル基、5-オクタデシン-1, 18-ジイル基、6-オクタデシン-1, 18-ジイル基、7-オクタデシン-1, 18-ジイル基、8-オクタデシン-1, 18-ジイル基、9-オクタデシン-1,

18-ジイル基、10-オクタデシン-1, 18-ジイル基、11-オクタデシン-1, 18-ジイル基、12-オクタデシン-1, 18-ジイル基、13-オクタデシン-1, 18-ジイル基、14-オクタデシン-1, 18-ジイル基、15-オクタデシン-1, 18-ジイル基、16-オクタデシン-1, 18-ジイル基、

2-ノナデシン-1, 19-ジイル基、3-ノナデシン-1, 19-ジイル基、4-ノナデシン-1, 19-ジイル基、5-ノナデシン-1, 19-ジイル基、6-ノナデシン-1, 19-ジイル基、7-ノナデシン-1, 19-ジイル基、8-ノナデシン-1, 19-ジイル基、9-ノナデシン-1, 19-ジイル基、10-ノナデシン-1, 19-ジイル基、11-ノナデシン-1, 19-ジイル基、12-ノナデシン-1, 19-ジイル基、13-ノナデシン-1, 19-ジイル基、14-ノナデシン-1, 19-ジイル基、15-ノナデシン-1, 19-ジイル基、16-ノナデシン-1, 19-ジイル基、17-ノナデシン-1, 19-ジイル基、

2-イコシン-1, 20-ジイル基、3-イコシン-1, 20-ジイル基、4-イコシン-1, 20-ジイル基、5-イコシン-1, 20-ジイル基、6-イコシン-1, 20-ジイル基、7-イコシン-1, 20-ジイル基、8-イコシン-1, 20-ジイル基、9-イコシン-1, 20-ジイル基、10-イコシン-1, 20-ジイル基、11-イコシン-1, 20-ジイル基、12-イコシン-1, 20-ジイル基、13-イコシン-1, 20-ジイル基、14-イコシン-1, 20-ジイル基、15-イコシン-1, 20-ジイル基、16-イコシン-1, 20-ジイル基、17-イコシン-1, 20-ジイル基、18-イコシン-1, 20-ジイル基、

2-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、3-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、4-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、5-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、6-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、7-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、8-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、9-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、10-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、11-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、12-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、13-ヘニコシン-1, 21-ジ

イル基、14-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、15-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、16-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、17-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、18-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、19-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、

2-ドコシン-1, 22-ジイル基、3-ドコシン-1, 22-ジイル基、4-ドコシン-1, 22-ジイル基、5-ドコシン-1, 22-ジイル基、6-ドコシン-1, 22-ジイル基、7-ドコシン-1, 22-ジイル基、8-ドコシン-1, 22-ジイル基、9-ドコシン-1, 22-ジイル基、10-ドコシン-1, 22-ジイル基、11-ドコシン-1, 22-ジイル基、12-ドコシン-1, 22-ジイル基、13-ドコシン-1, 22-ジイル基、14-ドコシン-1, 22-ジイル基、15-ドコシン-1, 22-ジイル基、16-ドコシン-1, 22-ジイル基、17-ドコシン-1, 22-ジイル基、18-ドコシン-1, 22-ジイル基、19-ドコシン-1, 22-ジイル基、20-ドコシン-1, 22-ジイル基、

2-トリコシン-1, 23-ジイル基、3-トリコシン-1, 23-ジイル基、4-トリコシン-1, 23-ジイル基、5-トリコシン-1, 23-ジイル基、6-トリコシン-1, 23-ジイル基、7-トリコシン-1, 23-ジイル基、8-トリコシン-1, 23-ジイル基、9-トリコシン-1, 23-ジイル基、10-トリコシン-1, 23-ジイル基、11-トリコシン-1, 23-ジイル基、12-トリコシン-1, 23-ジイル基、13-トリコシン-1, 23-ジイル基、14-トリコシン-1, 23-ジイル基、15-トリコシン-1, 23-ジイル基、16-トリコシン-1, 23-ジイル基、17-トリコシン-1, 23-ジイル基、18-トリコシン-1, 23-ジイル基、19-トリコシン-1, 23-ジイル基、20-トリコシン-1, 23-ジイル基、21-トリコシン-1, 23-ジイル基、

【0063】

2-テトラコシン-1, 24-ジイル基、3-テトラコシン-1, 24-ジイル基、4-テトラコシン-1, 24-ジイル基、5-テトラコシン-1, 24-ジイル基、6-テトラコシン-1, 24-ジイル基、7-テトラコシン-1, 24

-ジイル基、8-テトラコシン-1, 24-ジイル基、9-テトラコシン-1,
 24-ジイル基、10-テトラコシン-1, 24-ジイル基、11-テトラコシ
 ン-1, 24-ジイル基、12-テトラコシン-1, 24-ジイル基、13-テ
 トラコシン-1, 24-ジイル基、14-テトラコシン-1, 24-ジイル基、
 15-テトラコシン-1, 24-ジイル基、16-テトラコシン-1, 24-ジ
 イル基、17-テトラコシン-1, 24-ジイル基、18-テトラコシン-1,
 24-ジイル基、19-テトラコシン-1, 24-ジイル基、20-テトラコシ
 ン-1, 24-ジイル基、21-テトラコシン-1, 24-ジイル基、22-テ
 トラコシン-1, 24-ジイル基、

2-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、3-ペンタコシン-1, 25-ジイル
 基、4-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、5-ペンタコシン-1, 25-ジ
 イル基、6-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、7-ペンタコシン-1, 25
 -ジイル基、8-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、8-ペンタコシン-1,
 25-ジイル基、9-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、10-ペンタコシン
 -1, 25-ジイル基、11-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、12-ペン
 タコシン-1, 25-ジイル基、13-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、1
 4-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、15-ペンタコシン-1, 25-ジイ
 ル基、16-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、17-ペンタコシン-1, 2
 5-ジイル基、18-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、19-ペンタコシン
 -1, 25-ジイル基、20-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、21-ペン
 タコシン-1, 25-ジイル基、22-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、2
 3-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、

【0064】

2-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、3-ヘキサコシン-1, 26-ジイル
 基、4-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、5-ヘキサコシン-1, 26-ジ
 イル基、6-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、7-ヘキサコシン-1, 26
 -ジイル基、8-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、9-ヘキサコシン-1,
 26-ジイル基、10-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、11-ヘキサコシ
 ン-1, 26-ジイル基、12-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、13-ヘ

キサコシン-1, 26-ジイル基、14-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、
 15-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、16-ヘキサコシン-1, 26-ジ
 イル基、17-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、18-ヘキサコシン-1,
 26-ジイル基、19-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、20-ヘキサコシ
 ン-1, 26-ジイル基、21-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、22-ヘ
 キサコシン-1, 26-ジイル基、23-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、
 24-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、
 2-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、3-ヘプタコシン-1, 27-ジイル
 基、4-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、5-ヘプタコシン-1, 27-ジ
 イル基、6-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、7-ヘプタコシン-1, 27
 -ジイル基、8-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、9-ヘプタコシン-1,
 27-ジイル基、10-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、11-ヘプタコシ
 ン-1, 27-ジイル基、12-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、13-ヘ
 プタコシン-1, 27-ジイル基、14-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、
 15-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、16-ヘプタコシン-1, 27-ジ
 イル基、17-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、18-ヘプタコシン-1,
 27-ジイル基、19-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、20-ヘプタコシ
 ン-1, 27-ジイル基、21-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、22-ヘ
 プタコシン-1, 27-ジイル基、23-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、
 24-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、25-ヘプタコシン-1, 27-ジ
 イル基、

【0065】

2-オクタコシン-1, 28-ジイル基、3-オクタコシン-1, 28-ジイル
 基、4-オクタコシン-1, 28-ジイル基、5-オクタコシン-1, 28-ジ
 イル基、6-オクタコシン-1, 28-ジイル基、7-オクタコシン-1, 28
 -ジイル基、8-オクタコシン-1, 28-ジイル基、9-オクタコシン-1,
 28-ジイル基、10-オクタコシン-1, 28-ジイル基、11-オクタコシ
 ン-1, 28-ジイル基、12-オクタコシン-1, 28-ジイル基、13-オ
 クタコシン-1, 28-ジイル基、14-オクタコシン-1, 28-ジイル基、

15-オクタコシン-1, 28-ジイル基、16-オクタコシン-1, 28-ジイル基、17-オクタコシン-1, 28-ジイル基、18-オクタコシン-1, 28-ジイル基、19-オクタコシン-1, 28-ジイル基、20-オクタコシン-1, 28-ジイル基、21-オクタコシン-1, 28-ジイル基、22-オクタコシン-1, 28-ジイル基、23-オクタコシン-1, 28-ジイル基、24-オクタコシン-1, 28-ジイル基、25-オクタコシン-1, 28-ジイル基、26-オクタコシン-1, 28-ジイル基、

【0066】

2-ノナコシン-1, 29-ジイル基、3-ノナコシン-1, 29-ジイル基、4-ノナコシン-1, 29-ジイル基、5-ノナコシン-1, 29-ジイル基、6-ノナコシン-1, 29-ジイル基、7-ノナコシン-1, 29-ジイル基、8-ノナコシン-1, 29-ジイル基、9-ノナコシン-1, 29-ジイル基、10-ノナコシン-1, 29-ジイル基、11-ノナコシン-1, 29-ジイル基、12-ノナコシン-1, 29-ジイル基、13-ノナコシン-1, 29-ジイル基、14-ノナコシン-1, 29-ジイル基、15-ノナコシン-1, 29-ジイル基、16-ノナコシン-1, 29-ジイル基、17-ノナコシン-1, 29-ジイル基、18-ノナコシン-1, 29-ジイル基、19-ノナコシン-1, 29-ジイル基、20-ノナコシン-1, 29-ジイル基、21-ノナコシン-1, 29-ジイル基、22-ノナコシン-1, 29-ジイル基、23-ノナコシン-1, 29-ジイル基、24-ノナコシン-1, 29-ジイル基、25-ノナコシン-1, 29-ジイル基、26-ノナコシン-1, 29-ジイル基、27-ノナコシン-1, 29-ジイル基、

【0067】

2-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、3-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、4-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、5-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、6-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、7-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、8-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、9-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、10-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、11-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、12-トリアコンチン-1, 3

0-ジイル基、13-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、14-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、15-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、16-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、17-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、18-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、19-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、20-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、21-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、22-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、23-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、24-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、25-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、26-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、27-トリアコンチン-1, 30-ジイル基、及び28-トリアコンチン-1, 30-ジイル基等の直鎖状のアルキニレン基、

【0068】

並びに3-メチル-1-ブチン-1, 4-ジイル基、2-メチル-3-ブチン-1, 4-ジイル基、4-メチル-2-ペンチン-1, 5-ジイル基、2-メチル-3-ペンチン-1, 5-ジイル基、4-エチル-2-ヘキシン-1, 6-ジイル基、5-メチル-3-ヘキシン-1, 6-ジイル基、2-メチル-4-ヘキシン-1, 6-ジイル基、5-エチル-6-メチル-2-ヘプチン-1, 7-ジイル基、5-メチル-3-ヘプチン-1, 7-ジイル基、3-n-プロピル-4-ヘプチン-1, 7-ジイル基、4, 4-ジメチル-5-ヘプチン-1, 7-ジイル基、6-メチル-2, 4-ヘプタジイン-1, 7-ジイル基、4-メチル-2, 5-ヘプタジイン-1, 7-ジイル基、2-メチル-3, 5-ヘプタジイン-1, 7-ジイル基、4-エチル-6, 6-ジメチル-2-オクチン-1, 8-ジイル基、5-n-プロピル-3-オクチン-1, 8-ジイル基、3-エチル-4-オクチン-1, 8-ジイル基、4-エチル-2-メチル-5-オクチン-1, 8-ジイル基、3, 4, 5-トリメチル-6-オクチン-1, 8-ジイル基、7-メチル-2, 4-オクタジイン-1, 8-ジイル基、4-メチル-2, 5-オクタジイン-1, 8-ジイル基、5-n-プロピル-2, 6-オクタジイン-1, 8-ジイル基、5-エチル-2-ノニン-1, 9-ジイル基、5, 6, 7-トリメチル-3-ノニン-1, 9-ジイル基、2, 3, 6, 7-テトラメチル-4-ノニン-1, 9-ジイル基、3, 4-ジエチル-5-ノニン-1, 9-ジイル

基、4-*i*-プロピル-6-ノニン-1, 9-ジイル基、3-エチル-7-ノニン-1, 9-ジイル基、5-*n*-ブチル-2-デシン-1, 10-ジイル基、6-*i*-プロピル-3-デシン-1, 10-ジイル基、7-エチル-4-デシン-1, 10-ジイル基、3, 7-ジメチル-5-デシン-1, 10-ジイル基、4-エチル-6-デシン-1, 10-ジイル基、5-メチル-7-デシン-1, 10-ジイル基、6-エチル-4-メチル-8-デシン-1, 10-ジイル基、6-メチル-2-ウンデシン-1, 11-ジイル基、6-エチル-3-ウンデシン-1, 11-ジイル基、7-メチル-4-ウンデシン-1, 11-ジイル基、7-エチル-5-ウンデシン-1, 11-ジイル基、5-メチル-6-ウンデシン-1, 11-ジイル基、9-エチル-7-ウンデシン-1, 11-ジイル基、3-メチル-8-ウンデシン-1, 11-ジイル基、4-エチル-9-ウンデシン-1, 11-ジイル基、

【0069】

5-エチル-2-ドデシン-1, 12-ジイル基、6-メチル-3-ドデシン-1, 12-ジイル基、8-エチル-4-ドデシン-1, 12-ジイル基、8-メチル-5-ドデシン-1, 12-ジイル基、9-エチル-6-ドデシン-1, 12-ジイル基、6-メチル-7-ドデシン-1, 12-ジイル基、10-エチル-8-ドデシン-1, 12-ジイル基、2-メチル-9-ドデシン-1, 12-ジイル基、5-エチル-10-ドデシン-1, 12-ジイル基、4, 7, 9-トリメチル-2-トリデシン-1, 13-ジイル基、10-メチル-3-トリデシン-1, 13-ジイル基、8-エチル-4-トリデシン-1, 13-ジイル基、4-メチル-5-トリデシン-1, 13-ジイル基、5-エチル-6-トリデシン-1, 13-ジイル基、3, 6-ジエチル-7-トリデシン-1, 13-ジイル基、5-メチル-8-トリデシン-1, 13-ジイル基、7-エチル-9-トリデシン-1, 13-ジイル基、4-メチル-10-トリデシン-1, 13-ジイル基、6-エチル-11-トリデシン-1, 13-ジイル基、

7-メチル-2-テトラデシン-1, 14-ジイル基、8-エチル-3-テトラデシン-1, 14-ジイル基、6-*n*-プロピル-4-テトラデシン-1, 14-ジイル基、8-メチル-5-テトラデシン-1, 14-ジイル基、3-エチル

6-テトラデシン-1, 14-ジイル基、10-メチル-7-テトラデシン-1, 14-ジイル基、6-i-プロピル-8-テトラデシン-1, 14-ジイル基、5, 7, 11-トリメチル-9-テトラデシン-1, 14-ジイル基、5-エチル-10-テトラデシン-1, 14-ジイル基、6-メチル-11-テトラデシン-1, 14-ジイル基、4-n-ブチル-12-テトラデシン-1, 14-ジイル基、

【0070】

4-メチル-2-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、6-エチル-3-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、8-メチル-4-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、10-エチル-5-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、4, 9-ジメチル-6-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、10-エチル-7-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、6-メチル-8-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、8-n-プロピル-9-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、5-メチル-10-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、4, 7-ジエチル-11-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、5-メチル-12-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、8-エチル-13-ペンタデシン-1, 15-ジイル基、

【0071】

8-i-プロピル-2-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、6-メチル-3-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、8-エチル-4-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、9-メチル-5-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、10-エチル-6-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、5-メチル-7-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、5, 11-ジメチル-8-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、5-エチル-9-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、7, 13-ジエチル-10-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、5-エチル-7-メチル-11-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、5-メチル-12-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、8-s-ブチル-13-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、5-エチル-14-ヘキサデシン-1, 16-ジイル基、

【0072】

11-メチル-2-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、9-エチル-3-ヘプ

タデシン-1, 17-ジイル基、7-i-プロピル-4-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、8-メチル-5-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、4-エチル-6-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、10-メチル-7-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、5, 11-ジメチル-8-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、5-エチル-9-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、8-エチル-10-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、7-メチル-11-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、5-i-プロピル-12-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、9-エチル-13-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、8-メチル-14-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、7-s-ブチル-15-ヘプタデシン-1, 17-ジイル基、

【0073】

10, 15-ジメチル-2-オクタデシン-1, 18-ジイル基、6-エチル-3-オクタデシン-1, 18-ジイル基、10-メチル-4-オクタデシン-1, 18-ジイル基、11-メチル-5-オクタデシン-1, 18-ジイル基、12-エチル-6-オクタデシン-1, 18-ジイル基、10-メチル-7-オクタデシン-1, 18-ジイル基、5-メチル-8-オクタデシン-1, 18-ジイル基、7-エチル-9-オクタデシン-1, 18-ジイル基、7-メチル-10-オクタデシン-1, 18-ジイル基、8-n-ブチル-11-オクタデシン-1, 18-ジイル基、7-メチル-12-オクタデシン-1, 18-ジイル基、9-エチル-13-オクタデシン-1, 18-ジイル基、10-i-プロピル-14-オクタデシン-1, 18-ジイル基、7-メチル-15-オクタデシン-1, 18-ジイル基、10-エチル-16-オクタデシン-1, 18-ジイル基、

【0074】

10-メチル-2-ノナデシン-1, 19-ジイル基、10, 12-ジエチル-3-ノナデシン-1, 19-ジイル基、7-メチル-4-ノナデシン-1, 19-ジイル基、9-エチル-5-ノナデシン-1, 19-ジイル基、9-n-プロピル-6-ノナデシン-1, 19-ジイル基、10-メチル-7-ノナデシン-1, 19-ジイル基、12-i-プロピル-8-ノナデシン-1, 19-ジイル

基、5, 15-ジメチル-9-ノナデシン-1, 19-ジイル基、7-エチル-13-メチル-10-ノナデシン-1, 19-ジイル基、6-メチル-11-ノナデシン-1, 19-ジイル基、6-エチル-12-ノナデシン-1, 19-ジイル基、7, 16-ジエチル-13-ノナデシン-1, 19-ジイル基、9-s-ブチル-14-ノナデシン-1, 19-ジイル基、8-メチル-15-ノナデシン-1, 19-ジイル基、10-エチル-16-ノナデシン-1, 19-ジイル基、10-i-プロピル-17-ノナデシン-1, 19-ジイル基、

【0075】

8-メチル-2-イコシン-1, 20-ジイル基、6-エチル-3-イコシン-1, 20-ジイル基、10-i-プロピル-4-イコシン-1, 20-ジイル基、11-n-プロピル-5-イコシン-1, 20-ジイル基、12-メチル-6-イコシン-1, 20-ジイル基、11-エチル-7-イコシン-1, 20-ジイル基、13-n-プロピル-8-イコシン-1, 20-ジイル基、6-i-プロピル-9-イコシン-1, 20-ジイル基、5-n-プロピル-10-イコシン-1, 20-ジイル基、7-メチル-11-イコシン-1, 20-ジイル基、8-エチル-12-イコシン-1, 20-ジイル基、10-n-プロピル-13-イコシン-1, 20-ジイル基、9-i-プロピル-14-イコシン-1, 20-ジイル基、10-n-ブチル-15-イコシン-1, 20-ジイル基、8-s-ブチル-16-イコシン-1, 20-ジイル基、7-i-ブチル-17-イコシン-1, 20-ジイル基、9-メチル-18-イコシン-1, 20-ジイル基、

【0076】

11-メチル-2-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、12-n-ブチル-3-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、10-n-ペンチル-4-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、8-エチル-5-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、10-i-プロピル-6-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、5-n-プロピル-7-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、13-n-ブチル-8-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、15-s-ブチル-9-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、5-メチル-10-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、15-エチル-6-メチル-1

1-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、8-エチル-12-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、7-メチル-13-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、11-エチル-14-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、6-エチル-15-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、9-メチル-16-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、5-エチル-9-メチル-17-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、10, 10-ジメチル-18-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、9-エチル-19-ヘニコシン-1, 21-ジイル基、

【0077】

11-メチル-2-ドコシン-1, 22-ジイル基、12-エチル-3-ドコシン-1, 22-ジイル基、13-i-プロピル-4-ドコシン-1, 22-ジイル基、10-n-プロピル-5-ドコシン-1, 22-ジイル基、10-n-ブチル-6-ドコシン-1, 22-ジイル基、15-s-ブチル-7-ドコシン-1, 22-ジイル基、11-i-ブチル-8-ドコシン-1, 22-ジイル基、5, 15-ジメチル-9-ドコシン-1, 22-ジイル基、8, 14-ジエチル-10-ドコシン-1, 22-ジイル基、5-メチル-11-ドコシン-1, 22-ジイル基、7-エチル-12-ドコシン-1, 22-ジイル基、10-メチル-13-ドコシン-1, 22-ジイル基、10-エチル-14-ドコシン-1, 22-ジイル基、9-エチル-15-ドコシン-1, 22-ジイル基、8-メチル-16-ドコシン-1, 22-ジイル基、7-i-プロピル-17-ドコシン-1, 22-ジイル基、10-i-ブチル-18-ドコシン-1, 22-ジイル基、9, 10-ジメチル-19-ドコシン-1, 22-ジイル基、13-エチル-20-ドコシン-1, 22-ジイル基、

【0078】

19-メチル-2-トリコシン-1, 23-ジイル基、10, 15-ジメチル-3-トリコシン-1, 23-ジイル基、3, 11, 16-トリメチル-4-トリコシン-1, 23-ジイル基、12-エチル-5-トリコシン-1, 23-ジイル基、6, 13-ジエチル-6-トリコシン-1, 23-ジイル基、4, 12, 18-トリエチル-7-トリコシン-1, 23-ジイル基、18-i-プロピル-8-トリコシン-1, 23-ジイル基、14-n-プロピル-9-トリコシン

-1, 23-ジイル基、8-n-ブチル-10-トリコシン-1, 23-ジイル基、15-s-ブチル-11-トリコシン-1, 23-ジイル基、5-i-ブチル-12-トリコシン-1, 23-ジイル基、7-エチル-9-メチル-13-トリコシン-1, 23-ジイル基、9-メチル-14-トリコシン-1, 23-ジイル基、4, 18-ジメチル-15-トリコシン-1, 23-ジイル基、3, 4, 11-トリメチル-16-トリコシン-1, 23-ジイル基、9-エチル-17-トリコシン-1, 23-ジイル基、10, 13-ジエチル-18-トリコシン-1, 23-ジイル基、5, 8, 15-トリエチル-19-トリコシン-1, 23-ジイル基、15-i-プロピル-20-トリコシン-1, 23-ジイル基、17-n-プロピル-21-トリコシン-1, 23-ジイル基、

【0079】

16-n-ブチル-2-テトラコシン-1, 24-ジイル基、11-s-ブチル-3-テトラコシン-1, 24-ジイル基、8-i-ブチル-4-テトラコシン-1, 24-ジイル基、18-エチル-9-メチル-5-テトラコシン-1, 24-ジイル基、13-メチル-6-テトラコシン-1, 24-ジイル基、4, 19-ジメチル-7-テトラコシン-1, 24-ジイル基、5, 11, 17-トリエチル-8-テトラコシン-1, 24-ジイル基、6-エチル-9-テトラコシン-1, 24-ジイル基、7, 16-ジエチル-10-テトラコシン-1, 24-ジイル基、5, 9, 18-トリエチル-11-テトラコシン-1, 24-ジイル基、10-n-プロピル-12-テトラコシン-1, 24-ジイル基、20-i-プロピル-13-テトラコシン-1, 24-ジイル基、9-n-ブチル-14-テトラコシン-1, 24-ジイル基、11-s-ブチル-15-テトラコシン-1, 24-ジイル基、13-i-ブチル-16-テトラコシン-1, 24-ジイル基、10-エチル-13-メチル-17-テトラコシン-1, 24-ジイル基、6-メチル-18-テトラコシン-1, 24-ジイル基、5, 7-ジメチル-19-テトラコシン-1, 24-ジイル基、4, 8, 13-トリメチル-20-テトラコシン-1, 24-ジイル基、18-エチル-21-テトラコシン-1, 24-ジイル基、6, 10-ジエチル-22-テトラコシン-1, 24-ジイル基、

【0080】

9, 13, 16-トリメチル-2-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、12-n-プロピル-3-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、11-i-プロピル-4-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、20-n-ブチル-5-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、17-i-ブチル-6-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、15-s-ブチル-7-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、15-エチル-23-メチル-8-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、11-メチル-8-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、13, 17-ジメチル-9-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、5, 8, 21-トリメチル-10-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、17-エチル-11-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、8, 18-ジエチル-12-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、10, 15, 18-トリメチル-13-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、4-n-プロピル-14-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、20-i-プロピル-15-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、8-n-ブチル-16-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、11-s-ブチル-17-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、5, 22-ジメチル-18-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、5-i-ブチル-19-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、9-メチル-13-エチル-20-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、15-メチル-21-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、6, 13-ジメチル-22-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、4, 8, 12-トリメチル-23-ペンタコシン-1, 25-ジイル基、

【0081】

13-エチル-2-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、5, 16-ジエチル-3-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、7, 11, 16-トリメチル-4-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、12-n-プロピル-5-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、21-i-プロピル-6-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、6-n-ブチル-7-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、13-s-ブチル-8-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、19-i-ブチル-9-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、13-エチル-18-メチル-10-ヘキサコシン

-1, 26-ジイル基、10-メチル-11-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、10, 20-ジメチル-12-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、7, 9, 17-トリメチル-13-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、8-エチル-14-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、5, 22-ジエチル-15-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、7, 10, 21-トリメチル-16-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、15-n-プロピル-17-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、13-i-プロピル-18-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、8-n-ブチル-19-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、11-s-ブチル-20-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、14-i-ブチル-21-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、5-エチル-21-メチル-22-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、7-メチル-23-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、8, 14-ジメチル-24-ヘキサコシン-1, 26-ジイル基、

【0082】

7, 16, 24-トリメチル-2-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、9-エチル-3-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、7, 16-ジメチル-4-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、9, 13, 21-トリメチル-5-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、13-n-プロピル-6-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、10-i-プロピル-7-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、16-n-プロピル-8-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、18-メチル-9-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、9-i-プロピル-10-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、15-エチル-7-メチル-11-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、25-メチル-12-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、8, 21-ジメチル-13-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、5, 11, 23-トリメチル-14-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、9-エチル-15-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、8, 20-ジメチル-16-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、4, 8, 19-トリメチル-17-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、7-n-プロピル-18-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、21-i-プロピル-19-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、14-n-プロピル-20-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、8-エチル-21-ヘプタ

コシン-1, 27-ジイル基、11-*i*-プロピル-22-ヘプタコシン-1,
27-ジイル基、5-エチル-13-メチル-23-ヘプタコシン-1, 27-
ジイル基、16-メチル-24-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、7-エチ
ル-25-ヘプタコシン-1, 27-ジイル基、

【0083】

14-エチル-2-オクタコシン-1, 28-ジイル基、20-メチル-3-オ
クタコシン-1, 28-ジイル基、7, 22-ジメチル-4-オクタコシン-1
, 28-ジイル基、19-エチル-5-オクタコシン-1, 28-ジイル基、1
1-メチル-6-オクタコシン-1, 28-ジイル基、13, 16-ジメチル-
7-オクタコシン-1, 28-ジイル基、13-エチル-8-オクタコシン-1
, 28-ジイル基、6-メチル-9-オクタコシン-1, 28-ジイル基、9,
16-ジメチル-10-オクタコシン-1, 28-ジイル基、7-エチル-11
-オクタコシン-1, 28-ジイル基、16-メチル-12-オクタコシン-1
, 28-ジイル基、6, 15-ジメチル-13-オクタコシン-1, 28-ジイ
ル基、22-エチル-14-オクタコシン-1, 28-ジイル基、6-メチル-
15-オクタコシン-1, 28-ジイル基、8, 11-ジメチル-16-オクタ
コシン-1, 28-ジイル基、23-エチル-17-オクタコシン-1, 28-
ジイル基、4-メチル-18-オクタコシン-1, 28-ジイル基、7, 14-
ジメチル-19-オクタコシン-1, 28-ジイル基、13-エチル-20-オ
クタコシン-1, 28-ジイル基、8-メチル-21-オクタコシン-1, 28
-ジイル基、11, 17-ジメチル-22-オクタコシン-1, 28-ジイル基
、10-エチル-23-オクタコシン-1, 28-ジイル基、9-メチル-24
-オクタコシン-1, 28-ジイル基、7, 19-ジメチル-25-オクタコシ
ン-1, 28-ジイル基、12-エチル-26-オクタコシン-1, 28-ジイ
ル基、

【0084】

15-メチル-2-ノナコシン-1, 29-ジイル基、14-メチル-3-ノナ
コシン-1, 29-ジイル基、12-メチル-4-ノナコシン-1, 29-ジイ
ル基、13-メチル-5-ノナコシン-1, 29-ジイル基、11-メチル-6

-ノナコシン-1, 29-ジイル基、10-メチル-7-ノナコシン-1, 29-
 -ジイル基、25-メチル-8-ノナコシン-1, 29-ジイル基、24-メチ
 ル-9-ノナコシン-1, 29-ジイル基、23-メチル-10-ノナコシン-
 1, 29-ジイル基、22-メチル-11-ノナコシン-1, 29-ジイル基、
 21-メチル-12-ノナコシン-1, 29-ジイル基、20-メチル-13-
 ノナコシン-1, 29-ジイル基、19-メチル-14-ノナコシン-1, 29-
 -ジイル基、18-メチル-15-ノナコシン-1, 29-ジイル基、27-メ
 チル-16-ノナコシン-1, 29-ジイル基、26-メチル-17-ノナコシ
 ン-1, 29-ジイル基、25-メチル-18-ノナコシン-1, 29-ジイル
 基、24-メチル-19-ノナコシン-1, 29-ジイル基、23-メチル-2
 0-ノナコシン-1, 29-ジイル基、20-メチル-21-ノナコシン-1,
 29-ジイル基、19-メチル-22-ノナコシン-1, 29-ジイル基、18
 -メチル-23-ノナコシン-1, 29-ジイル基、17-メチル-24-ノナ
 コシン-1, 29-ジイル基、16-メチル-25-ノナコシン-1, 29-ジ
 イル基、6-メチル-26-ノナコシン-1, 29-ジイル基、及び5-メチル
 -27-ノナコシン-1, 29-ジイル基等の分岐鎖状のアルキニレン基が挙げ
 られる。

【0085】

代表的には、Gとしては、置換されていてもよい炭素数2~30の直鎖状のアル
 キニレン基が好ましく、置換されていてもよい炭素数2~15の直鎖状のアルキ
 ニレン基がより好ましく、水酸基で置換されていてもよい炭素数2~13の直鎖状
 のアルキニレン基が更に好ましく、中でも、エタン-1, 2-ジイル基、プロパン
 -1, 3-ジイル基、ブタン-1, 4-ジイル基、ペンタン-1, 5-ジイル基
 、ヘキサン-1, 6-ジイル基、ヘプタン-1, 7-ジイル基、オクタン-1,
 8-ジイル基、ノナン-1, 9-ジイル基、デカン-1, 10-ジイル基、ウン
 デカン-1, 11-ジイル基、ドデカン-1, 12-ジイル基、トリデカン-1
 , 13-ジイル基、2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル基、3-ヒドロキ
 シ-オクタン-1, 8-ジイル基、3-ヒドロキシノナン-1, 9-ジイル基、
 及び3-ヒドロキシデカン-1, 10-ジイル基等が特に好ましい。

【0086】

Gとして挙げられる、置換されていてもよい炭素数2～30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキレン基、置換されていてもよい炭素数2～30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニレン基、及び置換されていてもよい炭素数2～30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニレン基は、その1位でAと結合し、かつ、その ω 位でEと結合しているか、あるいは、その1位でEと結合し、かつ、その ω 位でAと結合しているが、その1位でAと結合し、かつ、その ω 位でEと結合しているのが好ましい。

【0087】

Eは、単結合又は-O-を示すが、好ましくは、単結合を示す。

【0088】

Jは、単結合、置換されていてもよい芳香族炭化水素基、又は置換されていてもよい複素環基を示すが、単結合であるのが好ましい。

Jにおける置換されていてもよい芳香族炭化水素基、及び置換されていてもよい複素環基における置換基としては、 $-(CH_2)_k-COOR^{7b}$ 、 $-(CH_2)_l-CONR^{8c}R^{9c}$ 、 $-NR^{8d}R^{9d}$ 、及び水酸基等が挙げられる。ここで、k及びlは、独立して、0又は1を示し、 R^{7b} は、水素原子、又は炭素数1～6の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基を示し、 R^{8c} 、 R^{9c} 、 R^{8c} 、及び R^{9d} は、それぞれ独立して、水素原子、又は炭素数1～3の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基を示す。また、この置換基は、Qが単結合以外である場合、存在しないのが好ましく、Qが単結合である場合、 $-(CH_2)_k-COOR^{7b}$ （ここで、k及び R^{7b} は、前記と同義である）であるのが好ましい。なお、Jが置換されている場合、この置換基の数は、1個～4個であり、好ましくは1個である。

【0089】

Jにおける置換されていてもよい芳香族炭化水素基における芳香族炭化水素基の定義は、Arにおける芳香族炭化水素基と同様であるが、好ましくは、p-フェニレン基、及びm-フェニレン基等が挙げられる。

Jにおける置換されていてもよい芳香族炭化水素基としては、無置換のp-フ

フェニレン基、無置換の *m*-フェニレン基、及び-COOHで置換されているフェニレン基等が好ましい。

Jにおける置換されていてもよい複素環基の複素環とは、同一又は異なって、酸素原子、窒素原子、硫黄原子などのヘテロ原子1個～4個を含む4員～10員の、単環又は縮合環式の脂肪族環又は芳香族環を意味し、具体例としては、オキセタン、フラン、ジヒドロフラン、テトラヒドロフラン、ピラン、ジヒドロピラン、テトラヒドロピラン、ジオキサール、チオフエン、ジヒドロチオフエン、テトラヒドロチオフエン、チオピラン、ジヒドロチオピラン、テトラヒドロチオピラン、ピロール、ジヒドロピロール、ピロリジン、ピリジン、ジヒドロピリジン、テトラヒドロピリジン、ピペリジン、ピラゾール、2-ピラゾリン、ピラゾリジン、イミダゾール、イミダゾリジン、ピリミジン、ピラジン、ピリダジン、オキサゾリン、ピペラジン、1, 2, 3-トリアゾール、1, 2, 4-トリアゾール、テトラゾール、イソオキサゾール、1, 3-オキサゾール、1, 2, 3-オキサジアゾール、1, 2, 4-オキサジアゾール、1, 2, 5-オキサジアゾール、1, 3, 4-オキサジアゾール、1, 2-チアゾール、1, 3-チアゾール、1, 2, 3-チアジアゾール、1, 2, 4-チアジアゾール、1, 2, 5-チアジアゾール、1, 3, 4-チアジアゾール、1, 3-ジオキサラン、1, 4-ジオキサン、オキサゾリジン、モルホリン、インドール、キノリン、イソキノリン、ベンゾピラン、ベンゾフラン、ベンゾチオフエン、ベンゾジアゾール、ベンゾオキサゾール、及びベンゾチアゾール等が挙げられるが、好ましくは、フラン、及びオキサゾール等が挙げられる。Jにおける複素環基は、これらの複素環中の、置換基を有する位置を除いた異なる2つの位置に、1個ずつ結合手を有する基を意味するが、好ましくは、フラン-2, 5-ジイル基、1, 3-オキサゾール-2, 4-ジイル基、及び1, 3-オキサゾール-2, 5-ジイル基等が挙げられる。

Jにおける置換されていてもよい複素環基としては、無置換のフラン-2, 5-ジイル基、無置換の1, 3-オキサゾール-2, 4-ジイル基、及び無置換の1, 3-オキサゾール-2, 5-ジイル基等が好ましい。

Jにおける置換されていてもよい芳香族炭化水素基、及び置換されていてもよ

い複素環基は、2個の結合手のいずれか一方でEと結合し、もう一方でYと結合していれば、どちらの一方でEと結合していてもよいが、好ましくは、1, 3-オキサゾール-2, 4-ジイル基においては、4位でEと結合し、1, 3-オキサゾール-2, 5-ジイル基においては、5位でEと結合している。

【0090】

Yは、単結合又は-O-を示すが、好ましくは単結合を示す。

【0091】

Lは、単結合、炭素数1～10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキレン基、炭素数2～10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニレン基、又は炭素数2～10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニレン基を示すが、単結合が好ましく、また、Jが置換されていてもよい芳香族炭化水素基であり、かつYが単結合である場合は、Lは、単結合、及び炭素数1～5の直鎖状のアルキレン基が好ましく、中でも単結合、及び炭素数1～3の直鎖状のアルキレン基が好ましく、単結合及びプロパン-1, 3-ジイル基が特に好ましく、Jが置換されていてもよい芳香族炭化水素基であり、かつYが-O-である場合は、Lは、炭素数1～5の直鎖状のアルキレン基が好ましく、中でも炭素数2～3の直鎖状のアルキレン基が好ましい。

【0092】

Lにおける、炭素数1～10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキレン基、炭素数2～10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニレン基、炭素数2～10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニレン基、炭素数1～5の直鎖状のアルキレン基、炭素数1～3の直鎖状のアルキレン基、及び炭素数2～3の直鎖状のアルキレン基の具体例としては、Gにおける、置換されていてもよい炭素数2～30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキレン基、置換されていてもよい炭素数2～30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニレン基、及び置換されていてもよい炭素数2～30の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニレン基の具体例として列挙したものの中から、該当するものを選択し、更にメチレン基を追加して列挙することができる。























また、2つの結合手の一方でYと結合し、もう一方でQと結合しているという条件を満たせば、どちらの結合手がYと結合していてもよい。

【0093】

Qは、単結合、又は下記式：

【0094】


【化9】



【0095】

【0096】

【化 10】




【0097】

、及び

【0098】

【化 11】



【0099】

(ここで、 R^7 は、水素原子、又は炭素数 1～6 の直鎖もしくは分岐鎖状の低級アルキル基を示し、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、及び R^{11} は、それぞれ独立して、水素原子、又は炭素数 1～3 の直鎖もしくは分岐鎖状の低級アルキル基を示す。)
 から選択される 1 つの基を示すが、 Q が、 Q^2 (ここで、 Q^2 としては、単結合、 Q^{62} 、 Q^{63} 、 Q^{64} 、 Q^3 (更にここで、 R^8 は、前記と同義である。)、 Q^4 (更にここで、 R^8 は、前記と同義である。)、 Q^{17} (更にここで、 R^7 は、前記と同義である。)、 Q^{32} (更にここで、 R^7 は、前記と同義である

。)、及び Q^{27} (更にここで、 R^7 は、前記と同義である。)が挙げられる。
 }であるのが好ましく、抗アンドロゲン活性の強さの点では、 Q が、 Q^{62} 、 Q^{63} 、及び Q^{64} であるもの、並びに R^8 が水素原子である Q^3 、及び R^8 が水素原子である Q^4 が更に好ましく、 Q^{62} 、 Q^{63} 、 Q^{64} 、及び R^8 が水素原子である Q^3 が特に好ましく、 Q^{62} 、 Q^{63} 、及び Q^{64} であるものが更に特に好ましい。また、経口吸収性の点では、 Q が、 R^7 が水素原子である Q^{17} 、 R^7 が水素原子である Q^{32} 、及び R^7 が水素原子である Q^{27} が更に好ましい。また、 Z が、 $-COOH$ である場合は、経口吸収性の点では、 Q が、単結合であるのも好ましい。

Q においては、*を付した位置で L と結合し、**を付した位置で Z と結合している。

【0100】

Z は、水素原子、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数1~10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数2~10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニル基、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数2~10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニル基、 $-O-R^d$ (ここで、 R^d は、水素原子、又は水酸基の保護基を示す)、又は $-COOH$ を示す。

Z における、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数1~10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数2~10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニル基、及びハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数2~10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニル基の、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられるが、好ましくはフッ素原子が挙げられる。置換されているハロゲン原子の数は、1個~10個であり、好ましくは、3個~9個、特に好ましくは5個である。その置換様式としては、ある1つの炭素原子上の全ての水素原子がハロゲン原子で置換されている (例えば、トリハロメチル基、1, 1, 3, 3, 3-ペンタハロプロピル基等が挙げられる。)のが好ましい。

【0101】

Zにおける、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数1～10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基の、炭素数1～10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、n-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、n-ノニル基、及びn-デシル基である直鎖状のアルキル基、並びに1-メチルエチル基、1-メチルプロピル基、2-メチルプロピル基、1-メチルブチル基、2-メチルブチル基、3-メチルブチル基、1, 1-ジメチルプロピル基、1, 2-ジメチルプロピル基、2, 2-ジメチルプロピル基、1-エチルプロピル基、1-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、3-メチルペンチル基、4-メチルペンチル基、1, 1-ジメチルブチル基、1, 2-ジメチルブチル基、1, 3-ジメチルブチル基、2, 2-ジメチルブチル基、2, 3-ジメチルブチル基、3, 3-ジメチルブチル基、1-エチルブチル基、2-エチルブチル基、1-メチルヘキシル基、2-メチルヘキシル基、3-メチルヘキシル基、4-メチルヘキシル基、5-メチルヘキシル基、1-エチルペンチル基、2-エチルペンチル基、3-エチルペンチル基、1, 1-ジメチルペンチル基、1, 2-ジメチルペンチル基、1, 3-ジメチルペンチル基、1, 4-ジメチルペンチル基、2, 2-ジメチルペンチル基、2, 3-ジメチルペンチル基、2, 4-ジメチルペンチル基、3, 3-ジメチルペンチル基、3, 4-ジメチルペンチル基、3, 3-ジメチルペンチル基、3, 4-ジメチルペンチル基、4, 4-ジメチルペンチル基、1-プロピルブチル基、1-エチル-1-メチルブチル基、1-エチル-2-メチルブチル基、1-エチル-3-メチルブチル基、2-エチル-1-メチルブチル基、2-エチル-2-メチルブチル基、2-エチル-3-メチルブチル基、1, 1, 2-トリメチルブチル基、1, 1, 3-トリメチルブチル基、1, 2, 2-トリメチルブチル基、1, 2, 3-トリメチルブチル基、1, 3, 3-トリメチルブチル基、2, 2, 3-トリメチルブチル基、2, 3, 3-トリメチルブチル基、1-メチルヘプチル基、2-メチルヘプチル基、3-メチルヘプチル基、4-メチルヘプチル基、5-メチルヘプチル基、6-メチルヘプチル基、1-エチルヘキシル基、2-エチルヘキシル基、3-エチルヘキシル基、4-エチルヘキシル基、1, 1-ジメチルヘキシル基、1, 2-ジメチルヘキシル基、1, 3-ジメチル

ルヘキシル基、1, 4-ジメチルヘキシル基、1, 5-ジメチルヘキシル基、2, 2-ジメチルヘキシル基、2, 3-ジメチルヘキシル基、2, 4-ジメチルヘキシル基、2, 5-ジメチルヘキシル基、3, 3-ジメチルヘキシル基、3, 4-ジメチルヘキシル基、3, 5-ジメチルヘキシル基、4, 4-ジメチルヘキシル基、4, 5-ジメチルヘキシル基、5, 5-ジメチルヘキシル基、

【0102】

1-プロピルペンチル基、2-プロピルペンチル基、1-エチル-1-メチルペンチル基、1-エチル-2-メチルペンチル基、1-エチル-3-メチルペンチル基、1-エチル-4-メチルペンチル基、2-エチル-1-メチルペンチル基、2-エチル-2-メチルペンチル基、2-エチル-3-メチルペンチル基、2-エチル-4-メチルペンチル基、3-エチル-1-メチルペンチル基、3-エチル-2-メチルペンチル基、3-エチル-3-メチルペンチル基、3-エチル-4-メチルペンチル基、1, 1, 2-トリメチルペンチル基、1, 1, 3-トリメチルペンチル基、1, 1, 4-トリメチルペンチル基、1, 2, 2-トリメチルペンチル基、1, 2, 3-トリメチルペンチル基、1, 2, 4-トリメチルペンチル基、1, 3, 3-トリメチルペンチル基、1, 3, 4-トリメチルペンチル基、1, 4, 4-トリメチルペンチル基、2, 2, 3-トリメチルペンチル基、2, 2, 4-トリメチルペンチル基、2, 3, 3-トリメチルペンチル基、2, 3, 4-トリメチルペンチル基、2, 4, 4-トリメチルペンチル基、3, 3, 4-トリメチルペンチル基、3, 4, 4-トリメチルペンチル基、1-メチル-1-プロピルブチル基、2-メチル-1-プロピルブチル基、3-メチル-1-プロピルブチル基、1, 1-ジエチルブチル基、1, 2-ジエチルブチル基、2, 2-ジエチルブチル基、1, 2-ジメチル-1-エチルブチル基、1, 3-ジメチル-1-エチルブチル基、2, 2-ジメチル-1-エチルブチル基、2, 3-ジメチル-1-エチルブチル基、3, 3-ジメチル-1-エチルブチル基、1, 1-ジメチル-2-エチルブチル基、1, 2-ジメチル-2-エチルブチル基、1, 3-ジメチル-2-エチルブチル基、2, 3-ジメチル-2-エチルブチル基、3, 3-ジメチル-2-エチルブチル基、1, 1-ジエチル-2-メチルプロピル基、1-メチルオクチル基、2-メチルオクチル基、3-メチルオ

クチル基、4-メチルオクチル基、5-メチルオクチル基、6-メチルオクチル基、7-メチルオクチル基、1-エチルヘプチル基、2-エチルヘプチル基、3-エチルヘプチル基、4-エチルヘプチル基、5-エチルヘプチル基、1, 1-ジメチルヘプチル基、1, 2-ジメチルヘプチル基、1, 3-ジメチルヘプチル基、1, 4-ジメチルヘプチル基、1, 5-ジメチルヘプチル基、1, 6-ジメチルヘプチル基、2, 2-ジメチルヘプチル基、2, 3-ジメチルヘプチル基、2, 4-ジメチルヘプチル基、2, 5-ジメチルヘプチル基、2, 6-ジメチルヘプチル基、3, 3-ジメチルヘプチル基、3, 4-ジメチルヘプチル基、3, 5-ジメチルヘプチル基、3, 6-ジメチルヘプチル基、4, 4-ジメチルヘプチル基、4, 5-ジメチルヘプチル基、4, 6-ジメチルヘプチル基、5, 5-ジメチルヘプチル基、5, 6-ジメチルヘプチル基、6, 6-ジメチルヘプチル基、

【0103】

1-プロピルヘキシル基、2-プロピルヘキシル基、3-プロピルヘキシル基、1-エチル-1-メチルヘキシル基、1-エチル-2-メチルヘキシル基、1-エチル-3-メチルヘキシル基、1-エチル-4-メチルヘキシル基、1-エチル-5-メチルヘキシル基、2-エチル-1-メチルヘキシル基、2-エチル-2-メチルヘキシル基、2-エチル-3-メチルヘキシル基、2-エチル-4-メチルヘキシル基、2-エチル-5-メチルヘキシル基、3-エチル-1-メチルヘキシル基、3-エチル-2-メチルヘキシル基、3-エチル-3-メチルヘキシル基、3-エチル-4-メチルヘキシル基、3-エチル-5-メチルヘキシル基、4-エチル-1-メチルヘキシル基、4-エチル-2-メチルヘキシル基、4-エチル-3-メチルヘキシル基、4-エチル-4-メチルヘキシル基、4-エチル-5-メチルヘキシル基、1, 1, 2-トリメチルヘキシル基、1, 1, 3-トリメチルヘキシル基、1, 1, 4-トリメチルヘキシル基、1, 1, 5-トリメチルヘキシル基、1, 2, 2-トリメチルヘキシル基、1, 2, 3-トリメチルヘキシル基、1, 2, 4-トリメチルヘキシル基、1, 2, 5-トリメチルヘキシル基、1, 3, 3-トリメチルヘキシル基、1, 3, 4-トリメチルヘキシル基、1, 3, 5-トリメチルヘキシル基、

シル基、1, 4, 4-トリメチルヘキシル基、1, 4, 5-トリメチルヘキシル基、1, 5, 5-トリメチルヘキシル基、2, 2, 3-トリメチルヘキシル基、2, 2, 4-トリメチルヘキシル基、2, 2, 5-トリメチルヘキシル基、2, 3, 3-トリメチルヘキシル基、2, 3, 4-トリメチルヘキシル基、2, 3, 5-トリメチルヘキシル基、2, 4, 4-トリメチルヘキシル基、2, 4, 5-トリメチルヘキシル基、2, 5, 5-トリメチルヘキシル基、3, 3, 4-トリメチルヘキシル基、3, 3, 5-トリメチルヘキシル基、3, 4, 4-トリメチルヘキシル基、3, 4, 5-トリメチルヘキシル基、3, 5, 5-トリメチルヘキシル基、4, 4, 5-トリメチルヘキシル基、4, 5, 5-トリメチルヘキシル基、1-メチル-ノニル基、2-メチル-ノニル基、3-メチル-ノニル基、4-メチル-ノニル基、5-メチル-ノニル基、6-メチル-ノニル基、7-メチル-ノニル基、8-メチル-ノニル基、及び9-メチル-ノニル基等の分岐鎖状のアルキル基が挙げられるが、炭素数3~10の直鎖状のアルキル基が好ましく、中でもn-ペンチル基が特に好ましい。

【0104】

Zにおける、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数2~10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニル基の炭素数2~10の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニル基としては、ビニル基、1-プロペニル基、2-プロペニル基、1-ブテニル基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、1, 3-ブタジエニル基、2-ペンテニル基、3-ペンテニル基、2, 4-ペンタジエニル基、2-ヘキセニル基、3-ヘキセニル基、4-ヘキセニル基、2, 4-ヘキサジエニル基、2-ヘプテニル基、3-ヘプテニル基、4-ヘプテニル基、5-ヘプテニル基、2, 4-ヘプタジエニル基、2, 5-ヘプタジエニル基、3, 5-ヘプタジエニル基、2-オクテニル基、3-オクテニル基、4-オクテニル基、5-オクテニル基、6-オクテニル基、2, 4-オクタジエニル基、2, 5-オクタジエニル基、2, 6-オクタジエニル基、2, 4, 6-オクタトリエニル基、2-ノネニル基、3-ノネニル基、4-ノネニル基、5-ノネニル基、6-ノネニル基、7-ノネニル基、2-デセニル基、3-デセニル基、4-デセニル基、5-デセニル基、6-デセニル基、7-デセニル基、8-デセニル基等の直鎖状のアルケニル基、

【0105】

並びに 1-メチルエテニル基、2-メチル-1-プロペニル基、2-メチル-2-プロペニル基、2-メチル-1-ブテニル基、3-メチル-2-ブテニル基、2-メチル-3-ブテニル基、2, 3-ジメチル-1, 3-ブタジエニル基、3-エチル-2-プロペニル基、4-メチル-3-プロペニル基、3-メチル-2, 4-プロパジエニル基、3, 4-ジエチル-2-ヘキセニル基、4-メチル-3-ヘキセニル基、2-メチル-4-ヘキセニル基、3, 5-ジメチル-2, 4-ヘキサジエニル基、5-エチル-3-メチル-2-ヘプテニル基、5-メチル-3-ヘプテニル基、4-n-プロピル-4-ヘプテニル基、3, 6-ジメチル-5-ヘプテニル基、5-エチル-2, 4-ヘプタジエニル基、2, 6-ジメチル-2, 5-ヘプタジエニル基、4-エチル-3, 5-ヘプタジエニル基、4, 6-ジメチル-2-オクテニル基、5-エチル-3-オクテニル基、3-エチル-4-オクテニル基、3-エチル-5-オクテニル基、3, 4-ジメチル-6-オクテニル基、5-エチル-2, 4-オクタジエニル基、3-メチル-2, 5-オクタジエニル基、5-エチル-2, 6-オクタジエニル基、4-メチル-2, 4, 6-オクタトリエニル基、5-メチル-2-ノネニル基、6-メチル-3-ノネニル基、7-メチル-4-ノネニル基、3-メチル-5-ノネニル基、4-メチル-6-ノネニル基、3-メチル-7-ノネニル基等の分岐鎖状のアルケニル基が挙げられる。

【0106】

Zにおける、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数 2~10 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニル基の炭素数 2~10 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニル基としては、エチニル基、1-プロピニル基、2-プロピニル基、1-ブチニル基、2-ブチニル基、3-ブチニル基、1, 3-ブタジイニル基、2-ペンチニル基、3-ペンチニル基、2, 4-ペンタジイニル基、2-ヘキシニル基、3-ヘキシニル基、4-ヘキシニル基、2, 4-ヘキサジイニル基、2-ヘプチニル基、3-ヘプチニル基、4-ヘプチニル基、5-ヘプチニル基、2, 4-ヘプタジイニル基、2, 5-ヘプタジイニル基、3, 5-ヘプタジイニル基、2-オクチニル基、3-オクチニル基、4-オクチニル基、5-オクチニル基、6-

オクチニル基、2, 4-オクタジイニル基、2, 5-オクタジイニル基、2, 6-オクタジイニル基、2, 4, 6-オクタトリイニル基、2-ノニニル基、3-ノニニル基、4-ノニニル基、5-ノニニル基、6-ノニニル基、7-ノニニル基、2-デシニル基、3-デシニル基、4-デシニル基、5-デシニル基、6-デシニル基、7-デシニル基、8-デシニル基等の直鎖状のアルキニル基、

【0107】

並びに 1-メチル-2-プロピニル基、3-メチル-1-ブチニル基、2-メチル-3-ブチニル基、4-メチル-2-ペンチニル基、2-メチル-3-ペンチニル基、4-エチル-2-ヘキシニル基、5-メチル-3-ヘキシニル基、2-メチル-4-ヘキシニル基、5-エチル-6-メチル-2-ヘプチニル基、5-メチル-3-ヘプチニル基、3-n-プロピル-4-ヘプチニル基、4, 4-ジメチル-5-ヘプチニル基、6-メチル-2, 4-ヘプタジイニル基、4-メチル-2, 5-ヘプタジイニル基、2-メチル-3, 5-ヘプタジイニル基、6, 6-ジメチル-2-オクチニル基、6-メチル-3-オクチニル基、3-エチル-4-オクチニル基、4-メチル-5-オクチニル基、4, 8-ジメチル-6-オクチニル基、7-メチル-2, 4-オクタジイニル基、4-メチル-2, 5-オクタジイニル基、5-エチル-2, 6-オクタジイニル基、5-メチル-2-ノニニル基、6-メチル-3-ノニニル基、7-メチル-4-ノニニル基、8-メチル-5-ノニニル基、4-メチル-6-ノニニル基、3-メチル-7-ノニニル基等の分岐鎖状のアルキニル基が挙げられる。

【0108】

Zにおける、 $-O-R^d$ の R^d としては、水素原子、及び水酸基の保護基が挙げられるが、好ましくは水素原子が挙げられる。水酸基の保護基としては、 R^a における水酸基の保護基と同様のものが挙げられ、好ましいもの、特に好ましいものも、 R^a におけるそれらと同様である。

【0109】

代表的には、Zとしては、ハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数 1~10 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基が好ましく、ハロゲン原子で置換されている炭素数 3~10 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基のが更に好ましく、中

でもフッ素原子で置換されている炭素数 3~8 の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基のが特に好ましく、4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチル基であるのが更に特に好ましい。また、経口吸収性の点からは、Z としては、-COOH であるのが好ましい。更に、経口吸収性の点からは、Q が、R⁷ が水素原子である Q¹⁷ である場合は、Z が、水素原子であるのも好ましい。

なお、Q が、Q⁶⁵、Q⁶⁶、Q⁶⁷、Q⁶⁸、Q⁶⁹、及び Q⁷⁰ である場合は、Z は、水素原子、及び置換されていない炭素数 1~3 の直鎖もしくは分岐鎖状のアあるのが好ましい。

【0110】

Z が、-O-R^d (ここで、R^d は、前記と同義である。)、及び -COOH である、一般式 (I) で表される化合物は、一般式 (I) で表される化合物のうち、Z が、-O-R^d (ここで、R^d は、前記と同義である。) でも -COOH でもない化合物の中間体としても有用である。

【0111】

X¹ 及び X² としては、水素原子、10-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル) デシル基、11-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル) ウンデシル基、12-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル) ドデシル基、10-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルホニル) デシル基、11-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルホニル) ウンデシル基、12-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルホニル) ドデシル基、10-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチル) アミノカルボニル} デシル基、11-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチル) アミノカルボニル} ウンデシル基、9-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペンタフルオロヘキサノイル) アミノ} ノニル基、10-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペンタフルオロヘキサノイル) アミノ} デシル基、9-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル) ノニルオキシ基、10-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル) デシルオキシ基、11-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル) ウンデシルオキシ基、9-(4, 4, 5, 5

, 5-ペンタフルオロペンチルスルホニル) ノニルオキシ基、10-(4, 4,
 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルホニル) デシルオキシ基、11-(4,
 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルホニル) ウンデシルオキシ基、
 9-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチル) アミノカルボニル
 } ノニルオキシ基、10-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチ
 ル) アミノカルボニル} デシルオキシ基、8-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペ
 ンタフルオロヘキサノイル) アミノ} オクチルオキシ基、9-{N-(5, 5,
 6, 6, 6-ペンタフルオロヘキサノイル) アミノ} ノニルオキシ基、4-{8
 -(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル) オクチルオキ
 シ} フェニル基、4-{9-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルス
 ルフィニル) ノニルオキシ} フェニル基、4-{8-(4, 4, 5, 5, 5-ペ
 ンタフルオロペンチルスルホニル) オクチルオキシ} フェニル基、4-{9-(
 4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルホニル) ノニルオキシ} フェ
 ニル基、4-[8-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチル) ア
 ミノカルボニル} オクチルオキシ] フェニル基、4-[9-{N-(4, 4, 5
 , 5, 5-ペンタフルオロペンチル) アミノカルボニル} ノニルオキシ] フェ
 ニル基、4-[7-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペンタフルオロヘキサノイル)
 アミノ} ヘプチルオキシ] フェニル基、4-[8-{N-(5, 5, 6, 6, 6
 -ペンタフルオロヘキサノイル) アミノ} オクチルオキシ] フェニル基、6-[
 4-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチル) アミノカルボニル
 } フェニル] ヘキシル基、5-[4-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
 オロペンチル) アミノカルボニル} フェニル] ペンチルオキシ基、トリデシルオ
 キシ基、11-カルボキシ-15, 15, 16, 16, 16-ペンタフルオロヘ
 キサデシル) 基、4-{ {2-ヒドロキシ-3-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタ
 フルオロペンチルスルフィニルエチルオキシ) プロピル} オキシ} フェニル基、
 4-ヒドロキシ-9-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィ
 ニル) ノニル基、10-カルボキシ-14, 14, 15, 15, 15-ペンタフ
 ルオロペンタデシルオキシ基、9-カルボキシ-13, 13, 14, 14, 14
 -ペンタフルオロテトラデシルオキシ基、6-カルボキシ-10, 10, 11,

11, 11-ペンタフルオロウンデシル基、10-カルボキシ-14, 14, 15, 15, 15-ペンタフルオロペンタデシル基、14-カルボキシ-18, 18, 19, 19, 19-ペンタフルオロノナデシル基、9-カルボキシノニルオキシ基、6-カルボキシヘキシル基、10-カルボキシデシル基、14-カルボキシテトラデシル基、3-{4-(4-カルボキシブチル)フェニル}プロピル基、3-{4-(4-カルボキシ-8, 8, 9, 9, 9-ペンタフルオロノニル)フェニル}プロピル基、5-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル)ペンチル基、9-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル)ノニル基、13-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル)トリデシル基、4-ヒドロキシ-10-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル)デシル基、4-ヒドロキシ-15, 15, 16, 16, 16-ペンタフルオロヘキサデデシル基、9-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチル)アミノカルボニル}ノニル基、及び8-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペンタフルオロヘキサノイル)アミノ}オクチル基が好ましい。ただし、 X^1 及び X^2 は、同時に水素原子であることはない。また、 X^1 が水素原子であり、かつ X^2 が上記したもののうち水素原子以外であるもの、及び X^1 が上記したもののうち水素原子以外であり、かつ X^2 が水素原子であるものが特に好ましい。

【0112】

一般式 (I) で表される化合物としては、17 β -ヒドロキシ-11 β -{10-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル)デシル}アンドロスタン-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -{11-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル)ウンデシル}アンドロスタン-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -{12-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルフィニル)ドデシル}アンドロスタン-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -{10-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチルスルホニル)デシル}アンドロスタン-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -{11-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロ

ペンチルスルホニル) ウンデシル} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{12-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロ
ペンチルスルホニル) ドデシル} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[10-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
オロペンチル) アミノカルボニル} デシル] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[11-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
オロペンチル) アミノカルボニル} ウンデシル] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[9-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペンタフル
オロヘキサノイル) アミノ} ノニル] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[10-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペンタフル
オロヘキサノイル) アミノ} デシル] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{9-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペ
ンチルスルフィニル) ノニルオキシ} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{10-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロ
ペンチルスルフィニル) デシルオキシ} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{11-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロ
ペンチルスルフィニル) ウンデシルオキシ} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{9-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペ
ンチルスルホニル) ノニルオキシ} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{10-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロ
ペンチルスルホニル) デシルオキシ} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -{11-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロ
ペンチルスルホニル) ウンデシルオキシ} アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[9-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
オロペンチル) アミノカルボニル} ノニルオキシ] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[10-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
オロペンチル) アミノカルボニル} デシルオキシ] アンドロスタン-3-オン

;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[8-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペンタフル

オロヘキサノイル) アミノ} オクチルオキシ] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[9-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペンタフル
オロヘキサノイル) アミノ} ノニルオキシ] アンドロスタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[4-{8-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
オロペンチルスルフィニル) オクチルオキシ} フェニル] アンドロスタン-3-
オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[4-{9-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
オロペンチルスルフィニル) ノニルオキシ} フェニル] アンドロスタン-3-オ
ン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[4-{8-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
オロペンチルスルホニル) オクチルオキシ} フェニル] アンドロスタン-3-オ
ン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -[4-{9-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
オロペンチルスルホニル) ノニルオキシ} フェニル] アンドロスタン-3-オン
;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(4-[8-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペン
タフルオロペンチル) アミノカルボニル} オクチルオキシ] フェニル) アンドロ
スタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(4-[9-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペン
タフルオロペンチル) アミノカルボニル} ノニルオキシ] フェニル) アンドロ
スタン-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(4-[7-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペン
タフルオロヘキサノイル) アミノ} ヘプチルオキシ] フェニル) アンドロスタン
-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(4-[8-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペン
タフルオロヘキサノイル) アミノ} オクチルオキシ] フェニル) アンドロスタン
-3-オン;

17 β -ヒドロキシ-11 β -(6-[4-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペン
タフルオロペンチル) アミノカルボニル} フェニル] ヘキシル) アンドロスタン

-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -(5-[4-{N-(4,4,5,5,5-ペン
タフルオロペンチル)アミノカルボニル}フェニル]ペンチルオキシ)アンドロ
スタン-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -トリデシルオキシアンドロスタン-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -(11-カルボキシ-15,15,16,16,
16-ペンタフルオロヘキサデシル)アンドロスタン-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -[4-{(2-ヒドロキシ-3-(4,4,5,
5,5-ペンタフルオロペンチルスルフィニルエチルオキシ)プロピル)オキシ
}フェニル]アンドロスタン-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -(4-ヒドロキシ-9-(4,4,5,5,5-
ペンタフルオロペンチルスルフィニル)ノニル)アンドロスタン-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -(10-カルボキシ-14,14,15,15,
15-ペンタフルオロペンタデシルオキシ)アンドロスタン-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -(9-カルボキシ-13,13,14,14,1
4-ペンタフルオロテトラデシルオキシ)アンドロスタン-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -(6-カルボキシ-10,10,11,11,1
1-ペンタフルオロウンデシル)アンドロスタン-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -(10-カルボキシ-14,14,15,15,
15-ペンタフルオロペンタデシル)アンドロスタン-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -(14-カルボキシ-18,18,19,19,
19-ペンタフルオロノナデシル)アンドロスタン-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -(9-カルボキシノニルオキシ)アンドロスタン
-3-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -(6-カルボキシヘキシル)アンドロスタン-3
-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -(10-カルボキシデシル)アンドロスタン-3
-オン；

17 β -ヒドロキシ-11 β -(14-カルボキシテトラデシル)アンドロスタ

ン-3-オン；

17β-ヒドロキシ-11β-[3-{4-(4-カルボキシブチル)フェニル}
}プロピル]アンドロスタン-3-オン；

17β-ヒドロキシ-11β-[3-{4-(4-カルボキシ-8, 8, 9, 9,
9-ペンタフルオロノニル)フェニル}プロピル]アンドロスタン-3-オン
；

17β-ヒドロキシ-11β-{5-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペ
ンチルスルフィニル)ペンチル}アンドロスタン-3-オン；

17β-ヒドロキシ-11β-{9-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペ
ンチルスルフィニル)ノニル}アンドロスタン-3-オン；

17β-ヒドロキシ-11β-{13-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロ
ペンチルスルフィニル)トリデシル}アンドロスタン-3-オン；

17β-ヒドロキシ-11β-{4-ヒドロキシ-10-(4, 4, 5, 5, 5-
ペンタフルオロペンチルスルフィニル)デシル}アンドロスタン-3-オン；


17β-ヒドロキシ-11β-(4-ヒドロキシ-15, 15, 16, 16, 1
6-ペンタフルオロヘキサデデシル)アンドロスタン-3-オン；

17β-ヒドロキシ-11β-[9-{N-(4, 4, 5, 5, 5-ペンタフル
オロペンチル)アミノカルボニル}ノニル]アンドロスタン-3-オン；


及び17β-ヒドロキシ-11β-[8-{N-(5, 5, 6, 6, 6-ペンタ
フルオロヘキサノイル)アミノ}オクチル]アンドロスタン-3-オンが好まし
い。これらの化合物の構造を以下に示す：

【0113】

【化 12】



【化 13】



【0115】

一般式 (I) で表される化合物が、分子内に 1 個以上の不斉炭素原子を含有する場合、各々の不斉炭素原子について、その絶対配置が R 配置、及び S 配置であるもの、並びにそれらの任意の割合の混合物の全てが、本発明に包含される。

【0116】

本発明の、アンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、アゴニストとして作用しない物質において、アゴニストとして作用しないとは、以下のアンドロゲンレセプターレポータージーンアッセイ法において、 $0.1 \text{ nmol/L} \sim 10 \text{ } \mu\text{mol/L}$ のいずれかの濃度で、転写活性値が、無添加の転写活性値を 1 とした場合、その 1 ～ 5 倍の値を示すことを意味する：

【0117】

トランスフェクションの 24 時間前に、 1.0×10^5 個の HeLa 細胞 (大

日本製薬(株)より購入)を12ウエルのマイクロプレート中でチャコール処理したFBS(DCC-FBS)5%を含むフェノールレッドを含まないDulbecco's Modified Eagle Medium(phenol red free DMEM)で培養する。500ng/wellのMMTV-Lucベクター(アンドロゲンレスポンスエレメントを含むMouse tumor Long terminal repeatを持つルシフェラーゼのレポータープラスミド:A. T. C. C. より購入したGM-CATベクター(A. T. C. C. No. 67282)のクロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ遺伝子をホタルルシフェラーゼ遺伝子に置換したベクター)と100ng/wellのpSG5-hAR(ヒトのアンドロゲン受容体の発現ベクターでSV40プロモーターの制御下にアンドロゲンレセプター遺伝子を有す)、5ng/wellのRenilla Luc vector(ウミシイタケルシフェラーゼ遺伝子が組み込まれた内部標準用ベクター)をHeLa細胞にトランスフェクションする。トランスフェクションはphenol red free DMEM培養液中で3μL/wellのリポフェクトアミン(GibcoBRL)を用いて行う。トランスフェクションの9時間後に培養液を、10μmol/Lの本発明の一般式(I)で表される化合物、又は本発明のアンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、アゴニストとして作用しない物質を含むphenol red free DMEM/3%DCC-FBSに交換する。培養液交換の48時間後に転写活性値を測定する。転写活性はDual-Luciferase Reporter Assay System(promega)で測定する。(転写活性値)=(ホタルルシフェラーゼの値)/(ウミシイタケルシフェラーゼの値)と定義する。このアッセイ法の実施にあたっては、J. Biol. Chem., vol. 270, p. 19998-20003, 1995を参照することができる。

【0118】

WO97/49709号公報には、アンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、アゴニストとして作用しない物質として、ハイドロキシフルタミド(フルタミドのin vivoでの活性本体)及びピカルタミドが記載され

ているが、該公報におけるアゴニストとして作用しないとは、CV-1細胞を用いたアンドロゲンレポータージーンアッセイ法において、 $10\mu\text{mol/L}$ 以上の濃度で、下記式で表されるアゴニスト効率値が、 $0\sim 20\%$ であることと定義されており、本発明におけるアゴニストとして作用しないことの定義とは明確に峻別される：

【0119】

アゴニスト効率(%) = (スクリーニングした非ステロイド化合物の転写活性値) / (DHTによる最大転写活性値) $\times 100$ 。

【0120】

また、本発明のアゴニストとして作用しないことの定義で用いたアンドロゲンレセプターレポータージーンアッセイ法において、ハイドロキシフルタミド及びビカルタミドは、それぞれ $10\mu\text{mol/L}$ の濃度で、アゴニストとして作用すると認められた(本明細書の実施例1参照)。

【0121】

また、アンタゴニストとして作用するとは、以下のアンドロゲンレセプターレポータージーンアッセイ法において、 $0.1\text{nmol/L}\sim 10\mu\text{mol/L}$ のいずれかの濃度で、 0.1nmol/L のジヒドロテストステロン(DHT)の転写活性値を $0\sim 50\%$ に抑制することを意味する：

【0122】

トランスフェクションの24時間前に、 1.0×10^5 個のHeLa細胞を12ウェルのマイクロプレート中でphenol red free DMEM/5%DCC-FBSで培養する。 500ng/well のMMTV-Lucベクターと 100ng/well のpSG5-hAR、 5ng/well のRenilla LucvectorをHeLa細胞にトランスフェクションする。トランスフェクションはphenol red free DMEM培養液中で $3\mu\text{L/well}$ のリポフェクトアミンを用いて行う。トランスフェクションの9時間後に培養液を、 0.1nmol/L のDHT、 $1.0\mu\text{mol/L}$ の本発明の一般式(I)で表される化合物、又は本発明のアンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、アゴニストとして作用しない物質を含むphenol

red free DMEM/3%DCC-FBSに交換する。培養液交換の48時間後に転写活性値を測定する。転写活性はDual-Luciferase Reporter Assay Systemで測定する。(転写活性値) = (ホタルルシフェラーゼの値) / (ウミシイタケルシフェラーゼの値) とする。このアッセイ法の実施にあたっては、J. Biol. Chem., vol. 270, p. 19998-20003, 1995を参照することができる。

【0123】

本発明の、アンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、アゴニストとして作用しない物質の具体例としては、例えば、本発明の一般式(I)で表される化合物が挙げられる。

【0124】

本発明の一般式(I)で表される化合物、及び本発明のアンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、アゴニストとして作用しない物質は、その薬学上許容し得る塩としても得ることができる。薬学上許容し得る塩としては、塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩、硫酸塩、及びリン酸塩等の無機酸塩；ギ酸塩、酢酸塩、シュウ酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩、メタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩、コハク酸塩、マロン酸塩、クエン酸塩、グルコン酸塩、マンデル酸塩、安息香酸塩、サリチル酸塩、トリフルオロ酢酸塩、酒石酸塩、プロピオン酸塩、及びグルタル酸等の有機酸塩；ナトリウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩、及び亜鉛塩等の無機塩基塩；並びにアンモニウム塩等の有機塩基塩などが挙げられる。

【0125】

本発明の一般式(I)で表される化合物、及びその薬学上許容し得る塩、並びに本発明のアンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、アゴニストとして作用しない物質、及びその薬学上許容し得る塩は、それらのプロドラッグとしても得ることができる。プロドラッグとは、生体内で急速に変換して一般式(I)で表される化合物、及びその薬学上許容し得る塩、並びに本発明のアンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、アゴニストとして作用しない物質、及びその薬学上許容し得る塩を、たとえば血液内での加水分解により


生成する化合物を意味する。T. Higuchi及びV. Stellaは、“Prodrugs as Novel Delivery Systems, vol. 14 of the A. C. S. Symposium Series, American Chemical Society (1975) にプロドラッグの概念を詳しく説明している。これらのプロドラッグはそれ自身活性を有することもあれば有しないこともあるが、普通には殆ど活性を有しない。また、例えば、ウイルマン (D. E. V. Wilman, 「癌化学療法におけるプロドラッグ」、バイオケミカル・ソサイエティー・トランスアクションズ (Biochemical Society Transactions), vol. 14, pp. 375-382 [第615会議 (615th Meeting, Belfast), 1986] 及びステラ (V. J. Stella) ほか、「プロドラッグ：標的指向薬剤供給に対する化学的方法」、ディレクテッド・ドラッグ・デリバリー (Directed Drug Delivery), ボルチャート (R. Borchardt) ほか編, pp. 247-267、ヒュマナ・プレス (Humana Press) 1985を参照することもできる。プロドラッグの具体例としては、例えば一般式 (I) で表される化合物が-COOH部分構造を有する場合、そのエステル、カーボネート、カーバメート等が挙げられる。

【0126】

本発明の一般式 (I) で示される化合物は、例えば以下に示すA法～R法及びB'法～L'法、又は目的化合物に応じてA法～R法及びB'法～L'法を適宜一部変更した方法に従って製造することができる。

【0127】

A法～R法及びB'法～L'法において記載されている化学式中、 R^2 は、一般式 (IV)




(式中、 G^2 は、炭素数1～26の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキレン基、炭素数2～26の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニレン基、又は炭素数2～26の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニレン基を示し、E、J、Y、L、 Q^2 、及びZは前記と同義である。なお、 Q^2 における R^7 及び R^8 は、好適には水素原子で

ある。) R^3 は、置換シリル基を示し、好適には、*t*-ブチルジメチルシリル基である。 X^3 は、ハロゲン原子又は置換スルホネート基を示し、好適には、*p*-トルエンスルホネート基又はメタンスルホネート基である。 R^{12} は、炭素数1～6の直鎖もしくは分岐鎖状の低級アルキル基を示し、好適には、メチル基及びエチル基である。 R^e 及び R^f は、それらが結合している3位及び17位の炭素原子と一緒に、保護されている $-(C=O)-$ を示し、好ましくは1, 3-ジオキサン、1, 3-ジオキソラン、及び1, 3-ジチアン等であり、特に好ましくは1, 3-ジオキソラン等である。 L^2 は、炭素数1～10の直鎖もしくは分岐鎖状の低級アルキレン基を示し、好適には、エタン-1, 2-ジイル基、プロパン-1, 3-ジイル基及びブタン-1, 4-ジイル基である。

【0128】

R^4 は、一般式 (V)



(式中、 G^3 は、炭素数1～27の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキレン基、炭素数2～27の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニレン基、又は炭素数2～27の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニレン基を示し、E、J、Y、L、 Q^2 及びZは前記と同義である。)を示す。 R^5 は、ハロゲン原子を示し、好適には臭素原子又はヨウ素原子である。 R^6 は置換シリル基を示し、好適にはトリメチルシリル基である。 G^4 は炭素数1～29の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキレン基、炭素数2～29の直鎖もしくは分岐鎖状のアルケニレン基、又は炭素数2～29の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキニレン基を示す。波線は、二重結合に対してトランス配置又はシス配置の単結合を示し、好適にはトランス配置である。

【0129】


A法は、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (II) で表される基であり、かつその一般式 (II) で表される基のうち、Ar が単結合であり、Aが-O-であり、 R^1 が $-CH_2-CH=CH-CH_2-R^2$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒に $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (6)、一般式 (I) で表される

化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (I I) で表される基であり、かつその一般式 (I I) で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-R^2$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にになって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (7)、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (I I) で表される基であり、かつその一般式 (I I) で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-G^2-S(O)-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にになって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (9)、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (I I) で表される基であり、かつその一般式 (I I) で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-G^2-S(O)_2-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にになって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (10)、並びに一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (I I) で表される基であり、かつその一般式 (I I) で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-CH_2-CH=CH-CH_2-R^2$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にになって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に二重結合である化合物 (147) を製造する方法である。

【0130】

【化 14】

A 法



【0131】

第A1工程は、化合物（2）を製造する工程で、不活性溶媒中、塩基の存在下、化合物（1）と化合物（133）を反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、本反応に関与しないものであれば特に限定しないが、例えばジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、

エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒であり、好適にはジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒であり、さらに好適にはジクロロメタンである。使用される塩基は、例えばジイソプロピルエチルアミン、4-ジメチルアミノピリジン、ピリジン、トリエチルアミン、N-メチルモリホリンのような有機塩基であり、好適にはジイソプロピルエチルアミンである。反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、0℃～50℃であり、好適には10℃～30℃である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常10分間～24時間であり、好適には30分間～15時間である。

【0132】

第A2工程は、化合物(3)を合成する工程で、不活性溶媒中、化合物(2)と還元剤を反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しないものであれば特に限定されないが、例えば、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、メタノール、エタノールのようなアルコール系溶媒であり、好適にはエーテル、テトラヒドロフランであり、さらに好適にはエーテルである。使用される還元剤は、例えば、水素化アルミニウムリチウム、水素化トリメトキシアルミニウムリチウム、水素化トリ-tert-ブトキシアルミニウムリチウム、水素化アルミニウムリチウム-トリクロロアルミニウム(アラン)、水素化アルミニウムリチウム-三フッ化ホウ素、水素化アルミニウム塩化マグネシウム、水素化アルミニウムマグネシウム、水素化アルミニウムナトリウム、水素化トリエトキシアルミニウムナトリウム、水素化ビス(メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム-パラジウム/炭素、硫化水素化ホウ素ナトリウム、シアン化水素化ホウ素ナトリウム、水素化トリメトキシホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウム、シアン化水素化ホウ素リチウム、水素化トリエチルホウ素リチウム、水素化トリ-tert-ブチルホウ素リチウム、水素化ホウ素カルシウム、水素化ホウ素カリウム、水素化トリイソプロポキシホウ素カリウム、水素化トリ

-s-ブチルホウ素カリウム、水素化ホウ素亜鉛、水素化ホウ素テトラメチルアンモニウム、水素化シアノホウ素テトラ-n-ブチルアンモニウムのような金属水素錯化合物、水素化ジイソブチルアルミニウム、水素化トリフェニルスズ、水素化トリ-n-ブチルスズ、水素化ジフェニルスズ、水素化ジ-n-ブチルスズ、水素化トリエチルスズ、水素化トリメチルスズ、トリクロシラン/トリ-n-ブチルアミン、トリクロシラン/トリ-n-プロピルアミン、トリエチルシラン、トリメチルシラン、ジフェニルシラン、フェニルシラン、ポリメチルヒドロシロキサン、ジメチルフェニルシラン、ジ-n-ブチルシラン、メチルフェニルシランのような金属水素化物、ジボラン、ジメチルアミン-ボラン、トリメチルアミン-ボラン、エチレンジアミン-ボラン、ピリジン-ボラン、ジメチルスルフィド-ボラン、2, 3-ジメチル-2-ブチルボラン (hexylborane)、ビス-3-メチル-2-ブチルボラン (disiamylborane)、ジイソピノカンフェニルボラン、ジシクロヘキシルボラン、9-ボラビシクロ[3, 3, 1]ノナン (9-BBN) のようなボラン誘導体であり、好適には水素化アルミニウムリチウム、水素化トリメトキシアルミニウムリチウム、水素化トリ-t-ブトキシアルミニウムリチウム、水素化アルミニウムリチウム-トリクロロアルミニウム (アラン)、水素化アルミニウムリチウム-三フッ化ホウ素、水素化アルミニウム塩化マグネシウム、水素化アルミニウムマグネシウム、水素化アルミニウムナトリウム、水素化トリエトキシアルミニウムナトリウム、水素化ビス (メトキシエトキシ) アルミニウムナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム-パラジウム/炭素、硫化水素化ホウ素ナトリウム、シアン化水素化ホウ素ナトリウム、水素化トリメトキシホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウム、シアン化水素化ホウ素リチウム、水素化トリエチルホウ素リチウム、水素化トリ-s-ブチルホウ素リチウム、水素化トリ-t-ブチルホウ素リチウム、水素化ホウ素カルシウム、水素化ホウ素カリウム、水素化トリイソプロポキシホウ素カリウム、水素化トリ-s-ブチルホウ素カリウム、水素化ホウ素亜鉛、水素化ホウ素テトラメチルアンモニウム、水素化シアノホウ素テトラ-n-ブチルアンモニウムのような金属水素錯化合物であり、さらに好適には水素化アルミニウムリチウムである。反応温度は、溶媒の種類等により異なる

が、通常、 -30°C ～ 100°C であり、好適には 0°C ～ 70°C である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常10分間～48時間であり、好適には30分間～24時間である。

【0133】

また、この工程で副生する、化合物(3)の11位の水酸基が α 配置である化合物を用いることにより、化合物(6)、化合物(7)、化合物(9)、及び化合物(10)の X^1 が α 配置である化合物を得ることができる。

【0134】

第A3工程は、化合物(4)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(3)に塩基を反応させることにより得られる化合物(3)の塩を、不活性溶媒中、化合物(134)と反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しなければ特に限定されないが、例えば、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、シクロヘキサン、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセタミド、ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン等であり、好適にはエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセタミド、ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン等である。使用される塩基は、水素化ナトリウム、水素化カリウム、水素化カルシウムのような金属水素化物、メチルリチウム、エチルリチウム、n-ブチルリチウム、t-ブチルリチウムのようなアルキルリチウム、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化バリウム、水酸化セシウムのような金属水酸化物、ナトリウムアミド、カリウムビストリメチルシリルアミド、ナトリウムビストリメチルシリルアミド、リチウムジイソプロピルアミドのような金属アミド、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン、ピリジン、ジメチルアミノピリジン、ピラジンのようなアミン類、四ホウ酸ナトリウム、ヨウ化ナトリ

ウム、リチウムヘキサメチルジシラザン、ナトリウムヘキサメチルジシラザン、カリウムヘキサメチルジシラザン等であり得、好適には水素化ナトリウム、水素化カリウム、水素化カルシウムのような金属水素化物、メチルリチウム、エチルリチウム、*n*-ブチルリチウム、*t*-ブチルリチウムのようなアルキルリチウムである。反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、 $-30^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ であり、好適には $0^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常10分間～48時間であり、好適には30分間～24時間である。

【0135】

第A4工程は、化合物(5)を製造する工程で、不活性溶媒中、有機金属触媒存在下、化合物(4)と化合物(135)を反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しないものであれば特に限定されないが、好適にはジクロロメタン、クロロホルムのようなハロゲン系溶媒、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒等であり、さらに好適にはジクロロメタン、ジメトキシエタン等である。使用される有機金属触媒は、好適には、ベンジリデンービス(トリシクロヘキシルホスフィン)ージクロロルテニウムである。反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、 $-30^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ であり、好適には $0^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常10分間～48時間であり、好適には30分間～24時間である。

【0136】

第A5工程は、化合物(6)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(5)を酸と反応させるところにより達成される。

使用される溶媒は、反応を阻害しないものであれば特に限定されないが、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル系溶媒、メタノール、エタノールのようなアルコール系溶媒又はアセトンのようなケトン系溶媒と水との混合溶媒であり得、好適には、含水アセトンである。

使用される酸は、例えば、塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、リン酸のような無機酸、酢酸、*p*-トルエンスルホン酸、ピリジニウム-*p*-トルエンス

ルホネートのような有機酸であり得、好適には、塩酸である。反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、 $0^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ （好適には、 $30^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ）である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～24時間（好適には、30分間～5時間）である。

【0137】

第A6工程は、化合物（7）を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、接触還元を行うことにより達成される。

使用される溶媒は、メタノール、エタノール、*n*-プロパノール、*i*-プロパノール、*n*-ブタノール、*s*-ブタノール、*t*-ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、シクロプロパノール、シクロブタノール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、エチレングルコール、1,3-プロパンジオール、1,4-ブタンジオール、1,5-ペンタンジオールのようなアルコール系溶媒、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、シクロヘキサン、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセタミド、ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルホルムアミド、*N*-メチルピロリドン、酢酸エチル、アセトニトリル、ニトロメタンであり得、好適には、エタノール、ジオキサン、ベンゼン、酢酸エチル等である。

接触還元を用いる条件は、水素-クロロトリス（トリフェニルホスフィン）ロジウム（I）、水素-クロロトリス（トリパラトリルホスフィン）ロジウム（I）、水素-クロロトリス（トリパラメトキシフェニルホスフィン）ロジウム（I）、水素-ヒドリドカルボニルトリス（トリフェニルホスフィン）ロジウム（I）、水素-酢酸ロジウム（II）、水素-酢酸ルテニウム（II）、水素-クロロヒドリドトリス（トリフェニルホスフィン）ルテニウム（II）、水素-カルボキシラトヒドリドトリス（トリフェニルホスフィン）ルテニウム（II）、水素-ヒドリドカルボニルトリス（トリフェニルホスフィン）イリジウム（I）、水素-白金（II）-塩化スズ錯体、水素-ペンタシアノコバルト（II）錯体、水素-トリシアノビピリジンコバルト（II）錯体、水素-ビス（ジメチルグ

リオキシマト)コバルト(II)錯体、水素-安息香酸メチル-トリカルボニルクロム錯体、水素-ビス(トリカルボニルシクロペンタジエニルクロム)、水素-ペンタカルボニル鉄、水素-ビス(シクロペンタジエニル)ジカルボニルチタン、水素-ヒドリドカルボニルコバルト錯体、水素-オクタカルボニルニコバルト、水素-ヒドリドカルボニルロジウム、水素-クロム(III)アセチルアセトナート-トリイソブチルアルミニウム、水素-コバルト(II)アセチルアセトナート-トリイソブチルアルミニウム、水素-ニッケル(II)-2-ヘキサノアート-トリエチルアルミニウム等の均一系、水素-二酸化白金、水素-白金/炭素、水素-パラジウム/炭素、水素-パラジウム/硫酸バリウム、水素-パラジウム/炭酸カルシウム、水素-ラネーニッケル、水素-カッパークロマイト、水素-ロジウム/炭素、水素-ロジウム/アルミナ、水素-二酸化ルテニウム、水素-ルテニウム/炭素等の不均一系条件であり得、好ましくは水素-クロロトリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I)、水素-パラジウム/炭素、水素-パラジウム/炭酸カルシウム等である。

反応温度は、通常0℃～100℃であり、好適には0℃～60℃である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常、10分間～24時間であり、好適には10分間～6時間である。

【0138】

第A8工程は、化合物(7)の R^2 における Q^2 が-S-である場合、化合物(9)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(7)を酸化剤と反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しなければ特に限定されないが、例えば、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、メタノール、エタノールのようなアルコール系溶媒、又は水等であり、好適にはジクロロメタン、メタノール等である。

使用される酸化剤は、例えば、過安息香酸t-ブチル、過酢酸t-ブチル、t-ブチルヒドロペルオキシド、t-アミルヒドロペルオキシド、ジベンゾイルペルオキシド、ジ-p-ニトロベンゾイルペルオキシド、ジ-p-クロロベンゾイ

ルペルオキシドのような有機過酸化物、過安息香酸、メタクロロ過安息香酸、p-ニトロ過安息香酸、モノペルオキシフタル酸、過ギ酸、過酢酸、トリフルオロ過酢酸、ペルオキシラウリン酸のような有機過酸、次亜塩素酸、次亜塩素酸ナトリウム、次亜臭素酸カリウム、次亜ヨウ素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸カリウム、臭素酸ナトリウム、臭素酸カリウム、ヨウ素酸ナトリウム、ヨウ素酸カリウム、フッ化ペルクロリル、オルト過ヨウ素酸、メタ過ヨウ素酸ナトリウム、メタ過ヨウ素酸カリウム、N-ブロモアセトアミド、N-ブロモスクシンイミド、N-ブロモフタルイミド、イソシアヌルクロリド、イソシアヌルブロミド、N-ブロモカプロラクタム、1-クロロベンゾトリアゾール、1,3-ジブromo-5,5-ジメチルヒダントイン、ナトリウムN-クロロ-p-トルエンスルホンアミド（クロラミンT）、ナトリウムN-クロロベンゼンスルホンアミド（クロラミンB）、次亜塩素酸t-ブチル、次亜臭素酸t-ブチル、次亜ヨウ素酸t-ブチル、酢酸ヨードシルベンゼン、ヨードシルベンゼンのようなハロゲン類、ペルオキソー硫酸、OXONE（登録商標）、過酸化水素等であり、好適には、過ヨウ素酸ナトリウム、OXONE（登録商標）等である。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、0℃～100℃（好適には、10℃～50℃）である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～24時間（好適には、30分間～15時間）である。

【0139】

第A9工程は、化合物（7）の R^2 における Q^2 が-S-である場合、化合物（10）を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物（7）を酸化剤と反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しなければ特に限定されないが、例えば、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、メタノール、エタノールのようなアルコール系溶媒、又は水等であり、好適にはジクロロメタン、メタノール等である。

使用される酸化剤は、例えば、過安息香酸t-ブチル、過酢酸t-ブチル、t-ブチルヒドロペルオキシド、t-アミルヒドロペルオキシド、ジベンゾイルペ

ルオキシド、ジ-*p*-ニトロベンゾイルペルオキシド、ジ-*p*-クロロベンゾイルペルオキシドのような有機過酸化物、過安息香酸、メタクロロ過安息香酸、*p*-ニトロ過安息香酸、モノペルオキシフタル酸、過ギ酸、過酢酸、トリフルオロ過酢酸、ペルオキシラウリン酸のような有機過酸、次亜塩素酸、次亜塩素酸ナトリウム、次亜臭素酸カリウム、次亜ヨウ素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸カリウム、臭素酸ナトリウム、臭素酸カリウム、ヨウ素酸ナトリウム、ヨウ素酸カリウム、フッ化ペルクロリル、オルト過ヨウ素酸、メタ過ヨウ素酸ナトリウム、メタ過ヨウ素酸カリウム、*N*-ブromoアセトアミド、*N*-ブromoスクシンイミド、*N*-ブromoフタルイミド、イソシアヌルクロリド、イソシアヌルブロミド、*N*-ブromoカプロラクタム、1-クロロベンゾトリアゾール、1,3-ジブromo-5,5-ジメチルヒダントイン、ナトリウム*N*-クロロ-*p*-トルエンスルホンアミド（クロラミンT）、ナトリウム*N*-クロロベンゼンスルホンアミド（クロラミンB）、次亜塩素酸*t*-ブチル、次亜臭素酸*t*-ブチル、次亜ヨウ素酸*t*-ブチル、酢酸ヨードシルベンゼン、ヨードシルベンゼンのようなハロゲン類、ペルオキシ-*o*-硫酸、OXONE（登録商標）、過酸化水素等であり、好適には、OXONE（登録商標）等である。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、0℃～100℃（好適には、10℃～50℃）である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～24時間（好適には、30分間～15時間）である。

【0140】

第A10工程は、化合物（145）を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物（144）に塩基を反応させることにより得られる化合物（144）の塩を、不活性溶媒中、化合物（134）と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A3工程と同様に行われる。

【0141】

また、化合物（144）の11位の水酸基が α 配置である化合物が市販されており、これを化合物（144）の代わりに用いることにより、化合物（7）のX¹が α 配置である化合物を得ることができる。

【0142】

第A11工程は、化合物(146)を製造する工程で、不活性溶媒中、有機金属触媒存在下、化合物(145)と化合物(135)を反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A4工程と同様に行われる。

【0143】

第A12工程は、化合物(147)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(146)と還元剤を反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応を阻害しないものであれば特に限定されないが、例えば、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、メタノール、エタノールのようなアルコール系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、ピリジン、トリエチルアミンのようなアミン類であり、好適にはメタノール、エタノールのようなアルコール系溶媒であり、さらに好適にはメタノール等である。使用される還元剤は、例えば、水素化アルミニウムリチウム、水素化トリメトキシアルミニウムリチウム、水素化トリ-*t*-ブトキシアルミニウムリチウム、水素化アルミニウムリチウム-トリクロロアルミニウム(アラン)、水素化アルミニウムリチウム-三フッ化ホウ素、水素化アルミニウム塩化マグネシウム、水素化アルミニウムマグネシウム、水素化アルミニウムナトリウム、水素化トリエトキシアルミニウムナトリウム、水素化ビス(メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム-パラジウム/炭素、硫化水素化ホウ素ナトリウム、シアン化水素化ホウ素ナトリウム、水素化トリメトキシホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウム、シアン化水素化ホウ素リチウム、水素化トリエチルホウ素リチウム、水素化トリ-*s*-ブチルホウ素リチウム、水素化トリ-*t*-ブチルホウ素リチウム、水素化ホウ素カルシウム、水素化ホウ素カリウム、水素化トリイソプロポキシホウ素カリウム、水素化トリ-*s*-ブチルホウ素カリウム、水素化ホウ素亜鉛、水素化ホウ素テトラメチルアンモニウム、水素化シアノホウ素テトラ-*n*-ブチルアンモニウムのような金属水素錯化合物、水素化ジイソブチルアルミニウム、水素化トリフェニルスズ、水素化トリ-*n*-ブチルスズ、水素化ジフェニルスズ、水素化ジ-*n*-ブチルスズ、水素化トリエチルスズ、水素化トリメチルスズ、トリクロシラン/トリ-*n*-ブ

チルアミン、トリクロロシラン／トリ-*n*-プロピルアミン、トリエチルシラン、
 トリメチルシラン、ジフェニルシラン、フェニルシラン、ポリメチルヒドロシ
 ロキサン、ジメチルフェニルシラン、ジ-*n*-ブチルシラン、メチルフェニルシ
 ランのような金属水素化物、ジボラン、ジメチルアミン-ボラン、トリメチルア
 ミン-ボラン、エチレンジアミン-ボラン、ピリジン-ボラン、ジメチルスルフ
 ィド-ボラン、2, 3-ジメチル-2-ブチルボラン (hexylborane)、ビス-3-メチル-2-ブチルボラン (disiamylborane)、
 ジイソピノカンフェニルボラン、ジシクロヘキシルボラン、9-ボラビシクロ
 [3, 3, 1] ノナン (9-BBN) のようなボラン誘導体であり、好適には水
 素化アルミニウムリチウム、水素化トリメトキシアルミニウムリチウム、水素化
 トリ-*t*-ブトキシアルミニウムリチウム、水素化アルミニウムリチウム-トリ
 クロロアルミニウム (アラン)、水素化アルミニウムリチウム-三フッ化ホウ素
 、水素化アルミニウム塩化マグネシウム、水素化アルミニウムマグネシウム、水
 素化アルミニウムナトリウム、水素化トリエトキシアルミニウムナトリウム、水
 素化ビス (メトキシエトキシ) アルミニウムナトリウム、水素化ホウ素ナトリウ
 ム、水素化ホウ素ナトリウム-パラジウム／炭素、硫化水素化ホウ素ナトリウム
 、シアン化水素化ホウ素ナトリウム、水素化トリメトキシホウ素ナトリウム、水
 素化ホウ素リチウム、シアン化水素化ホウ素リチウム、水素化トリエチルホウ素
 リチウム、水素化トリ-*s*-ブチルホウ素リチウム、水素化トリ-*t*-ブチルホ
 ウ素リチウム、水素化ホウ素カルシウム、水素化ホウ素カリウム、水素化トリイ
 ソプロボキシホウ素カリウム、水素化トリ-*s*-ブチルホウ素カリウム、水素化
 ホウ素亜鉛、水素化ホウ素テトラメチルアンモニウム、水素化シアノホウ素テト
 ラ-*n*-ブチルアンモニウムのような金属水素錯化合物であり、さらに好適には
 水素化ホウ素ナトリウムである。反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通
 常、-30℃～100℃であり、好適には0℃～70℃である。反応時間は、反
 応温度等により異なるが、通常10分間～48時間であり、好適には30分間～
 24時間である。

【0144】

第A13工程は、化合物(7)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは

不活性溶媒中、接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記 A 法第 A 6 工程と同様に行なわれる。


【0 1 4 5】

B 法は、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (II) で表される基であり、かつその一般式 (II) で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-G-S-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒に $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (17)、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (II) で表される基であり、かつその一般式 (II) で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-G-S(O)-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒に $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (18)、並びに一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (II) で表される基であり、かつその一般式 (II) で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-G-S(O)_2-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒に $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (19) を製造する方法である。

【0 1 4 6】

【化 15】

B 法



【0147】

第B1工程は、化合物(13)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(3)に塩基を反応させることにより得られる化合物(3)の塩を、不活性溶媒中、化合物(136)と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A3工程と同様に行われる。

【0148】

第B2工程は、化合物(14)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(13)と脱保護剤を反応させること、すなわち置換シリル基を除去することにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応を阻害しないものであれば、特に限定されないが、例えば、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ジメチルホルムアミド、水であり、好適には、テトラヒドロフラン等である。使用される脱保護剤は、特に限定されないが、例えば、フッ化水素、フッ化水素-ピリジン、フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、フッ化テトラ-*n*-ブチルアンモニウムのようなフッ化物、蟻酸、酢酸、p-トルエンスルホン酸のような有機酸であり、好ましくは、フッ化テトラ-*n*-ブチルアン

モニウム等である。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、0℃～80℃（好適には、0℃～50℃）である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～24時間（好適には、30分間～15時間）である。

【0149】

第B3工程は、化合物（15）を製造する工程で、アミン系溶媒中、化合物（14）を塩化スルホニル化合物と反応させるか、あるいは、不活性溶媒中、化合物（14）をハロゲン化剤と反応させることにより、達成される。

使用されるアミン系溶媒は、特に限定されないが、例えば、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン、ピリジン等であり、好適には、ピリジン、トリエチルアミン等である。

使用される塩化スルホニル化合物は、特に限定されないが、例えば、p-トルエンスルホニルクロリド、ベンゼンスルホニルクロリド、メタンスルホニルクロリド、トリフルオロメタンスルホニルクロリド等であり、好適には、メタンスルホニルクロリド、トリフルオロメタンスルホニルクロリド等である。

使用される不活性溶媒は、本反応に関与しないものであれば特に限定しないが、例えば、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、アセトニトリルのようなニトリル系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、シクロヘキサン、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセタミド、ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン、酢酸エチル等であり得、好適にはベンゼン、ジクロロメタン等である。

使用されるハロゲン化剤は、例えば、四塩化炭素-トリフェニルホスフィン、塩化チオニル、塩化スルフリル、N-クロロコハク酸イミド-トリフェニルホスフィン、N-クロロコハク酸イミド-ジメチルスルフィド、三塩化リン、五塩化リン等のクロロ化剤、又は四臭化炭素-トリフェニルホスフィン、N-ブロモコハク酸イミド-トリフェニルホスフィン、N-ブロモコハク酸イミド-ジメチル

スルフィド、三臭化リン、五臭化リン等のプロモ化剤であり得、好適には四臭化炭素-トリフェニルホスフィン、塩化チオニル等である。反応温度は、通常、0℃～80℃であり、好適には10℃～40℃である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常、10分間～10時間であり、好適には30分間～3時間である。

【0150】

第B4工程は、化合物(16)を製造する工程で、アルコール系溶媒中、化合物(137)と金属アルコキシドを反応させることにより得られる化合物(137)の反応性誘導体を、アルコール系溶媒中、化合物(15)と反応させることにより達成される。

使用されるアルコール系溶媒は、特に限定されないが、例えば、メタノール、エタノール、*n*-プロパノール、*i*-プロパノール等であり、好適には、メタノール等である。

使用される金属アルコキシドは、特に限定されないが、例えば、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド等であり、好適には、ナトリウムメトキシド等である。

反応温度は、溶媒等の条件により異なるが、通常、0℃～80℃であり、好適には10℃～40℃である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常、10分間～10時間であり、好適には30分間～8時間である。

【0151】

第B5工程は、化合物(17)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(16)を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A5工程と同様に行われる。

【0152】

第B6工程は、化合物(18)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(17)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A8工程と同様に行われる。

【0153】

第B7工程は、化合物(19)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(1

8) を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A9工程と同様に行われる。


【0154】

B' 法は、化合物(17)の、破線が実線と共に二重結合である化合物(243)、及び化合物(17)の、破線が実線と共に単結合である化合物(244)を製造する別の方法である。

【0155】

【化16】

B' 法



【0156】

第B'1工程は、化合物(149)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(148)に塩基を反応させることにより得られる化合物(148)の塩を、不活性溶媒中、化合物(136)と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A3工程と同様に行われる。

【0157】

第B'2工程は、化合物(150)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(149)と脱保護剤を反応させること、すなわち置換シリル基を除去すること

により達成され、本反応は、前記B法第B2工程と同様に行われる。

【0158】

第B'3工程は、化合物(151)を製造する工程で、アミン系溶媒中、化合物(150)を塩化スルホニル化合物と反応させるか、あるいは、不活性溶媒中、化合物(150)をハロゲン化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記B法第B3工程と同様に行われる。

【0159】

第B'4工程は、化合物(152)を製造する工程で、アルコール系溶媒中、化合物(137)と金属アルコキシドを反応させることにより得られる化合物(137)の反応性誘導体を、アルコール系溶媒中、化合物(151)と反応させることにより達成され、本反応は、前記B法第B4工程と同様に行われる。

【0160】

第B'5工程は、化合物(153)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(152)を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A5工程と同様に行われる。

【0161】

第B'6工程は、化合物(243)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(153)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A12工程と同様に行われる。

【0162】

第B'7工程は、化合物(244)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、化合物(243)の接触還元を行なうか、又は、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(243)と還元剤を反応させることにより達成される。

接触還元を行なう場合に使用される溶媒は、メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロパノール、n-ブタノール、s-ブタノール、t-ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、シクロプロパノール、シクロブタノール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、エチレングルコール、1,3-プロパンジオール、1,4-ブタンジオール、1,5-ペンタンジオールのようなア

ルコール系溶媒、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、ピリジン、トリエチルアミンのようなアミン系溶媒、シクロヘキサン、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセタミド、ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン、酢酸エチル、アセトニトリル、ニトロメタンであり得、好適には、エタノール、エーテル、ジオキサン、ピリジン等である。

接触還元を用いる条件は、水素-クロロトリス（トリフェニルホスフィン）ロジウム（I）、水素-クロロトリス（トリパラトリルホスフィン）ロジウム（I）、水素-クロロトリス（トリパラメトキシフェニルホスフィン）ロジウム（I）、水素-ヒドリドカルボニルトリス（トリフェニルホスフィン）ロジウム（I）、水素-酢酸ロジウム（II）、水素-酢酸ルテニウム（II）、水素-クロロヒドリドトリス（トリフェニルホスフィン）ルテニウム（II）、水素-カルボキシラトヒドリドトリス（トリフェニルホスフィン）ルテニウム（II）、水素-ヒドリドカルボニルトリス（トリフェニルホスフィン）イリジウム（I）、水素-白金（II）-塩化スズ錯体、水素-ペンタシアノコバルト（II）錯体、水素-トリシアノビピリジンコバルト（II）錯体、水素-ビス（ジメチルグリオキシマト）コバルト（II）錯体、水素-安息香酸メチル-トリカルボニルクロム錯体、水素-ビス（トリカルボニルシクロペンタジエニルクロム）、水素-ペンタカルボニル鉄、水素-ビス（シクロペンタジエニル）ジカルボニルチタン、水素-ヒドリドカルボニルコバルト錯体、水素-オクタカルボニルニコバルト、水素-ヒドリドカルボニルロジウム、水素-クロム（III）アセチルアセトナート-トリイソブチルアルミニウム、水素-コバルト（II）アセチルアセトナート-トリイソブチルアルミニウム、水素-ニッケル（II）-2-ヘキサノアート-トリエチルアルミニウム等の均一系、水素-二酸化白金、水素-白金/炭素、水素-パラジウム/炭素、水素-パラジウム/硫酸バリウム、水素-パラジウム/炭酸カルシウム、水素-ラネ-ニッケル、水素-カッパークロマイト、水素-ロジウム/炭素、水素-ロジウム/アルミナ、水素-二酸化ルテニウム

、水素-ルテニウム/炭素等の不均一系条件であり得、好ましくは水素-クロロトリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I)、水素-パラジウム/炭素、水素-パラジウム/炭酸カルシウム等である。

反応温度は、通常0℃~100℃であり、好適には0℃~60℃である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常、10分間~24時間であり、好適には10分間~6時間である。

還元剤と反応させる場合に使用される不活性溶媒は、反応に関与しないものであれば特に限定されないが、例えば、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、ピリジン、トリエチルアミンのようなアミン系溶媒、シクロヘキサン、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセタミド、ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン、アセトニトリル、ニトロメタンであり得、好適には、テトラヒドロフラン、ベンゼン、トルエン、ピリジン等である。

使用される還元剤は、例えば、ナトリウム/液体アンモニア、リチウム/液体アンモニア、リチウム/メチルアミン、リチウム/エチルアミン、リチウム/エチレンジアミン、ナトリウム/ヘキサメチルホスホアミド-*t*-ブタノール、ナトリウム/エタノール、ナトリウム/*t*-ブタノール-テトラヒドロフラン、ナトリウム/トルエン-*t*-アミルアルコールのような金属、水素化トリフェニルスズ、水素化トリ-*n*-ブチルスズ、水素化ジフェニルスズ、水素化ジ-*n*-ブチルスズ、水素化トリエチルスズ、水素化トリメチルスズ、トリクロシラン/トリ-*n*-ブチルアミン、トリクロシラン/トリ-*n*-プロピルアミン、トリエチルシラン、トリメチルシラン、ジフェニルシラン、フェニルシラン、ポリメチルヒドロシロキサン、ジメチルフェニルシラン、ジ-*n*-ブチルシラン、メチルフェニルシランのような金属水素化物、水素化アルミニウムリチウム/ヨウ化銅(I)、水素化トリメトキシアルミニウムリチウム/臭化銅(I)、水素化トリ-*t*-ブトキシアルミニウムリチウム/臭化銅(I)、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム-パラジウム/炭素、硫化水素化ホウ素ナトリウム、

シアン化水素化ホウ素ナトリウム、水素化トリメトキシホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウム、シアン化水素化ホウ素リチウム、水素化トリエチルホウ素リチウム、水素化トリ-*s*-ブチルホウ素リチウム、水素化トリ-*t*-ブチルホウ素リチウム、水素化ホウ素カルシウム、水素化ホウ素カリウム、水素化トリイソプロポキシホウ素カリウム、水素化トリ-*s*-ブチルホウ素カリウム、水素化ホウ素亜鉛、水素化ホウ素テトラメチルアンモニウム、水素化シアノホウ素テトラ-*n*-ブチルアンモニウムのような金属水素錯化合物等であり、好適には、ナトリウム/液体アンモニア、リチウム/液体アンモニア、水素化トリフェニルスズ、水素化トリ-*n*-ブチルスズ、水素化アルミニウムリチウム/ヨウ化銅(I)、水素化トリメトキシアルミニウムリチウム/臭化銅(I)、水素化ホウ素ナトリウム、水素化トリ-*s*-ブチルホウ素カリウム等である。

反応温度は、還元剤の種類により異なるが、通常-80℃~100℃であり、好適には-78℃~80℃である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常、10分間~24時間であり、好適には10分間~6時間である。


【0163】

C法は、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A^r が単結合であり、 A が-O-であり、 R^1 が-G-CONH-Zであり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって-(C=O)-であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(25)を製造する方法である。

【0164】

【化 17】

C法



【0165】

第C1工程は、化合物(22)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(15)をシアノ化剤と反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しないものであれば特に限定されないが、例えば、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、シクロヘキサン、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセタミド、ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン、酢酸エチル、アセトニトリル、ニトロメタン等であり得、好適にはジメチルスルホキシド等である。

使用されるシアノ化剤は、例えば、シアニ化リチウム、シアニ化ナトリウム、シアニ化カリウム等であり得、好適にはシアニ化ナトリウム等である。

反応温度は、通常、 0°C ～ 80°C であり、好適には 10°C ～ 40°C である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常、10分間～24時間であり、好適には1時間～15時間である。

【0166】

第C2工程は、化合物(23)を製造する工程で、化合物(22)を塩基の存在下加水分解することにより達成される。

使用される溶媒は、通常の加水分解反応に使用されるものであれば特に限定はなく、メタノール、エタノールのようなアルコール系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル系溶媒、水、あるいはこれらの混合溶媒であり得、好適には水又は水-エタノール等の含水アルコール系溶媒である。

使用される塩基は、化合物の他の部分に影響を与えないものであれば特に限定されないが、好適には、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化バリウム、水酸化セシウムのような金属水酸化物であり、特に好適には、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等である。

反応温度は、通常、0℃～100℃であり、好適には50℃～100℃である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常、10分間～48時間であり、好適には5時間～48時間である。

【0167】

第C3工程は、化合物(24)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(23)又はその反応性誘導体(酸ハライド類、混合酸無水物又は活性エステル類)と、化合物(138)又はその酸付加塩を反応させることにより達成される。

【0168】

本反応は、例えば、酸ハライド法、混合酸無水物法、活性エステル法又は縮合法によって行われる。酸ハライド法は、不活性溶媒中、化合物(23)をハロゲン化剤(例えば、チオニルクロリド、シュウ酸クロリド、五塩化リン等)と反応させ、酸ハライドを製造し、その酸ハライドと化合物(138)又はその酸付加塩を不活性溶媒中、塩基の存在下又は非存在下(好適には、存在下)、反応させることにより達成される。使用される塩基は、例えば、トリエチルアミン、N-メチルモルホリン、ピリジン、4-ジメチルアミノピリジンのような有機アミン類、重曹、重炭酸カリウムのようなアルカリ金属重炭酸塩、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩であり得、好適には、有機アミン類(特に好適には、トリエチルアミン)である。

【0169】

使用される溶媒は、反応に関与しなければ、特に限定されないが、例えば、ヘキサン、シクロヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシレンのような炭化水素系溶

媒、ジクロルメタン、1, 2-ジクロルエタン、四塩化炭素のようなハロゲン化系溶媒、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル系溶媒、アセトンのようなケトン系溶媒、N, N-ジメチルアセタミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチル-2-ピロリドンのようなアミド系溶媒、ジメチルスルホキシドのようなスルホキシド系溶媒であり得、好適には、炭化水素系溶媒、ハロゲン化系溶媒又はエーテル系溶媒であり、更に好適には、エーテル系溶媒（特に好適には、テトラヒドロフラン）である。反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、ハロゲン化剤と化合物（23）との反応及び酸ハライドと化合物（138）又はその酸付加塩との反応とも、通常-20℃～150℃であり、好適には、ハロゲン化剤と化合物（23）との反応は-10℃～50℃であり、酸ハライドと化合物（138）又はその酸付加塩との反応は0℃～100℃である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～24時間（好適には、30分間～15時間）である。

【0170】

混合酸無水物法は、ハロゲノ炭酸C1-C6アルキル（ここで、C1-C6アルキルは、炭素数1～6の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基を意味する）、ジ-C1-C6アルキルシアノリン酸又はジアリールホスホリルアジドと化合物（23）を反応させ、混合酸無水物を製造し、その混合酸無水物と化合物（138）又はその酸付加塩を反応させることにより達成される。混合酸無水物を製造する反応は、クロル炭酸メチル、クロル炭酸エチル、クロル炭酸イソブチル、クロル炭酸ヘキシルのようなハロゲノ炭酸C1-C6アルキル（好適には、クロル炭酸エチル又はクロル炭酸イソブチル）、ジメチルシアノリン酸、ジエチルシアノリン酸、ジヘキシルシアノリン酸のようなジ-C1-C6アルキルシアノリン酸又はジフェニルリン酸アジド、ジ-(p-ニトロフェニル)リン酸アジド、ジナフチルリン酸アジドのようなジ-C1-C6アリールリン酸アジド（好適には、ジフェニルリン酸アジド）と化合物（23）を反応させることにより行われ、好適には、不活性溶媒中、塩基の存在下に行われる。

【0171】

使用される塩基及び不活性溶媒は、本工程の酸ハライド法で使用されるものと

同様である。反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、 $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ （好適には、 $0^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ）である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常、15分間～24時間（好適には、30分間～15時間）である。

【0172】

混合酸無水物と化合物（138）又はその酸付加塩との反応は、不活性溶媒中、塩基の存在下又は非存在下（好適には、存在下）で行われ、使用される塩基及び不活性溶媒は、上記の酸ハライド法で使用されるものと同様である。反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、 $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ （好適には、 $0^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ）である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常、15分間～24時間（好適には、30分間～15時間）である。また、本方法において、ジ-C1-C6アルキルシアノリン酸又はジ-C1-C6アリアルリン酸アジドを使用する場合には、塩基の存在下、化合物（23）と化合物（138）又はその酸付加塩を直接反応させることもできる。

【0173】

活性エステル化法は、縮合剤（例えば、ジシクロヘキシルカルボジイミド、カルボニルジイミダゾール等）の存在下、化合物（23）を活性エステル化剤（例えば、N-ヒドロキシサクシンイミド、N-ヒドロキシベンゾトリアゾールのようなN-ヒドロキシ化合物等）と反応させ、活性エステルを製造し、この活性エステルと化合物（138）又はその酸付加塩を反応させることにより、達成される。活性エステルを製造する反応は、好適には、不活性溶媒中で行われ、使用される不活性溶媒は、例えば、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、ジメチルホルムアミド、酢酸エチル、アセトニトリル等であり得、好適にはジクロロメタン、アセトニトリル、酢酸エチル等である。反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、活性エステル化反応では、通常、 $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ （好適には、 $-10^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ）であり、活性エステル化合物と化合物（138）又はその酸付加塩との反応では、 $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ （好適には、 $-10^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ）である。反応時間は、反応温度等により異なるが、両反応共、通常15分間～24時間（好適には、30分間～15時間）である。

【0174】

縮合法は、縮合剤〔例えば、ジシクロヘキシルカルボジイミド、カルボニルジイミダゾール、1-(N,N-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩等〕の存在下、化合物(23)と化合物(138)又はその酸付加塩を直接反応させることにより行われる。本反応は、前記の活性エステルを製造する反応と同様に行われる。

【0175】

第C4工程は、化合物(25)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(24)を酸と反応させるとこにより達成され、本反応は、前記A法第A5工程と同様に行われる。


【0176】

C'法は、化合物(25)の、破線が実線と共に二重結合である化合物(245)及び、化合物(25)の、破線が実線と共に単結合である化合物(158)を製造する方法である。

【0177】

【化18】

C'法



【0178】

第C' 1工程は、化合物(154)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(151)をシアノ化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記C法第C 1工程と同様に行われる。

【0179】

第C' 2工程は、化合物(155)を製造する工程で、化合物(154)を塩基の存在下加水分解することにより達成され、本反応は、前記C法第C 2工程と同様に行われる。

【0180】

第C' 3工程は、化合物(156)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(155)又はその反応性誘導体(酸ハライド類、混合酸無水物又は活性エステル類)と、化合物(138)又はその酸付加塩を反応させることにより達成され、本反応は、前記C法第C 3工程と同様に行われる。

【0181】

第C' 4工程は、化合物(157)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(156)を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A 5工程と同様に行われる。

【0182】

第C' 5工程は、化合物(245)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(157)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A 1 2工程と同様に行われる。

【0183】

第C' 6工程は、化合物(158)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、化合物(245)の接触還元を行なうか、又は、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(245)と還元剤を反応させることにより達成される。

接触還元を行なう場合に使用される溶媒は、メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロパノール、n-ブタノール、s-ブタノール、t-ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、シクロプロパノール、シクロブタノール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、エチレングルコール、1, 3-プロ

バンジオール、1, 4-ブタンジオール、1, 5-ペンタンジオールのようなアルコール系溶媒、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、ピリジン、トリエチルアミンのようなアミン系溶媒、シクロヘキサン、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセタミド、ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン、酢酸エチル、アセトニトリル、ニトロメタンであり得、好適には、エタノール、エーテル、ジオキサン、ピリジン等である。

接触還元を用いる条件は、水素-タロロトリス（トリフェニルホスフィン）ロジウム（I）、水素-クロロトリス（トリパラトリルホスフィン）ロジウム（I）、水素-クロロトリス（トリパラメトキシフェニルホスフィン）ロジウム（I）、水素-ヒドリドカルボニルトリス（トリフェニルホスフィン）ロジウム（I）、水素-酢酸ロジウム（II）、水素-酢酸ルテニウム（II）、水素-クロロヒドリドトリス（トリフェニルホスフィン）ルテニウム（II）、水素-カルボキシラトヒドリドトリス（トリフェニルホスフィン）ルテニウム（II）、水素-ヒドリドカルボニルトリス（トリフェニルホスフィン）イリジウム（I）、水素-白金（II）-塩化スズ錯体、水素-ペンタシアノコバルト（II）錯体、水素-トリシアノビピリジンコバルト（II）錯体、水素-ビス（ジメチルグリオキシマト）コバルト（II）錯体、水素-安息香酸メチル-トリカルボニルクロム錯体、水素-ビス（トリカルボニルシクロペンタジエニルクロム）、水素-ペンタカルボニル鉄、水素-ビス（シクロペンタジエニル）ジカルボニルチタン、水素-ヒドリドカルボニルコバルト錯体、水素-オクタカルボニルニコバルト、水素-ヒドリドカルボニルロジウム、水素-クロム（III）アセチルアセトナート-トリイソブチルアルミニウム、水素-コバルト（II）アセチルアセトナート-トリイソブチルアルミニウム、水素-ニッケル（II）-2-ヘキサノアート-トリエチルアルミニウム等の均一系、水素-二酸化白金、水素-白金/炭素、水素-パラジウム/炭素、水素-パラジウム/硫酸バリウム、水素-パラジウム/炭酸カルシウム、水素-ラネ-ニッケル、水素-カッパークロマイト

、水素－ロジウム／炭素、水素－ロジウム／アルミナ、水素－二酸化ルテニウム、水素－ルテニウム／炭素等の不均一系条件であり得、好ましくは水素－クロロトリス（トリフェニルホスフィン）ロジウム（I）、水素－パラジウム／炭素、水素－パラジウム／炭酸カルシウム等である。

反応温度は、通常 0℃～100℃であり、好適には 0℃～60℃である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常、10 分間～24 時間であり、好適には 10 分間～6 時間である。

還元剤と反応させる場合に使用される不活性溶媒は、反応に関与しないものであれば特に限定されないが、例えば、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、ピリジン、トリエチルアミンのようなアミン系溶媒、シクロヘキサン、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセタミド、ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルホルムアミド、N－メチルピロリドン、アセトニトリル、ニトロメタンであり得、好適には、テトラヒドロフラン、ベンゼン、トルエン、ピリジン等である。

使用される還元剤は、例えば、ナトリウム／液体アンモニア、リチウム／液体アンモニア、リチウム／メチルアミン、リチウム／エチルアミン、リチウム／エチレンジアミン、ナトリウム／ヘキサメチルホスホアミド－*t*－ブタノール、ナトリウム／エタノール、ナトリウム／*t*－ブタノール－テトラヒドロフラン、ナトリウム／トルエン－*t*－アミルアルコールのような金属、水素化トリフェニルスズ、水素化トリ－*n*－ブチルスズ、水素化ジフェニルスズ、水素化ジ－*n*－ブチルスズ、水素化トリエチルスズ、水素化トリメチルスズ、トリクロシラン／トリ－*n*－ブチルアミン、トリクロシラン／トリ－*n*－プロピルアミン、トリエチルシラン、トリメチルシラン、ジフェニルシラン、フェニルシラン、ポリメチルヒドロシロキサン、ジメチルフェニルシラン、ジ－*n*－ブチルシラン、メチルフェニルシランのような金属水素化物、水素化アルミニウムリチウム／ヨウ化銅（I）、水素化トリメトキシアルミニウムリチウム／臭化銅（I）、水素化トリ－*t*－ブトキシアルミニウムリチウム／臭化銅（I）、水素化ホウ素ナトリウム

、水素化ホウ素ナトリウム-パラジウム/炭素、硫化水素化ホウ素ナトリウム、シアン化水素化ホウ素ナトリウム、水素化トリメトキシホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウム、シアン化水素化ホウ素リチウム、水素化トリエチルホウ素リチウム、水素化トリ-*s*-ブチルホウ素リチウム、水素化トリ-*t*-ブチルホウ素リチウム、水素化ホウ素カルシウム、水素化ホウ素カリウム、水素化トリイソプロポキシホウ素カリウム、水素化トリ-*s*-ブチルホウ素カリウム、水素化ホウ素亜鉛、水素化ホウ素テトラメチルアンモニウム、水素化シアノホウ素テトラ-*n*-ブチルアンモニウムのような金属水素錯化合物等であり、好適には、ナトリウム/液体アンモニア、リチウム/液体アンモニア、水素化トリフェニルスズ、水素化トリ-*n*-ブチルスズ、水素化アルミニウムリチウム/ヨウ化銅 (I)、水素化トリメトキシアルミニウムリチウム/臭化銅 (I)、水素化ホウ素ナトリウム、水素化トリ-*s*-ブチルホウ素カリウム等である。

反応温度は、還元剤の種類により異なるが、通常-80℃~100℃であり、好適には-78℃~80℃である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常、10分間~24時間であり、好適には10分間~6時間である。


【0184】

D法は、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (II) で表される基であり、かつその一般式 (II) で表される基のうち、Ar が単結合であり、A が-O-であり、 R^1 が-G-NHCO-Zであり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって-(C=O)-であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (30) を製造する方法である。

【0185】

【化19】

D法



【0186】

第D1工程は、化合物(27)を製造する工程で、不活性溶媒中、アゾジカルボン酸ジアルキルエステル(好適には、アゾジカルボン酸ジエチル)及びホスフィン化合物(好適には、トリフェニルホスフィン)の存在下、化合物(14)をフタルイミドと反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しないものであれば、特に限定されないが、例えば、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒であり、好適には、テトラヒドロフラン等である。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、0℃～50℃(好適には、10℃～30℃)である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～48時間(好適には、30分間～24時間)である。

【0187】

第D2工程は、化合物(27)を製造する別の工程で、不活性溶媒中、化合物(15)をフタルイミドの金属塩(好適には、フタルイミドカリウム)と反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しないものであれば、特に限定されないが、例えば、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、ジクロロメタンのようなハロゲン系溶媒、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセタミド、ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン等であり、好適には、テトラヒドロフラン等である。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、0℃～50℃（好適には、10℃～30℃）である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～48時間（好適には、30分間～24時間）である。

【0188】

第D3工程は、化合物（28）を製造する工程で、アルコール系溶媒中、化合物（27）を、アミン系化合物（好適には、ヒドラジン）と反応させることにより達成される。

使用されるアルコール系溶媒は、反応を阻害しないものであれば、特に限定されないが、例えば、メタノール、エタノール、n-プロピルアルコール、i-プロピルアルコール等であり、好適には、エタノール等である。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、0℃～50℃（好適には、10℃～30℃）である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～48時間（好適には、30分間～24時間）である。

【0189】

第D4工程は、化合物（29）を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物（139）又はその反応性誘導体（酸ハライド類、混合酸無水物又は活性エステル類）と、化合物（28）又はその酸付加塩を反応させることにより達成され、本反応は、前記C法第C3工程と同様に行われる。

【0190】


第D5工程は、化合物（30）を製造する工程で、水系溶媒中、化合物（29）を酸と反応させるとこにより達成され、本反応は、前記A法第A5工程と同様に行われる。

【0191】

D' 法は、化合物 (30) の、破線が実線と共に二重結合である化合物 (246) 及び、化合物 (30) の、破線が実線と共に単結合である化合物 (163) を製造する方法である。

【0192】

【化20】



【0193】

第D' 1工程は、化合物 (159) を製造する工程で、不活性溶媒中、アソジカルボン酸ジアルキルエステル (好適には、アソジカルボン酸ジエチル) 及びホスフィン化合物 (好適には、トリフェニルホスフィン) の存在下、化合物 (150) をフタルイミドと反応させることにより達成され、本反応は、前記D法第D 1工程と同様に行われる。

【0194】

第D' 2工程は、化合物 (159) を製造する別の工程で、不活性溶媒中、化

合物(151)をフタルイミドの金属塩(好適には、フタルイミドカリウム)と反応させることにより達成され、本反応は、前記D法第D2工程と同様に行われる。

【0195】

第D'3工程は、化合物(160)を製造する工程で、アルコール系溶媒中、化合物(159)を、アミン系化合物(好適には、ヒドラジン)と反応させることにより達成され、本反応は、前記D法第D3工程と同様に行われる。

【0196】

第D'4工程は、化合物(161)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(139)又はその反応性誘導体(酸ハライド類、混合酸無水物又は活性エステル類)と、化合物(160)又はその酸付加塩を反応させることにより達成され、本反応は、前記D法第D4工程と同様に行われる。

【0197】

第D'5工程は、化合物(162)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(161)を酸と反応させるとこにより達成され、本反応は、前記C法第C4工程と同様に行われる。

【0198】

第D'6工程は、化合物(246)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(162)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A12工程と同様に行われる。

【0199】

第D'7工程は、化合物(163)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、化合物(246)の接触還元を行なうか、又は、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(246)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記C'法第C'6工程と同様に行われる。

【0200】


E法は、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 Ar が単結合であり、 A がメチレン基であり、 R^1 が $-CH=CH-CH_2-R^4$ で

あり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (35)、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (II) で表される基であり、かつその一般式 (II) で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A がメチレン基であり、 R^1 が $-(CH_2)_3-R^4$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (36)、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (II) で表される基であり、かつその一般式 (II) で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A がメチレン基であり、 R^1 が $-(CH_2)_3-G^3-S(O)-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (38)、並びに一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (II) で表される基であり、かつその一般式 (II) で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A がメチレン基であり、 R^1 が $-(CH_2)_3-G^3-S(O)_2-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (39) を製造する方法である。

【0201】

【化 21】

E 法



【0202】

第E1工程は、化合物(32)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(134)と金属(好適には、マグネシウム)又はアルキルリチウム(好適には、*t*-ブチルリチウム)を反応させることにより得られる化合物(134)の反応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物(2)と反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しなければ、特に限定されないが、好適には、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル類であり、更に好ましくは、テトラヒドロフランである。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、0℃～80℃(好適には、10℃～50℃)である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～24時間(好適には、30分間～15時間)である。

本工程は、また、不活性溶媒中、活性化剤の存在下、化合物（２）を化合物（１４０）と反応させることによって達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しなければ、特に限定されないが、好適には、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ジクロロメタンのようなハロゲン系溶媒であり、好適には、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン等である。

使用される活性化剤は、反応を阻害しないものであれば特に限定されないが、例えば、フッ化テトラ n -ブチルアンモニウムのようなフッ化物、三塩化アルミニウム、二塩化エチルアルミニウム、四塩化チタン、三フッ化ホウ素、トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルシリルのようなルイス酸等であり、好適には、トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルシリル等である。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、 $-78^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ （好適には、 $-60^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ ）である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常 15 分間～24 時間（好適には、30 分間～5 時間）である。

【0203】

第 E 2 工程は、化合物（３３）を製造する工程で、不活性溶媒中、添加剤の存在下、化合物（３２）を還元剤と反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しなければ特に限定されないが、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒であり、好ましくはベンゼン、トルエン、ジクロロメタン等である。

使用される添加剤は、反応を阻害しないものであれば特に限定されないが、好ましくは、1, 1'-チオカルボニルジイミダゾール、ホスゲン、塩化ベンゾイル、ヨウ化亜鉛、三フッ化ホウ素（ BF_3 ）等である。

使用される還元剤は、例えば、水素化トリフェニルスズ、水素化トリ n -ブチルスズ、水素化ジフェニルスズ、水素化ジ n -ブチルスズ、水素化トリエチルスズ、水素化トリメチルスズ、トリクロシラン／トリ n -ブチルアミン、トリクロシラン／トリ n -プロピルアミン、トリエチルシラン、トリメチルシ

ラン、ジフェニルシラン、フェニルシラン、ポリメチルヒドロシロキサン、ジメチルフェニルシラン、ジ-n-ブチルシラン、メチルフェニルシランのような金属水素化物、水素化アルミニウムリチウム、水素化トリメトキシアルミニウムリチウム、水素化トリ-n-ブトキシアルミニウムリチウム、水素化アルミニウムリチウム-トリクロロアルミニウム（アラン）、水素化アルミニウムリチウム-三フッ化ホウ素、水素化アルミニウム塩化マグネシウム、水素化アルミニウムマグネシウム、水素化アルミニウムナトリウム、水素化トリエトキシアルミニウムナトリウム、水素化ビス（メトキシエトキシ）アルミニウムナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム-パラジウム/炭素、硫化水素化ホウ素ナトリウム、シアン化水素化ホウ素ナトリウム、水素化トリメトキシホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウム、シアン化水素化ホウ素リチウム、水素化トリエチルホウ素リチウム、水素化トリ-n-ブチルホウ素リチウム、水素化トリ-n-ブチルホウ素リチウム、水素化ホウ素カルシウム、水素化ホウ素カリウム、水素化トリイソプロポキシホウ素カリウム、水素化トリ-n-ブチルホウ素カリウム、水素化ホウ素亜鉛、水素化ホウ素テトラメチルアンモニウム、水素化シアノホウ素テトラ-n-ブチルアンモニウムのような金属水素錯化合物であり、好ましくは、水素化トリ-n-ブチルスズ、トリエチルシラン、シアン化水素化ホウ素ナトリウム等である。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、0℃～150℃（好適には、10℃～100℃）である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～24時間（好適には、30分間～15時間）である。

【0204】

また、この工程で副生する、化合物（33）の11位のアリル基が α 配置である化合物を用いることにより、化合物（35）、化合物（36）、化合物（38）、及び化合物（39）の X^1 が α 配置である化合物を得ることができる。

【0205】

第E3工程は、化合物（34）を製造する工程で、不活性溶媒中、有機金属触媒存在下、化合物（33）と化合物（141）を反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A4工程と同様に行われる。

【0206】

第E4工程は、化合物(35)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(34)を酸と反応させるとこにより達成され、本反応は、前記A法第A5工程と同様に行われる。

【0207】

第E5工程は、化合物(36)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記A法第A6工程と同様に行われる。

【0208】

第E7工程は、化合物(36)の R^4 における Q^2 が-S-である場合、化合物(38)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(36)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A8工程と同様に行われる。

【0209】

第E8工程は、化合物(36)の R^4 における Q^2 が-S-である場合、化合物(39)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(36)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A9工程と同様に行われる。


【0210】

E'法は、化合物(35)の、破線が実線と共に二重結合である化合物(247)及び、化合物(36)の、破線が実線と共に単結合である化合物(248)を製造する別の方法である。

【0211】

【化 2 2】

E' 法



【0 2 1 2】

第E' 1工程は、化合物（1 6 5）を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物（1 3 4）と金属（好適には、マグネシウム）又はアルキルリチウム（好適には、*t*-ブチルリチウム）を反応させることにより得られる化合物（1 3 4）の反応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物（1 6 4）と反応させることにより達成されるか、あるいは、不活性溶媒中、活性化剤の存在下、化合物（1 6 4）を化合物（1 4 0）と反応させることによっても達成され、本反応は、前記E法第E 1工程と同様に行われる。

【0 2 1 3】

第E' 2工程は、化合物（1 6 6）を製造する工程で、不活性溶媒中、添加剤の存在下、化合物（1 6 6）を還元剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記E法第E 2工程と同様に行われる。

【0 2 1 4】

また、この工程で副生する、化合物（1 6 6）の1 1位のアリル基が α 配置である化合物を用いることにより、化合物（3 5）及び化合物（3 6）のX¹が α 配置である化合物を得ることができる。

【0 2 1 5】

第E' 3工程は、化合物(1 6 7)を製造する工程で、不活性溶媒中、有機金属触媒存在下、化合物(1 6 6)と化合物(1 4 1)を反応させることにより達成され、本反応は、前記E法第E 3工程と同様に行われる。

【0 2 1 6】

第E' 4工程は、化合物(1 6 8)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(1 6 7)を酸と反応させるとにより達成され、本反応は、前記D' 法第D' 5工程と同様に行われる。

【0 2 1 7】

第E' 5工程は、化合物(2 4 7)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(1 6 8)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A 1 2工程と同様に行われる。

【0 2 1 8】


第E' 6工程は、化合物(3 6)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記A法第A 6工程と同様に行われる。

【0 2 1 9】

F法は、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A がメチレン基であり、 R^1 が $-CH_2-G^4-S(O)-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(4 9)、並びに一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A がメチレン基であり、 R^1 が $-CH_2-G^4-S(O)_2-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(5 2)を製造する方法である。

【0220】

【化23】



【0221】

第F1工程は、化合物(42)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(142)とアルキルリチウム(好適には、*n*-ブチルリチウム)を反応させることにより得られる化合物(142)の反応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物(2)と反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しなければ、特に限定されないが、好適には、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル類であり、更に好ましくは、テトラヒドロフラン等である。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、0℃～80℃(好適には、10℃～50℃)である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～24時間(好適には、30分間～15時間)である。

【0222】

第F2工程は、化合物(43)を製造する工程で、不活性溶媒中、添加剤の存在下、化合物(42)を還元剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記E法第E2工程と同様に行われる。

【0223】

また、この工程で副生する、化合物(43)の11位の置換基が α 配置である化合物を用いることにより、化合物(49)及び化合物(52)の X^1 が α 配置である化合物を得ることができる。

【0224】

第F3工程は、化合物(44)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(43)と脱保護剤を反応させること、すなわち置換シリル基を除去することにより達成され、本反応は、前記B法第B2工程と同様に行なわれる。

【0225】

第F4工程は、化合物(45)を製造する工程で、アミン系溶媒中、化合物(44)を塩化スルホニル化合物と反応させるか、あるいは、不活性溶媒中、化合物(44)をハロゲン化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記B法第B3工程と同様に行なわれる。

【0226】

第F5工程は、化合物(46)を製造する工程で、アルコール系溶媒中、化合物(137)と金属アルコキシドを反応させることにより得られる化合物(137)の反応性誘導体を、アルコール系溶媒中、化合物(45)と反応させることにより達成され、本反応は、前記B法第B4工程と同様に行なわれる。

【0227】

第F6工程は、化合物(47)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(46)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A8工程と同様に行われる。

【0228】

第F7工程は、化合物(48)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(47)を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A5工程と同様

に行われる。

【0229】

第F8工程は、化合物(49)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、化合物(48)の接触還元を行うことにより達成される。

使用される溶媒は、メタノール、エタノール、*n*-プロパノール、*i*-プロパノール、*n*-ブタノール、*s*-ブタノール、*t*-ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、シクロプロパノール、シクロブタノール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、エチレングルコール、1,3-プロパンジオール、1,4-ブタンジオール、1,5-ペンタンジオールのようなアルコール系溶媒、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、シクロヘキサン、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセタミド、ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルホルムアミド、*N*-メチルピロリドン、酢酸エチル、アセトニトリル、ニトロメタン等であり得、好適には、酢酸エチル等である。

接触還元を用いる条件は、例えば、水素-クロロトリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I)、水素-クロロトリス(トリパラトリルホスフィン)ロジウム(I)、水素-クロロトリス(トリパラメトキシフェニルホスフィン)ロジウム(I)、水素-ヒドリドカルボニルトリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I)、水素-酢酸ロジウム(II)、水素-酢酸ルテニウム(II)、水素-クロロヒドリドトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)、水素-カルボキシラトヒドリドトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)、水素-ヒドリドカルボニルトリス(トリフェニルホスフィン)イリジウム(I)、水素-白金(II)-塩化スズ錯体、水素-ペンタシアノコバルト(II)錯体、水素-トリシアノビビリジンコバルト(II)錯体、水素-ビス(ジメチルグリオキシマト)コバルト(II)錯体、水素-安息香酸メチル-トリカルボニルクロム錯体、水素-ビス(トリカルボニルシクロペンタジエニルクロム)、水素-ペンタカルボニル鉄、水素-ビス(シクロペンタジエニル)ジカルボニルチタン、水素-ヒドリドカルボニルコバルト錯体、水素-オクタカルボニル

ニコバルト、水素-ヒドリドカルボニルロジウム、水素-クロム (I I I) アセチルアセトナート-トリイソブチルアルミニウム、水素-コバルト (I I) アセチルアセトナート-トリイソブチルアルミニウム、水素-ニッケル (I I) - 2 - ヘキサノアート-トリエチルアルミニウム等の均一系、水素-二酸化白金、水素-白金/炭素、水素-パラジウム/炭素、水素-パラジウム/硫酸バリウム、水素-パラジウム/炭酸カルシウム、水素-ラネ-ニッケル、水素-カッパークロマイト、水素-ロジウム/炭素、水素-ロジウム/アルミナ、水素-二酸化ルテニウム、水素-ルテニウム/炭素等の不均一系条件であり得、好ましくは、水素-パラジウム/炭素等である。

反応温度は、通常 0℃～100℃であり、好適には 0℃～60℃である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常、10 分間～24 時間であり、好適には 10 分間～6 時間である。

また、破線が、実線と共に、二重結合を形成している場合、この反応に付随して、単結合に変換されることもある。

【0 2 3 0】


第 F 1 1 工程は、化合物 (5 2) を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物 (4 9) を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記 B 法第 B 7 工程と同様に行われる。

【0 2 3 1】

F' 法は、化合物 (4 8) の、破線が実線と共に二重結合である化合物 (2 4 9) を製造する別の方法である。

【0 2 3 2】

【化 24】



【0233】

第F' 1工程は、化合物(169)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(142)とアルキルリチウム(好適には、n-ブチルリチウム)を反応させることにより得られる化合物(142)の反応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物(164)と反応させることにより達成され、本反応は、前記F法第F1工程と同様に行われる。

【0234】

第F' 2工程は、化合物(170)を製造する工程で、不活性溶媒中、添加剤の存在下、化合物(169)を還元剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記F法第F2工程と同様に行われる。

【0235】

また、この工程で副生する、化合物(170)の11位の置換基が α 配置である化合物を用いることにより、化合物(249)の X^1 が α 配置である化合物を得ることができる。

【0236】

第F' 3工程は、化合物(171)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(170)と脱保護剤を反応させること、すなわち置換シリル基を除去することにより達成され、本反応は、前記F法第F 3工程と同様に行なわれる。

【0237】

第F' 4工程は、化合物(172)を製造する工程で、アミン系溶媒中、化合物(171)を塩化スルホニル化合物と反応させるか、あるいは、不活性溶媒中、化合物(171)をハロゲン化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記F法第F 4工程と同様に行なわれる。

【0238】

第F' 5工程は、化合物(173)を製造する工程で、アルコール系溶媒中、化合物(137)と金属アルコキシドを反応させることにより得られる化合物(137)の反応性誘導体を、アルコール系溶媒中、化合物(172)と反応させることにより達成され、本反応は、前記F法第F 5工程と同様に行なわれる。

【0239】

第F' 6工程は、化合物(174)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(173)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記F法第F 6工程と同様に行われる。

【0240】

第F' 7工程は、化合物(175)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(174)を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記E' 法第E' 4工程と同様に行われる。

【0241】

第F' 8工程は、化合物(249)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(175)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記E' 法第E' 5工程と同様に行われる。

【0242】


G法は、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、Arが単結合であり、Aがメチレン基であり、 R^1 が $-CH_2-G^4-COOH$ であ

り、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (56)、並びに一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (II) で表される基であり、かつその一般式 (II) で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A がメチレン基であり、 R^1 が $-CH_2-G^4-CONH-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (57) を製造する方法である。

【0243】

【化25】

G 法



【0244】

第 G1 工程は、化合物 (53) を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物 (45) をシアノ化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記 C 法第 C1 工程と同様に行われる。

【0245】

第 G2 工程は、化合物 (54) を製造する工程で、化合物 (53) を塩基の存在下加水分解することにより達成され、本反応は、前記 C 法第 C2 工程と同様に行われる。

【0246】

第G 3 工程は、化合物 (5 5) を製造する工程で、水系溶媒中、化合物 (5 4) を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記A 法第A 5 工程と同様に行われる。

【 0 2 4 7 】

第G 4 工程は、化合物 (5 6) を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記F 法第F 8 工程と同様に行われる。

また、破線が、実線と共に、二重結合を形成している場合、この反応に付随して、単結合に変換されることもある。

【 0 2 4 8 】

第G 5 工程は、化合物 (5 7) を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物 (5 6) 又はその反応性誘導体 (酸ハライド類、混合酸無水物又は活性エステル類) と、化合物 (1 3 8) 又はその酸付加塩を反応させることにより達成され、本反応は、前記C 法第C 3 工程と同様に行われる。


【 0 2 4 9 】

G' 法は、化合物 (5 5) の、破線が実線と共に二重結合である化合物 (2 5 0) を製造する別の方法である。

【 0 2 5 0 】

【 化 2 6 】

G' 法



第G' 1工程は、化合物(176)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(172)をシアノ化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記G法第G1工程と同様に行われる。

【0252】

第G' 2工程は、化合物(177)を製造する工程で、化合物(176)を塩基の存在下加水分解することにより達成され、本反応は、前記G法第G2工程と同様に行われる。

【0253】

第G' 3工程は、化合物(178)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(177)を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記F' 法第F' 7工程と同様に行われる。

【0254】

第G' 4工程は、化合物(250)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(178)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記F' 法第F' 8工程と同様に行われる。


【0255】

H法は、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、Arが単結合であり、Aがメチレン基であり、 R^1 が $-CH_2-G_4-NHCO-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(63)を製造する方法である。

【0256】

【化 2 7】

H 法



【 0 2 5 7 】

第H 1 工程は、化合物（5 9）を製造する工程で、不活性溶媒中、アソジカルボン酸ジアルキルエステル（好適には、アソジカルボン酸ジエチル）及びホスフィン化合物（好適には、トリフェニルホスフィン）の存在下、化合物（4 4）をフタルイミドと反応させることにより達成され、本反応は、前記D 法第D 1 工程と同様に行われる。

【 0 2 5 8 】

第H 2 工程は、化合物（5 9）を製造する別の工程で、不活性溶媒中、化合物（4 5）をフタルイミドの金属塩（好適には、フタルイミドカリウム）と反応させることにより達成され、本反応は、前記D 法第D 2 工程と同様に行われる。

【 0 2 5 9 】

第H 3 工程は、化合物（6 0）を製造する工程で、アルコール系溶媒中、化合物（5 9）を、アミン系化合物（好適には、ヒドラジン）と反応させることにより達成され、本反応は、前記D 法第D 3 工程と同様に行われる。

【0260】

第H4工程は、化合物(61)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(139)又はその反応性誘導体(酸ハライド類、混合酸無水物又は活性エステル類)と、化合物(60)又はその酸付加塩を反応させることにより達成され、本反応は、前記C法第C3工程と同様に行われる。

【0261】

第H5工程は、化合物(62)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(61)を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A5工程と同様に行われる。

【0262】

第H6工程は、化合物(63)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記F法第F8工程と同様に行われる。


また、破線が、実線と共に、二重結合を形成している場合、この反応に付随して、単結合に変換されることもある。

【0263】

H'法は、化合物(62)の、破線が実線と共に二重結合である化合物(251)を製造する別の方法である。

【0264】

【化 28】



【0265】

第H' 1工程は、化合物（179）を製造する工程で、不活性溶媒中、アソジカルボン酸ジアルキルエステル（好適には、アソジカルボン酸ジエチル）及びホスフィン化合物（好適には、トリフェニルホスフィン）の存在下、化合物（171）をフタルイミドと反応させることにより達成され、本反応は、前記H法第H 1工程と同様に行われる。

【0266】

第H' 2工程は、化合物（179）を製造する別の工程で、不活性溶媒中、化合物（172）をフタルイミドの金属塩（好適には、フタルイミドカリウム）と反応させることにより達成され、本反応は、前記H法第H 2工程と同様に行われる。

【0267】

第H' 3工程は、化合物（180）を製造する工程で、アルコール系溶媒中、化合物（179）を、アミン系化合物（好適には、ヒドラジン）と反応させるこ

とにより達成され、本反応は、前記H法第H3工程と同様に行われる。

【0268】

第H' 4工程は、化合物(181)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(139)又はその反応性誘導体(酸ハライド類、混合酸無水物又は活性エステル類)と、化合物(180)又はその酸付加塩を反応させることにより達成され、本反応は、前記H法第H4工程と同様に行われる。

【0269】

第H' 5工程は、化合物(182)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(181)を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記G' 法第G' 3工程と同様に行われる。

【0270】

第H' 6工程は、化合物(251)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(182)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記G' 法第G' 4工程と同様に行われる。

【0271】


I法は、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が芳香族炭化水素基(好ましくはp-フェニレン基)であり、Aが-O-であり、 R^1 が $-CH_2-CH=CH-CH_2-R^2$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(70)、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が芳香族炭化水素基(好ましくはp-フェニレン基)であり、Aが-O-であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-R^2$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(71)、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち

、Arが芳香族炭化水素基（好ましくはp-フェニレン基）であり、Aが-O-であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-G^2-S(O)-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒に $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(73)、並びに一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、Arが芳香族炭化水素基（好ましくはp-フェニレン基）であり、Aが-O-であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-G^2-S(O)_2-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒に $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(74)を製造する方法である。

【0272】

【化29】

1法



【0273】

第I1工程は、化合物(65)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(143)と金属(好適には、マグネシウム)又はアルキルリチウム(好適には、n-ブチルリチウム)を反応させることにより得られる化合物(143)の反応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物(2)と反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しなければ、特に限定されないが、好適には、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル類であり、更に好ましくは、テトラヒドロフラン等である。反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、0℃～80℃(好適には、10℃～50℃)である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～24時間(好適には、30分間～15時間)である。

【0274】

第I2工程は、化合物(66)を製造する工程で、不活性溶媒中、添加剤の存在下、化合物(65)を還元剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記E法第E2工程と同様に行われる。

【0275】

また、この工程で副生する、化合物(66)の11位の $-C_6H_4-OR^3$ が α 配置である化合物を用いることにより、化合物(70)、化合物(71)、化合物(73)、及び化合物(74)の X^1 が α 配置である化合物を得ることができる。

【0276】

さらに、化合物(66)及びその11位の $-C_6H_4-OR^3$ が α 配置である化合物の合成にあたっては、Tetrahedron, vol. 52, 1529-1542, 1996に開示された各種の芳香族炭化水素基の導入法を参照することもできる。

【0277】

第I3工程は、化合物(67)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(66)と脱保護剤を反応させること、すなわち置換シリル基を除去することにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応を阻害しないものであれば、特に限定されないが、例えば、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ジメチルホルムアミド、水等であり、好適には、テトラヒドロフラン等である。使用される脱保護剤は、特に限定されないが、例えば、フッ化水素、フッ化水素-ピリジン、フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、フッ化テトラ-*n*-ブチルアンモニウムのようなフッ化物、蟻酸、酢酸、*p*-トルエンスルホン酸のような有機酸であり、好ましくは、フッ化テトラ-*n*-ブチルアンモニウム等である。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、0℃～80℃（好適には、0℃～50℃）である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～24時間（好適には、30分間～15時間）である。

【0278】

第I4工程は、化合物(68)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(67)に塩基を反応させることにより得られる化合物(67)の塩を、不活性溶媒中、化合物(134)と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A3工程と同様に行われる。

【0279】

第I5工程は、化合物(69)を製造する工程で、不活性溶媒中、有機金属触媒存在下、化合物(68)と化合物(135)を反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A4工程と同様に行われる。

【0280】

第I6工程は、化合物(70)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(69)を酸と反応させるところにより達成され、本反応は、前記A法第A5工程と同様に行われる。

【0281】

第I7工程は、化合物(71)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記A法第A6工程と同様に行われる。

【0282】

第I9工程は、化合物(71)の R^2 における Q^2 が-S-である場合、化合物(73)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(71)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A8工程と同様に行われる。

【0283】

第I10工程は、化合物(74)の R^2 における Q^2 が-S-である場合、化合物(74)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(71)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A9工程と同様に行われる。


【0284】

I'法は、化合物(70)の、破線が実線と共に二重結合である化合物(252)を製造する別の方法である。

【0285】

【化30】

I'法



【0286】

第I'1工程は、化合物(184)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(143)と金属(好適には、マグネシウム)又はアルキルリチウム(好適には、n-ブチルリチウム)を反応させることにより得られる化合物(143)の反

応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物(164)と反応させることにより達成され、本反応は、前記I法第I1工程と同様に行われる。

【0287】

第I'2工程は、化合物(185)を製造する工程で、不活性溶媒中、添加剤の存在下、化合物(184)を還元剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記I法第I2工程と同様に行われる。

【0288】

また、この工程で副生する、化合物(185)の11位の $-C_6H_4-OR^3$ が α 配置である化合物を用いることにより、化合物(252)の X^1 が α 配置である化合物を得ることができる。

【0289】

さらに、化合物(185)及びその11位の $-C_6H_4-OR^3$ が α 配置である化合物の合成にあたっては、Tetrahedron, vol. 52, 1529-1542, 1996に開示された各種の芳香族炭化水素基の導入法を参照することもできる。

【0290】

第I'3工程は、化合物(186)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(185)と脱保護剤を反応させること、すなわち置換シリル基を除去することにより達成され、本反応は、前記I法第I3工程と同様に行われる。

【0291】

第I'4工程は、化合物(187)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(186)に塩基を反応させることにより得られる化合物(186)の塩を、不活性溶媒中、化合物(134)と反応させることにより達成され、本反応は、前記I法第I4工程と同様に行われる。

【0292】

第I'5工程は、化合物(188)を製造する工程で、不活性溶媒中、有機金属触媒存在下、化合物(187)と化合物(135)を反応させることにより達成され、本反応は、前記I法第I5工程と同様に行われる。

【0293】

第 I' 6 工程は、化合物 (189) を製造する工程で、水系溶媒中、化合物 (188) を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記 H' 法第 H' 5 工程と同様に行われる。

【0294】

第 I' 7 工程は、化合物 (252) を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物 (189) と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記 H' 法第 H' 6 工程と同様に行われる。


【0295】

J 法は、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (II) で表される基であり、かつその一般式 (II) で表される基のうち、 A_r が芳香族炭化水素基（好ましくは p-フェニレン基）であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-G-S-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒に $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (81)、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (II) で表される基であり、かつその一般式 (II) で表される基のうち、 A_r が芳香族炭化水素基（好ましくは p-フェニレン基）であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-G-S(O)-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒に $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (82)、並びに一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (II) で表される基であり、かつその一般式 (II) で表される基のうち、 A_r が芳香族炭化水素基（好ましくは p-フェニレン基）であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-G-S(O)_2-Z$ であり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒に $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (83) を製造する方法である。

【0296】

【化 3 1】

J 法



【0 2 9 7】

第 J 1 工程は、化合物 (7 7) を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物 (6 7) に塩基を反応させることにより得られる化合物 (6 7) の塩を、不活性溶媒中、化合物 (1 3 6) と反応させることにより達成され、本反応は、前記 A 法第 A 3 工程と同様に行われる。

【0 2 9 8】

第 J 2 工程は、化合物 (7 8) を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物 (7 7) と脱保護剤を反応させること、すなわち置換シリル基を除去することにより達成され、本反応は、前記 B 法第 B 2 工程と同様に行われる。

【0 2 9 9】

第 J 3 工程は、化合物 (7 9) を製造する工程で、アミン系溶媒中、化合物 (7 8) を塩化スルホニル化合物と反応させるか、あるいは、不活性溶媒中、化合物 (7 8) をハロゲン化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記 B

法第B3工程と同様に行われる。

【0300】

第J4工程は、化合物(80)を製造する工程で、アルコール系溶媒中、化合物(137)と金属アルコキシドを反応させることにより得られる化合物(137)の反応性誘導体を、アルコール系溶媒中、化合物(79)と反応させることにより達成され、本反応は、前記B法第B4工程と同様に行われる。

【0301】

第J5工程は、化合物(81)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(80)を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A5工程と同様に行われる。

【0302】

第J6工程は、化合物(82)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(81)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A8工程と同様に行われる。

【0303】

第J7工程は、化合物(83)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(82)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記B法第B7工程と同様に行われる。


【0304】

J'法は、化合物(81)の、破線が実線と共に二重結合である化合物(253)及び、化合物(81)の、破線が実線と共に単結合である化合物(254)を製造する別の方法である。

【0305】

【化 3 2】

J' 法



【0 3 0 6】

第 J' 1 工程は、化合物 (190) を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物 (186) に塩基を反応させることにより得られる化合物 (186) の塩を、不活性溶媒中、化合物 (136) と反応させることにより達成され、本反応は、前記 J 法第 J 1 工程と同様に行われる。

【0 3 0 7】

第 J' 2 工程は、化合物 (191) を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物 (190) と脱保護剤を反応させること、すなわち置換シリル基を除去することにより達成され、本反応は、前記 J 法第 J 2 工程と同様に行われる。

【0 3 0 8】

第 J' 3 工程は、化合物 (192) を製造する工程で、アミン系溶媒中、化合物 (191) を塩化スルホニル化合物と反応させるか、あるいは、不活性溶媒中、化合物 (191) をハロゲン化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記 J 法第 J 3 工程と同様に行われる。

【0309】

第J' 4工程は、化合物(193)を製造する工程で、アルコール系溶媒中、化合物(137)と金属アルコキシドを反応させることにより得られる化合物(137)の反応性誘導体を、アルコール系溶媒中、化合物(192)と反応させることにより達成され、本反応は、前記J法第J 4工程と同様に行われる。

【0310】

第J' 5工程は、化合物(194)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(193)を酸と反応させるとこにより達成され、本反応は、前記I' 法第I' 6工程と同様に行われる。

【0311】

第J' 6工程は、化合物(253)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(194)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記I' 法第I' 7工程と同様に行われる。

【0312】

第J' 7工程は、化合物(254)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、化合物(253)の接触還元を行なうか、又は、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(253)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記C' 法第C' 6工程と同様に行われる。


【0313】

K法は、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、Arが芳香族炭化水素基(好ましくはp-フェニレン基)であり、Aが-O-であり、 R^1 が-G-CONH-Zであり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって-(C=O)-であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(89)を製造する方法である。

【0314】

【化 3 3】

K 法



【0 3 1 5】

第K 1 工程は、化合物（8 6）を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物（7 9）をシアノ化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記C 法第C 1 工程と同様に行われる。

【0 3 1 6】

第K 2 工程は、化合物（8 7）を製造する工程で、化合物（8 6）を塩基の存在下加水分解することにより達成され、本反応は、前記C 法第C 2 工程と同様に行われる。

【0 3 1 7】

第K 3 工程は、化合物（8 8）を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物（8 7）又はその反応性誘導体（酸ハライド類、混合酸無水物又は活性エステル類）と、化合物（1 3 8）又はその酸付加塩を反応させることにより達成され、本反応は、前記C 法第C 3 工程と同様に行われる。

【0 3 1 8】

第K 4 工程は、化合物（8 9）を製造する工程で、水系溶媒中、化合物（8 8）を酸と反応させるとこにより達成され、本反応は、前記A 法第A 5 工程と同様に行われる。


【0 3 1 9】

K' 法は、化合物（8 9）の、破線が実線と共に二重結合である化合物（2 5

5) 及び、化合物(89)の、破線が実線と共に単結合である化合物(199)を製造する方法である。

【0320】

【化34】



【0321】

第K' 1工程は、化合物(195)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(192)をシアノ化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記K法第K 1工程と同様に行われる。

【0322】

第K' 2工程は、化合物(196)を製造する工程で、化合物(195)を塩基の存在下加水分解することにより達成され、本反応は、前記K法第K 2工程と同様に行われる。

【0323】

第K' 3工程は、化合物(197)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(196)又はその反応性誘導体(酸ハライド類、混合酸無水物又は活性エステル類)と、化合物(138)又はその酸付加塩を反応させることにより達成され、本反応は、前記K法第K 3工程と同様に行われる。

【0 3 2 4】

第K' 4工程は、化合物(1 9 8)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(1 9 7)を酸と反応させるとこにより達成され、本反応は、前記J' 法第J' 5工程と同様に行われる。

【0 3 2 5】

第K' 5工程は、化合物(2 5 5)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(1 9 8)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記J' 法第J' 6工程と同様に行われる。

【0 3 2 6】

K' 6工程は、化合物(1 9 9)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、化合物(2 5 5)の接触還元を行なうか、又は、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(2 5 5)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記C' 法第C' 6工程と同様に行われる。


【0 3 2 7】

L法は、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、Arが芳香族炭化水素基(好ましくはp-フェニレン基)であり、Aが-O-であり、 R^1 が-G-NHCO-Zであり、 X^2 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって-(C=O)-であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(9 4)を製造する方法である。

【0 3 2 8】

【化 35】

L 法



【0329】

第L1工程は、化合物(91)を製造する工程で、不活性溶媒中、アゾジカルボン酸ジアルキルエステル(好適には、アゾジカルボン酸ジエチル)及びホスフィン化合物(好適には、トリフェニルホスフィン)の存在下、化合物(78)をフタルイミドと反応させることにより達成され、本反応は、前記D法第D1工程と同様に行われる。

【0330】

第L2工程は、化合物(91)を製造する別の工程で、不活性溶媒中、化合物(79)をフタルイミドの金属塩(好適には、フタルイミドカリウム)と反応させることにより達成され、本反応は、前記D法第D2工程と同様に行われる。

【0331】

第L3工程は、化合物(92)を製造する工程で、アルコール系溶媒中、化合物(91)を、アミン系化合物(好適には、ヒドラジン)と反応させることにより達成され、本反応は、前記D法第D3工程と同様に行われる。

【0332】

第L4工程は、化合物(93)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(139)又はその反応性誘導体(酸ハライド類、混合酸無水物又は活性エステル類)と、化合物(92)又はその酸付加塩を反応させることにより達成され、本反応は、前記C法第C3工程と同様に行われる。

【0333】

第L5工程は、化合物(94)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(93)を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A5工程と同様に行われる。


【0334】

L'法は、化合物(94)の、破線が実線と共に二重結合である化合物(256)、及び化合物(94)の、破線が実線と共に単結合である化合物(199)を製造する別の方法である。

【0335】

【化36】

L'法



【0336】

第L' 1工程は、化合物(200)を製造する工程で、不活性溶媒中、アゾジカルボン酸ジアルキルエステル(好適には、アゾジカルボン酸ジエチル)及びホスフィン化合物(好適には、トリフェニルホスフィン)の存在下、化合物(191)をフタルイミドと反応させることにより達成され、本反応は、前記L法第L1工程と同様に行われる。

【0337】

第L' 2工程は、化合物(200)を製造する別の工程で、不活性溶媒中、化合物(192)をフタルイミドの金属塩(好適には、フタルイミドカリウム)と反応させることにより達成され、本反応は、前記L法第L2工程と同様に行われる。

【0338】

第L' 3工程は、化合物(201)を製造する工程で、アルコール系溶媒中、化合物(200)を、アミン系化合物(好適には、ヒドラジン)と反応させることにより達成され、本反応は、前記L法第L3工程と同様に行われる。

【0339】

第L' 4工程は、化合物(202)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(139)又はその反応性誘導体(酸ハライド類、混合酸無水物又は活性エステル類)と、化合物(201)又はその酸付加塩を反応させることにより達成され、本反応は、前記L法第L4工程と同様に行われる。

【0340】

第L' 5工程は、化合物(203)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(202)を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記K'法第K'4工程と同様に行われる。

【0341】

第L' 6工程は、化合物(256)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(203)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記K'法第K'5工程と同様に行われる。

【0342】

L' 7工程は、化合物(199)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、化合物(256)の接触還元を行なうか、又は、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(256)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記C' 法第C' 6工程と同様に行われる。


【0343】

M法は、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が水素原子であり、 X^2 が、 α 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が単結合であり、Aが-O-であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-R^2$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(102)、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が水素原子であり、 X^2 が、 α 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が単結合であり、Aが-O-であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-G^2-S(O)-Z$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(104)、並びに一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が水素原子であり、 X^2 が、 α 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が単結合であり、Aが-O-であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-G^2-S(O)_2-Z$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(105)を製造する方法である。

【0344】

【化 37】

M法



【0345】

第M1工程は、化合物(97)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(96)に塩基を反応させることにより得られる化合物(96)の塩を、不活性溶媒中、化合物(134)と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A3工程と同様に行われる。

【0346】

また、化合物(96)の7位の水酸基が、 β 配置である化合物も、例えばJ. Org. Chem., 26, 2856-2859 (1961)により公知であり、これを化合物(96)の代わりに用いることにより、化合物(102)、化合物(104)、及び化合物(105)のX²が β 配置である化合物を得ることができる。

【0347】

第M3工程は、化合物(100)を製造する工程で、不活性溶媒中、有機金属触媒存在下、化合物(97)と化合物(135)を反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A4工程と同様に行われる。

【0348】

第M5工程は、化合物(101)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記A法第A6工程と同様に行われる。

【0349】

第M6工程は、化合物(102)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(101)と還元剤を反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応を阻害しないものであれば特に限定されないが、例えば、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、メタノール、エタノールのようなアルコール系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、ピリジン、トリエチルアミンのようなアミン類であり、好適にはメタノール、エタノールのようなアルコール系溶媒であり、さらに好適にはメタノール等である。使用される還元剤は、例えば、水素化アルミニウムリチウム、水素化トリメトキシアルミニウムリチウム、水素化トリ-tert-ブトキシアルミニウムリチウム、水素化アルミニウムリチウム-トリクロロアルミニウム(アラン)、水素化アルミニウムリチウム-三フッ化ホウ素、水素化アルミニウム塩化マグネシウム、水素化アルミニウムマグネシウム、水素化アルミニウムナトリウム、水素化トリエトキシアルミニウムナトリウム、水素化ビス(メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム-パラジウム/炭素、硫化水素化ホウ素ナトリウム、シアン化水素化ホウ素ナトリウム、水素化トリメトキシホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウム、シアン化水素化ホウ素リチウム、水素化トリエチルホウ素リチウム、水素化トリ-tert-ブチルホウ素リチウム、水素化ホウ素カルシウム、水素化ホウ素カリウム、水素化トリイソプロポキシホウ素カリウム、水素化トリ-tert-ブチルホウ素カリウム、水素化ホウ素亜鉛、水素化ホウ素テトラメチルアンモニウム、水素化シアノホウ素テトラ-tert-ブチルアンモニウムのような金属水素錯化合物、水素化ジイソブチルアルミニウム、水素化トリフェニルスズ、水素化トリ-n-ブチルスズ、水素化ジフェニルスズ、水素化ジ-n-ブチルスズ、水素化トリエチルスズ、水素化トリメチルスズ、トリクロシラン/トリ-n-ブ

チルアミン、トリクロロシラン／トリ-*n*-プロピルアミン、トリエチルシラン、
 トリメチルシラン、ジフェニルシラン、フェニルシラン、ポリメチルヒドロシ
 ロキサン、ジメチルフェニルシラン、ジ-*n*-ブチルシラン、メチルフェニルシ
 ランのような金属水素化物、ジボラン、ジメチルアミン-ボラン、トリメチルア
 ミン-ボラン、エチレンジアミン-ボラン、ピリジン-ボラン、ジメチルスルフ
 ィド-ボラン、2, 3-ジメチル-2-ブチルボラン (hexylborane)、ビス-3-メチル-2-ブチルボラン (disiamylborane)、
 ジイソピノカンフェニルボラン、ジシクロヘキシルボラン、9-ボラビシクロ
 [3, 3, 1] ノナン (9-BBN) のようなボラン誘導体であり、好適には水
 素化アルミニウムリチウム、水素化トリメトキシアルミニウムリチウム、水素化
 トリ-*t*-ブトキシアルミニウムリチウム、水素化アルミニウムリチウム-トリ
 クロロアルミニウム (アラン)、水素化アルミニウムリチウム-三フッ化ホウ素
 、水素化アルミニウム塩化マグネシウム、水素化アルミニウムマグネシウム、水
 素化アルミニウムナトリウム、水素化トリエトキシアルミニウムナトリウム、水
 素化ビス (メトキシエトキシ) アルミニウムナトリウム、水素化ホウ素ナトリウ
 ム、水素化ホウ素ナトリウム-パラジウム／炭素、硫化水素化ホウ素ナトリウム
 、シアン化水素化ホウ素ナトリウム、水素化トリメトキシホウ素ナトリウム、水
 素化ホウ素リチウム、シアン化水素化ホウ素リチウム、水素化トリエチルホウ素
 リチウム、水素化トリ-*s*-ブチルホウ素リチウム、水素化トリ-*t*-ブチルホ
 ウ素リチウム、水素化ホウ素カルシウム、水素化ホウ素カリウム、水素化トリイ
 ソプロボキシホウ素カリウム、水素化トリ-*s*-ブチルホウ素カリウム、水素化
 ホウ素亜鉛、水素化ホウ素テトラメチルアンモニウム、水素化シアノホウ素テト
 ラ-*n*-ブチルアンモニウムのような金属水素錯化合物であり、さらに好適には
 水素化ホウ素ナトリウム等である。反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、
 通常、-30℃～100℃であり、好適には0℃～70℃である。反応時間は、
 反応温度等により異なるが、通常10分間～48時間であり、好適には30分間
 ～24時間である。

【0350】

第M8工程は、化合物 (102) の R^2 における Q^2 が -S- である場合、化

化合物(104)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(102)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A8工程と同様に行われる。

【0351】

第M9工程は、化合物(102)の R^2 における Q^2 が-S-である場合、化合物(105)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(102)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A9工程と同様に行われる。

【0352】


N法は、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が水素原子であり、 X^2 が、 α 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が単結合であり、Aがメチレン基であり、 R^1 が $-CH=CH-CH_2-R^4$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に二重結合である化合物(112)、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が水素原子であり、 X^2 が、 α 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が単結合であり、Aがメチレン基であり、 R^1 が $-(CH_2)_3-R^4$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に二重結合である化合物(113)、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が水素原子であり、 X^2 が、 α 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が単結合であり、Aがメチレン基であり、 R^1 が $-(CH_2)_3-R^4$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合である化合物(114)、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が水素原子であり、 X^2 が、 α 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が単結合であり、Aがメチレン基であり、 R^1 が $-(CH_2)_3-G^3-S(O)-Z$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c

^cは、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって—(C=O)—であり、破線が実線と共に二重結合である化合物(115)、一般式(I)で表される化合物のうち、X¹が水素原子であり、X²が、α配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、A_rが単結合であり、Aがメチレン基であり、R¹が—(CH₂)₃—G³—S(O)₂—Zであり、R^aが水素原子であり、R^b及びR^cは、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって—(C=O)—であり、破線が実線と共に二重結合である化合物(116)、一般式(I)で表される化合物のうち、X¹が水素原子であり、X²が、α配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、A_rが単結合であり、Aがメチレン基であり、R¹が—(CH₂)₃—G³—S(O)—Zであり、R^aが水素原子であり、R^b及びR^cは、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって—(C=O)—であり、破線が実線と共に単結合である化合物(117)、並びに一般式(I)で表される化合物のうち、X¹が水素原子であり、X²が、α配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、A_rが単結合であり、Aがメチレン基であり、R¹が—(CH₂)₃—G³—S(O)₂—Zであり、R^aが水素原子であり、R^b及びR^cは、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって—(C=O)—であり、破線が実線と共に単結合である化合物(118)を製造する方法である。

【0353】

【化 38】

N法



【0354】

第N3工程は、化合物(112)を製造する工程で、不活性溶媒中、有機金属触媒存在下、化合物(108)と化合物(257)を反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A4工程と同様に行われる。

【0355】

第N5工程は、化合物(113)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記A法第A6工程と同様に行われる。

【0356】

第N6工程は、化合物(114)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、接触還元を行うことにより達成される。

使用される溶媒は、メタノール、エタノール、*n*-プロパノール、*i*-プロパノール、*n*-ブタノール、*s*-ブタノール、*t*-ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、シクロプロパノール、シクロブタノール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、エチレングリコール、1,3-プロパンジオール、1,4-ブタンジオール、1,5-ペンタンジオールのようなアルコール系溶媒、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶

媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系溶媒、シクロヘキサン、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセタミド、ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン、酢酸エチル、アセトニトリル、ニトロメタンであり得、好適には、メタノール、エタノール等である。

接触還元を用いる条件は、水素-クロロトリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I)、水素-クロロトリス(トリパラトリルホスフィン)ロジウム(I)、水素-クロロトリス(トリパラメトキシフェニルホスフィン)ロジウム(I)、水素-ヒドリドカルボニルトリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I)、水素-酢酸ロジウム(II)、水素-酢酸ルテニウム(II)、水素-クロロヒドリドトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)、水素-カルボキシラトヒドリドトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)、水素-ヒドリドカルボニルトリス(トリフェニルホスフィン)イリジウム(I)、水素-白金(II)-塩化スズ錯体、水素-ペンタシアノコバルト(II)錯体、水素-トリシアノビピリジンコバルト(II)錯体、水素-ビス(ジメチルグリオキシマト)コバルト(II)錯体、水素-安息香酸メチル-トリカルボニルクロム錯体、水素-ビス(トリカルボニルシクロペンタジエニルクロム)、水素-ペンタカルボニル鉄、水素-ビス(シクロペンタジエニル)ジカルボニルチタン、水素-ヒドリドカルボニルコバルト錯体、水素-オクタカルボニルニコバルト、水素-ヒドリドカルボニルロジウム、水素-クロム(III)アセチルアセトナート-トリイソブチルアルミニウム、水素-コバルト(II)アセチルアセトナート-トリイソブチルアルミニウム、水素-ニッケル(II)-2-ヘキサノアート-トリエチルアルミニウム等の均一系、水素-二酸化白金、水素-白金/炭素、水素-パラジウム/炭素、水素-パラジウム/硫酸バリウム、水素-パラジウム/炭酸カルシウム、水素-ラネーニッケル、水素-カッパークロマイト、水素-ロジウム/炭素、水素-ロジウム/アルミナ、水素-二酸化ルテニウム、水素-ルテニウム/炭素等の不均一系条件であり得、好ましくは、水素-パラジウム/炭素等である。

反応温度は、通常 0°C ～ 100°C であり、好適には 0°C ～ 60°C である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常、10 分間～24 時間であり、好適には 10 分間～6 時間である。

【0357】

第N7工程は、化合物(113)の R^2 における Q^4 が $-\text{S}-$ である場合、化合物(115)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(113)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A8工程と同様に行われる。

【0358】

第N8工程は、化合物(113)の R^2 における Q^4 が $-\text{S}-$ である場合、化合物(116)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(113)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A9工程と同様に行われる。

【0359】

第N9工程は、化合物(114)の R^2 における Q^4 が $-\text{S}-$ である場合、化合物(117)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(114)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A8工程と同様に行われる。

【0360】

第N10工程は、化合物(114)の R^2 における Q^4 が $-\text{S}-$ である場合、化合物(118)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(114)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A9工程と同様に行われる。

【0361】

第N11工程は、化合物(114)を製造する別の工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記N法第N6工程と同様に行なわれる。

【0362】


O法は、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^1 が水素原子であり、 X^2

が、 α 配置の、一般式 (I I) で表される基であり、かつその一般式 (I I) で表される基のうち、 A_r が芳香族炭化水素基 (好ましくは p -フェニレン基) であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-CH_2-CH=CH-CH_2-R^2$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に二重結合である化合物 (126)、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が水素原子であり、 X^2 が、 α 配置の、一般式 (I I) で表される基であり、かつその一般式 (I I) で表される基のうち、 A_r が芳香族炭化水素基 (好ましくは p -フェニレン基) であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-R^2$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に二重結合である化合物 (127)、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が水素原子であり、 X^2 が、 α 配置の、一般式 (I I) で表される基であり、かつその一般式 (I I) で表される基のうち、 A_r が芳香族炭化水素基 (好ましくは p -フェニレン基) であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-R^2$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合である化合物 (128)、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が水素原子であり、 X^2 が、 α 配置の、一般式 (I I) で表される基であり、かつその一般式 (I I) で表される基のうち、 A_r が芳香族炭化水素基 (好ましくは p -フェニレン基) であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-G^2-S(O)-Z$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に二重結合である化合物 (129)、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が水素原子であり、 X^2 が、 α 配置の、一般式 (I I) で表される基であり、かつその一般式 (I I) で表される基のうち、 A_r が芳香族炭化水素基 (好ましくは p -フェニレン基) であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-G^2-S(O)_2-Z$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に二重結合である化合物 (130)、一般式 (

I) で表される化合物のうち、 X^1 が水素原子であり、 X^2 が、 α 配置の、一般式 (II) で表される基であり、かつその一般式 (II) で表される基のうち、 A_r が芳香族炭化水素基（好ましくは p -フェニレン基）であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-G^2-S(O)-Z$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒に $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合である化合物 (131)、並びに一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^1 が水素原子であり、 X^2 が、 α 配置の、一般式 (II) で表される基であり、かつその一般式 (II) で表される基のうち、 A_r が芳香族炭化水素基（好ましくは p -フェニレン基）であり、 A が $-O-$ であり、 R^1 が $-(CH_2)_4-G^2-S(O)_2-Z$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒に $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合である化合物 (132) を製造する方法である。

【0363】

【化 39】



【0364】

第○1工程は、化合物（120）を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物（143）と金属（好適には、マグネシウム）又はアルキルリチウム（好適には、*t*-ブチルリチウム）を反応させることにより得られる化合物（143）の反応性誘導体を、不活性溶媒中、添加剤（好適には、テトラキス〔ヨウ化（トリ-*n*-ブチルホスフィン）銅（I）〕）の存在下、化合物（119）と反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しなければ、特に限定されないが、好適には、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル類であり、更に好ましくは、エーテルである。反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、 $-78^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ （好適には、 $-78^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ）である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～24時間（好適には、30分間～15時間）である。

【0365】

また、化合物(120)を製造する際に副生する、化合物(120)の7位の $-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OR}^3$ が β 配置である化合物を化合物(120)の代わりに用いることにより、化合物(126)、化合物(127)、化合物(128)、化合物(129)、化合物(130)、化合物(131)、及び化合物(132)の X^2 が β 配置である化合物を得ることができる。

【0366】

第02工程は、化合物(121)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(120)と脱保護剤を反応させること、すなわち置換シリル基を除去することにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応を阻害しないものであれば、特に限定されないが、例えば、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ジメチルホルムアミド、水であり、好適には、テトラヒドロフラン等である。使用される脱保護剤は、特に限定されないが、例えば、フッ化水素、フッ化水素-ピリジン、フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、フッ化テトラ- n -ブチルアンモニウムのようなフッ化物、塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、リン酸のような無機酸、蟻酸、酢酸、p-トルエンスルホン酸のような有機酸であり、好ましくは、フッ化テトラ- n -ブチルアンモニウム等である。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、 $0^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ （好適には、 $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ）である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～24時間（好適には、30分間～15時間）である。

【0367】

第〇3工程は、化合物(122)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(121)に塩基を反応させることにより得られる化合物(121)の塩を、不活性溶媒中、化合物(134)と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A3工程と同様に行われる。

【0368】

第〇5工程は、化合物(125)を製造する工程で、不活性溶媒中、有機金属触媒存在下、化合物(122)と化合物(135)を反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A4工程と同様に行われる。

【0369】

第〇6工程は、化合物(126)を製造する工程で、水又は水溶性溶媒中、塩基又は酸(好適には、塩基)の存在下、化合物(125)を加水分解することにより達成される。

使用される水溶性溶媒は、特に限定されないが、例えば、メタノール、エタノール、*n*-プロパノール、*i*-プロパノールのようなアルコール系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル系溶媒、ジメチルホルムアミド等であり、好適には、メタノール等である。

使用される塩基は、特に限定されないが、例えば、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化バリウム、水酸化セシウムのような金属水酸化物、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムのような炭酸塩であり、好適には、水酸化ナトリウム等である。

使用される酸は、特に限定されないが、例えば、塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、リン酸のような無機酸であり、好適には、塩酸等である。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、0℃～100℃(好適には、0℃～80℃)である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～24時間(好適には、30分間～15時間)である。

【0370】

第〇8工程は、化合物(127)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記A法第A6工程と同様に行われる。

【0371】

第09工程は、化合物(128)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記N法第N6工程と同様に行われる。

【0372】

第010工程は、化合物(127)の R^2 における Q^2 が-S-である場合、化合物(129)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(127)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A8工程と同様に行われる。

【0373】

第011工程は、化合物(127)の R^2 における Q^2 が-S-である場合、化合物(130)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(127)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A9工程と同様に行われる。

【0374】

第012工程は、化合物(128)の R^2 における Q^2 が-S-である場合、化合物(131)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(128)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A8工程と同様に行われる。

【0375】

第013工程は、化合物(128)の R^2 における Q^2 が-S-である場合、化合物(132)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(128)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記A法第A9工程と同様に行われる。


【0376】

P法は、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^2 が水素原子であり、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A がメチレン基であり、 R^1 が一般式(III)で表される基であり、かつその一般式(III)で表される基のうち

、Gが $-G^4-CH_2-$ であり、Eが単結合であり、Jが置換されていてもよい芳香族炭化水素基（好ましくはp-フェニレン基）であり、Yが単結合であり、Lが L^2 であり、Qが Q^{17} であり、 Q^{17} における R^7 が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒に $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(217)を製造する方法である。


【0377】

【化 40】



【0378】

【化 41】



【0379】

第P1工程は、化合物(205)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(204)とアルキルリチウム(好適には、*n*-ブチルリチウム)を反応させることにより得られる化合物(204)の反応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物(164)と反応させることにより達成され、本反応は、前記F法第F1工程と同様に行われる。

【0380】

第P2工程は、化合物(206)を製造する工程で、不活性溶媒中、添加剤の存在下、化合物(205)を還元剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記F法第F2工程と同様に行われる。

【0381】

また、この工程で副生する、化合物(206)の11位の置換基が α 配置である化合物を用いることにより、化合物(217)の X^1 が α 配置である化合物を得ることができる。

【0382】

第P3工程は、化合物(207)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(206)と脱保護剤を反応させること、すなわち置換シリル基を除去することにより達成され、本反応は、前記F法第F3工程と同様に行なわれる。

【0383】

第P4工程は、化合物(208)を製造する工程で、アミン系溶媒中、化合物(207)を塩化スルホニル化合物と反応させるか、あるいは、不活性溶媒中、化合物(207)をハロゲン化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記F法第F4工程と同様に行なわれる。

【0384】

第P5工程は、化合物(209)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(218)と金属(好適には、マグネシウム)又はアルキルリチウム(好適には、*n*-ブチルリチウム)を反応させることにより得られる化合物(218)の反応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物(208)と反応させることにより達成され、本反応は、前記I法第I1工程と同様に行われる。

【0385】

第P6工程は、化合物(210)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(209)と脱保護剤を反応させること、すなわち置換シリル基を除去することにより達成され、本反応は、前記P法第P3工程と同様に行なわれる。

【0386】

第P7工程は、化合物(211)を製造する工程で、アミン系溶媒中、化合物(210)を塩化スルホニル化合物と反応させるか、あるいは、不活性溶媒中、化合物(210)をハロゲン化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記P法第P4工程と同様に行なわれる。

【0387】

第P8工程は、化合物(212)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(219)と塩基を反応させることにより得られる化合物(219)の反応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物(211)と反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、本反応に関与しないものであれば特に限定しないが、例えば、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、キノリン、クロロベンゼンのような芳香族系溶媒、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセタミド、ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルホルムアミド、*N*-メチルピロリドン等であり、

好適にはテトラヒドロフランのようなエーテル系溶媒、ジメチルホルムアミド等である。使用される塩基は、例えばナトリウムアルコキシド、カリウム t -ブトキシドのような金属アルコキシド、水素化ナトリウム、水素化カリウム、水素化カルシウムのような金属水素化物、メチルリチウム、エチルリチウム、 n -ブチルリチウム、 t -ブチルリチウムのようなアルキルリチウム、ナトリウムアミド、カリウムビストリメチルシリルアミド、ナトリウムビストリメチルシリルアミド、リチウムジイソプロピルアミドのような金属アミド、炭酸セシウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムのような炭酸塩等であり、好適には水素化ナトリウムのような金属水素化物、リチウムジイソプロピルアミドのような金属アミド、炭酸セシウムのような炭酸塩等である。反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、 $-78^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ であり、好適には $0^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常10分間 \sim 24時間であり、好適には30分間 \sim 15時間である。

【0388】

第P9工程は、化合物(213)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(212)と塩基を反応させることにより得られる化合物(212)の反応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物(220)と反応させることにより達成され、本反応は、前記P法第P8工程と同様に行われる。

なお、本法において、Zが水素原子である場合、本工程は省略することができる。

【0389】

第P10工程は、化合物(214)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(213)を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記L'法第L'5工程と同様に行われる。

【0390】

第P11工程は、化合物(215)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(214)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記L'法第L'6工程と同様に行われる。

【0391】

第P12工程は、化合物(216)を製造する工程で、含水アルコールもしくは不活性溶媒中、化合物(215)と、酸、塩基もしくは金属塩を反応させることにより達成される。

使用される溶媒は、反応を阻害するものでなければ特に限定されないが、例えば、メタノール、エタノール、*n*-プロパノール、*i*-プロパノール、*n*-ブタノール、*s*-ブタノール、*t*-ブタノールのようなアルコール系溶媒と水との混合溶媒、ピリジンのようなアミン系溶媒、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセタミド、ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルホルムアミド等であり得、好適にはメタノールもしくはエタノールのようなアルコール系溶媒と水との混合溶媒、ジメチルスルホキシド等である。

使用される酸は、例えば、塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、リン酸のような無機酸であり得、好適には、塩酸、臭化水素酸等である。

使用される塩基は、例えば、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化バリウム、水酸化セシウムのような金属水酸化物であり得、好適には、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等である。

使用される金属塩は、例えば、塩化リチウム、シアン化ナトリウム等であり得、好適には塩化リチウム等である。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、25℃～180℃であり、好適には40℃～150℃である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常10分間～24時間であり、好適には30分間～15時間である。

【0392】

第P13工程は、化合物(217)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、化合物(216)の接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記F法第F8工程と同様に行われる。

また、破線が、実線と共に、二重結合を形成している場合、この反応に付随して、単結合に変換されることもある。

【0393】

第P14工程及び第P15工程は、化合物(209)を製造する別の方法であ

る。

第P14工程は、化合物(221)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(223)とアルキルリチウム(好適には、*n*-ブチルリチウム)を反応させることにより得られる化合物(223)の反応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物(164)と反応させることにより達成され、本反応は、前記P法第P1工程と同様に行われる。

【0394】

第P15工程は、化合物(209)を製造する工程で、不活性溶媒中、添加剤の存在下、化合物(209)を還元剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記P法第P2工程と同様に行われる。

【0395】

また、この工程で副生する、化合物(209)の11位の置換基が α 配置である化合物を用いることにより、化合物(217)の X^1 が α 配置である化合物を得ることができる。

【0396】

第P16工程は、化合物(222)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、化合物(209)の接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記P法第P13工程と同様に行われる。

化合物(222)を、化合物(209)と同様に第P6工程に付すことにより、化合物(217)の破線が実線と共に単結合である化合物を製造することができる。

【0397】


Q法は、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^2 が水素原子であり、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A がメチレン基であり、 R^1 が一般式(III)で表される基であり、かつその一般式(III)で表される基のうち、 G が $-(CH_2)_2-CH(OH)-G^3-$ であり、 E 、 J 、 Y 及び L が単結合であり、 Q が Q^{63} であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実

線と共に単結合又は二重結合である化合物 (2 3 4) 並びに、一般式 (I) で表される化合物のうち、 X^2 が水素原子であり、 X^1 が、 β 配置の、一般式 (I I) で表される基であり、かつその一般式 (I I) で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A がメチレン基であり、 R^1 が一般式 (I I I) で表される基であり、かつその一般式 (I I I) で表される基のうち、 G が $-(CH_2)_2-CH(OH)-G^3-$ であり、 E 、 J 、 Y 及び L が単結合であり、 Q が Q^{64} であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒に $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物 (2 3 5) を製造する方法である。

【0 3 9 8】

【化 4 2】

Q 法



【0399】

第Q1工程は、化合物(225)を製造する工程で、添加物(好適には、塩化

水銀 (I I) } の存在下もしくは非存在下 (好適には、存在下)、不活性溶媒中、化合物 (224) と金属 (好適には、マグネシウム) 又はアルキルリチウム (好適には、*t*-ブチルリチウム) を反応させることにより得られる化合物 (224) の反応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物 (183) と反応させることにより達成される。

使用される不活性溶媒は、反応に関与しなければ、特に限定されないが、好適には、エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタンのようなエーテル系溶媒等であり、更に好ましくは、エーテル、テトラヒドロフラン等である。

反応温度は、溶媒の種類等により異なるが、通常、0℃～80℃ (好適には、10℃～50℃) である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間～24時間 (好適には、30分間～15時間) である。

【0400】

第Q2工程は、化合物 (226) を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物 (225) とアルキルリチウム (好適には、*n*-ブチルリチウム) を反応させることにより得られる化合物 (225) の反応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物 (164) と反応させることにより達成され、本反応は、前記F法第F1工程と同様に行われる。

【0401】

第Q3工程は、化合物 (227) を製造する工程で、不活性溶媒中、添加剤の存在下、化合物 (226) を還元剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記F法第F2工程と同様に行われる。

【0402】

また、この工程で副生する、化合物 (227) の11位の置換基が α 配置である化合物を用いることにより、化合物 (234) 及び化合物 (235) の X^1 が α 配置である化合物を得ることができる。

【0403】

第Q4工程は、化合物 (228) を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物 (227) と脱保護剤を反応させること、すなわち置換シリル基を除去することに

より達成され、本反応は、前記F法第F3工程と同様に行なわれる。

【0404】

第Q5工程は、化合物(229)を製造する工程で、アミン系溶媒中、化合物(228)を塩化スルホニル化合物と反応させるか、あるいは、不活性溶媒中、化合物(228)をハロゲン化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記F法第F4工程と同様に行なわれる。

【0405】

第Q6工程は、化合物(230)を製造する工程で、アルコール系溶媒中、化合物(137)と金属アルコキシドを反応させることにより得られる化合物(137)の反応性誘導体を、アルコール系溶媒中、化合物(229)と反応させることにより達成され、本反応は、前記F法第F5工程と同様に行なわれる。

【0406】

第Q7工程は、化合物(231)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(230)を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記P法第P10工程と同様に行われる。

【0407】

第Q8工程は、化合物(232)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(231)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記P法第P11工程と同様に行われる。

【0408】

第Q9工程は、化合物(233)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(232)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記F法第F6工程と同様に行われる。

【0409】

第Q10工程は、化合物(234)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、化合物(233)の接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記F法第F8工程と同様に行われる。

また、破線が、実線と共に、二重結合を形成している場合、この反応に付随して、単結合に変換されることもある。

【0410】

第Q11工程は、化合物(235)を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物(234)を酸化剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記B法第B7工程と同様に行われる。

【0411】

なお、本法において、第Q5工程、第Q6工程、第Q9工程及び第Q11工程を省略することにより、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^2 が水素原子であり、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A がメチレン基であり、 R^1 が一般式(III)で表される基であり、かつその一般式(III)で表される基のうち、 G が $-(CH_2)_2-CH(OH)-G^3-$ であり、 E 、 J 、 Y 、 L 及び Q が単結合であり、 Z が $-O-R^d$ であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物も製造することができる。

さらに、本法において、 G 上の水酸基は、必要に応じて、任意の工程で、保護反応及び脱保護反応に付すことができる。


【0412】

R法は、一般式(I)で表される化合物のうち、 X^2 が水素原子であり、 X^1 が、 β 配置の、一般式(II)で表される基であり、かつその一般式(II)で表される基のうち、 A_r が単結合であり、 A がメチレン基であり、 R^1 が一般式(III)で表される基であり、かつその一般式(III)で表される基のうち、 G が $-(CH_2)_2-CH(OH)-G^3-$ であり、 E 、 J 、 Y 、 L 及び Q が単結合であり、 Z が水素原子であり、 R^a が水素原子であり、 R^b 及び R^c は、それらが結合している3位の炭素原子と一緒にあって $-(C=O)-$ であり、破線が実線と共に単結合又は二重結合である化合物(242)を製造する方法である。

【0413】

【化 4 3】

R 法



【0 4 1 4】

第 R 1 工程は、化合物 (2 3 7) を製造する工程で、添加物 (好適には、塩化水銀 (I I)) の存在下もしくは非存在下 (好適には、存在下)、不活性溶媒中、化合物 (2 2 4) と金属 (好適には、マグネシウム) 又はアルキルリチウム (好適には、t-ブチルリチウム) を反応させることにより得られる化合物 (2 2 4) の反応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物 (2 3 6) と反応させることにより達成され、本工程は、前記 Q 法第 Q 1 工程と同様に行なわれる。

【0 4 1 5】

第 R 2 工程は、化合物 (2 3 8) を製造する工程で、不活性溶媒中、化合物 (2 3 7) とアルキルリチウム (好適には、n-ブチルリチウム) を反応させることにより得られる化合物 (2 3 7) の反応性誘導体を、不活性溶媒中、化合物 (1 6 4) と反応させることにより達成され、本反応は、前記 Q 法第 Q 2 工程と同様に行われる。

【0416】

第R3工程は、化合物(239)を製造する工程で、不活性溶媒中、添加剤の存在下、化合物(238)を還元剤と反応させることにより達成され、本反応は、前記Q法第Q3工程と同様に行われる。

【0417】

また、この工程で副生する、化合物(239)の11位の置換基が α 配置である化合物を用いることにより、化合物(242)の X^1 が α 配置である化合物を得ることができる。

【0418】

第R4工程は、化合物(240)を製造する工程で、水系溶媒中、化合物(239)を酸と反応させることにより達成され、本反応は、前記Q法第Q7工程と同様に行われる。

【0419】

第R5工程は、化合物(241)を製造する工程で、混合されていてもよい不活性溶媒中、化合物(240)と還元剤を反応させることにより達成され、本反応は、前記Q法第Q8工程と同様に行われる。

【0420】

第R6工程は、化合物(242)を製造する工程で、アルコール系溶媒もしくは不活性溶媒中、化合物(241)の接触還元を行うことにより達成され、本反応は、前記Q法第Q10工程と同様に行われる。

また、破線が、実線と共に、二重結合を形成している場合、この反応に付随して、単結合に変換されることもある。

【0421】

なお、本法において、G上の水酸基は、必要に応じて、任意の工程で、保護反応及び脱保護反応に付することができる。

【0422】

前記A法～R法及びB'法～L'法において、G及び／又はJ及び／又はQ²が、炭素数1～6の直鎖もしくは分岐鎖状の低級アルキル基で保護されているカルボキシ基を含む基である場合、公知の方法で加水分解を行なうことにより、容

易に脱保護され、カルボキシ基を含む基に変換することができる。

【0423】

前記A法～R法及びB'法～L'法の各工程において、保護及び脱保護の必要な基が存在する場合は、各々の基について、当業者に周知の方法で、保護及び脱保護を行うことができる。保護及び脱保護にあたっては、例えば、"Protective Groups in Organic Synthesis 2nd edition", Theodora W. Green, John Wiley & Sons, Inc., 1991等を参照することができる。

【0424】

原料である化合物(1)は、公知か、公知の方法又はそれに類似した方法にしたがって、容易に製造される。[例えば、ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー、第35巻、第11号、第2113頁～第2129頁、1992年：J. Med. Chem. 35(11)、2113-2129(1992)、シンセティック・コミュニケーションズ、第24巻、第16号、第2325頁～第2340頁、1994年：Synth. Commun. 24(16)、2325-2340(1994)、ステロイズ、第60巻、第5号、第414頁～第422頁、1995年：Steroids、60(5)、414～422(1995)等]。

原料である化合物(108)は、公知か、公知の方法又はそれに類似した方法にしたがって、容易に製造される。[例えば、テトラヘドロン・レターズ、第29巻、第13号、第1533頁～第1536頁、1988年：Tetrahedron Letters、29(13)、1533-1536(1988)等。]

原料である化合物(96)は、市販品として容易に入手することができるか、又は、公知の方法又はそれに類似した方法にしたがって、容易に製造される。[例えば、J. Chem. Res. Miniprint, 2, 0650～0669(1986)等。]

原料である化合物(119)及び化合物(144)は、市販品として容易に入手することができる。

原料である化合物(133)～化合物(143)、化合物(183)、化合物(204)、化合物(218)～化合物(220)、化合物(224)、化合物(236)、及び化合物(257)は、市販品として容易に入手することができるか、あるいは、公知か、公知の方法又はそれに類似した方法にしたがって、容易に製造される。

原料である化合物(148)及び(164)は、公知か、公知の方法又はそれに類似した方法にしたがって、容易に製造される。[例えば、ステロイズ、第59巻、第190頁～第195頁、1994年: Steroids、59、190-195(1994)等。

]

原料である化合物(223)は、公知か、公知の方法又はそれに類似した方法にしたがって、容易に製造される。[例えば、シンセティック・コミュニケーションズ、第27巻、第23号、第4035頁～第4040頁、1997年: Synth. Commun. 27(23)、4035-4040(1997)等。]

【0425】

本発明の、一般式(I)で表される化合物、及び、アンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、アゴニストとして作用しない物質(以下、被験物質とも称する。)の抗アンドロゲン活性を始めとする効果は、本発明の、アンタゴニストとして作用することの定義及び／又はアゴニストとして作用しないことの定義に用いたアンドロゲンレセプターレポータージーンアッセイ法と、以下のA測定法～F測定法の測定法とを、必要に応じて適宜組み合わせることによって測定できる:

【0426】

A測定法: ラットでの *in vivo* 実験による測定法

A-1測定法: アンタゴニスト作用の測定法

去勢ラットにテストステロンやジヒドロテストステロンを投与すると前立腺、及び精囊腺重量が増加する。テストステロンやジヒドロテストステロンによる前立腺、及び精囊腺の重量増加作用を被験物質が抑制するか否かを検討することにより、被験物質のアンタゴニスト作用を調べることができる。測定にあたっては

、J. Med. Chem. , 41:623-639, 1998や基礎と臨床、29(4):877-885, 1995等を参考にできる。

A-2測定法：アゴニスト作用の測定法

去勢ラットに被験物質を連続投与する。投与後にアンドロゲン応答性の臓器である前立腺、精嚢腺重量が増加するか否かを検討することにより、被験物質のアゴニスト作用を検討できる。測定にあたっては、日内分泌会誌、66:597-606, 1990等を参考にできる。

【0427】

B測定法：アンドロゲン受容体の二量体形成による測定法

B-1測定法：二量体形成の阻害作用による測定法

ジヒドロテストステロンによりアンドロゲン受容体の二量体が形成される。アンドロゲン受容体の二量体形成を被験物質が阻害するか否かをゲルシフトアッセイで測定することにより、被験物質のアнтаゴニスト作用を検討できる。測定にあたっては、J. Biol. Chem. , 268:19004-19012, 1993、J. Biol. Chem. , 270:19998-20003, 1995等を参考にできる。

B-2測定法：アンドロゲン受容体の二量体形成の促進作用による測定法

被験物質がアンドロゲン受容体の二量体形成を促進するか否かをゲルシフトアッセイで測定することにより被験物質のアゴニスト作用を検討できる。測定にあたっては、J. Biol. Chem. , 268:19004-19012, 1993、J. Biol. Chem. , 270:19998-20003, 1995等を参考にできる。

【0428】

C測定法：オルニチンデカルボキシラーゼ (Ornithine Decarboxylase: ODC) 活性による測定法

被験物質が、アンドロゲン依存性活性を示すとされているODC活性を上昇させるのか減少させるのかを測定することにより、被験物質のアゴニスト、アンタゴニスト作用を検討できる。測定にあたっては、Anal. Biochem. , 113:352-355, 1981、日内分泌会誌、66:597-606, 1

990等を参考にできる。

【0429】

D測定法：アンドロゲン受容体に対する結合能による測定法

アンドロゲン受容体とアンドロゲンとの結合を被験物質が阻害するの可否かを、バインディングアッセイ (Binding Assay) で検討することにより、被験物質のアンタゴニスト作用を検討できる。測定にあたっては、Urology, 48:157-163, 1996、J. Biol. Chem., 270:19998-20003, 1995、基礎と臨床、29(4):877-885, 1995等を参考にできる。

【0430】

E測定法：アンドロゲン受容体量の増減による測定法

アンドロゲン受容体発現細胞に、アンドロゲン存在下及び非存在下で被験物質を処理した場合の細胞内アンドロゲン受容体量の増減を調べることにより、被験物質のアンドロゲン受容体に対するアゴニスト作用、及びアンタゴニスト作用を検討できる。測定にあたっては、Endocrinology, 129:2000, 2010, 1991等を参考にできる。

【0431】

F測定法：アンドロゲン受容体の核内移行による測定法

アンドロゲン受容体発現細胞に対して、アンドロゲンの存在下又は非存在下において、被験物質を処理する事により、細胞内のアンドロゲン受容体の局在を免疫組織染色により調べることで、アンドロゲン受容体の核内移行性の有無や、被験物質によるアンドロゲン受容体の核内移行に対する阻害作用を調べることができ、被験物質のアゴニスト、及び／又はアンタゴニストとしての作用を検討できる。測定にあたっては、J. Biol. Chem., 267:968-974, 1992等を参考にできる。

【0432】

本発明の一般式 (I) で表される化合物、及び本発明のアンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、かつアゴニストとして作用しない物質は、長期投与によるアンドロゲン抵抗性の発現、及び／又は肝毒性などの副作用を示

さない抗アンドロゲン剤となることが期待され、医薬組成物、例えば、前立腺癌、前立腺肥大症、男性型脱毛症、性的早熟、尋常性座瘡、脂漏症、及び多毛症等の疾患の治療剤として有用となることが期待される。また、本発明の一般式（I）で表される化合物、及び本発明のアンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、かつアゴニストとして作用しない物質を、予め投与しておけば、前立腺癌、前立腺肥大症、男性型脱毛症、性的早熟、尋常性座瘡、脂漏症、及び多毛症等の疾患の発症を防ぐか遅延させることが期待できるので、これらの疾患の予防剤となることも期待できる。

【0433】

本発明の一般式（I）で表される化合物を有効成分とする医薬組成物、及び本発明のアンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、かつアゴニストとして作用しない物質を有効成分とする医薬組成物は、経口的に又は非経口的に投与することができるが、経口的に投与するのが望ましい。投与に関しては投与方法に適した製剤に調製することができる。

本発明の一般式（I）で表される化合物を有効成分とする医薬組成物、及び本発明のアンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、かつアゴニストとして作用しない物質を有効成分とする医薬組成物は、通常の製剤化技術を用いて製剤化することができ、その用途に応じて錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤、シロップ剤、注射剤、軟膏剤などの固体及び液体の製剤として使用することができる。製剤用の担体や賦形剤としては、固体又は液体状の物質が挙げられる。これらの例としては、乳糖、ステアリン酸マグネシウム、スターチ、タルク、ゼラチン、寒天、ペクチン、アラビアゴム、オリーブ油、ごま油、エチレングリコール等やその他、常用のものが例示される。

【0434】

かかる製剤中の、本発明の一般式（I）で表される化合物を有効成分とする医薬組成物、及び本発明のアンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、かつアゴニストとして作用しない物質の含有量は、その剤型によって異なるが、一般に5～100重量%の濃度で含有していることが望ましい。本発明の一般式（I）で表される化合物を有効成分とする医薬組成物、及び本発明のアンド

ロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、かつアゴニストとして作用しない物質の医薬組成物は、対象とする人間をはじめとする温血動物の種類、症状の軽重、医師の診断などに応じて、広範囲に変えることができるが、一般に有効成分として、1日あたり $1\mu\text{g}\sim 500\text{mg}/\text{kg}$ 、好ましくは1日あたり $20\mu\text{g}\sim 100\text{mg}/\text{kg}$ である。また、上記投与量は1日～1ヶ月当たり1回又は数回に、まとめて又は分けて投与することができ、症状の軽重、医師の判断により適宜変更することができる。

【0435】

【実施例】

実施例1 フルタミド、ピカルタミドのアゴニスト作用の検討

トランスフェクションの24時間前に、 1.0×10^5 個のHeLa細胞を12ウェルのマイクロプレート中でphenol red free DMEM/5%DCC-FBSで培養する。 $500\text{ng}/\text{well}$ のMMTV-Lucベクターと $100\text{ng}/\text{well}$ のpSG5-hAR、 $5\text{ng}/\text{well}$ のRenilla LucvectorをHeLa細胞にトランスフェクションする。トランスフェクションはphenol red free DMEM培養液中で $3\mu\text{L}/\text{well}$ のリポフェクトアミンを用いて行う。トランスフェクションの9時間後に培養液を、それぞれ $10\mu\text{mol}/\text{L}$ のヒドロキシフルタミド又はピカルタミドを含むphenol red free DMEM/3%DCC-FBSに交換する。培養液交換の48時間後に転写活性値を測定する。転写活性はDual-Luciferase Reporter Assay Systemで測定する。(転写活性値) = (ホタルルシフェラーゼの値) / (ウミシイタケルシフェラーゼの値) とする。ヒドロキシフルタミド及びピカルタミドは無添加値の5倍以上の値を示し、ヒドロキシフルタミド及びピカルタミドのアゴニスト作用が確認された(表1)。

【0436】

【表1】

<表1>

ルシフェラーゼ活性 (Fold induction) ¹⁾	
無添加	1.00
10 $\mu\text{mol/L}$ ハイドロキシフルタミド	7.84 (>5.0)
10 $\mu\text{mol/L}$ ビカルタミド	7.62 (>5.0)

1) 無添加のルシフェラーゼ活性値を 1.00 にした時の値

【0437】

実施例2 フルタミド、ビカルタミドのアンタゴニスト作用の検討

トランスフェクションの24時間前に、 1.0×10^5 個のHeLa細胞を12ウェルのマイクロプレート中でphenol red free DMEM/5%DCC-FBSで培養する。500ng/wellのMMTV-Lucベクターと100ng/wellのpSG5-hAR、5ng/wellのRenilla LucvectorをHeLa細胞にトランスフェクションする。トランスフェクションはphenol red free DMEM培養液中で3 μL /wellのリポフェタトアミンを用いて行う。トランスフェクションの9時間後に培養液を、0.1nmol/LのDHT、1.0 $\mu\text{mol/L}$ のハイドロキシフルタミド又はビカルタミドを含むphenol red free DMEM/3%DCC-FBSに交換する。培養液交換の48時間後に転写活性値を測定する。転写活性はDual-Luciferase Reporter Assay Systemを用いて行う。(転写活性値) = (ホタルルシフェラーゼの値) / (ウミシイタケルシフェラーゼの値) と定義する。ハイドロキシフルタミド及びビカルタミドはDHTの転写活性値を50%以下に減少させ、ハイドロキシフルタミド及びビカルタミドのアンタゴニスト作用が確認された(表2)

【0438】

【表 2】

< 表 2 >

ルシフェラーゼ活性 (Relative activity) ²⁾	
0.1 nmol/L DHT	100
1.0 μ mol/L ハイドロキシフルタミド	29.0 (< 50.0)
1.0 μ mol/L ビカルタミド	32.0 (< 50.0)

2) 0.1 nmol/L の D H T のルシフェラーゼ活性値を 100 にした時の値

【0 4 3 9】

【発明の効果】


本発明の一般式 (I) で表される化合物、及び本発明のアンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、かつアゴニストとして作用しない物質は、長期投与によるアンドロゲン抵抗性の発現、及び／又は肝毒性などの副作用を示さない抗アンドロゲン剤となることが期待され、医薬組成物、例えば、前立腺癌、前立腺肥大症、男性型脱毛症、性的早熟、尋常性座瘡、脂漏症、及び多毛症等の疾患の治療剤として有用となることが期待される。また、本発明の一般式 (I) で表される化合物、及び本発明のアンドロゲン受容体に対し、アンタゴニストとして作用し、かつアゴニストとして作用しない物質を、予め投与しておけば、前立腺癌、前立腺肥大症、男性型脱毛症、性的早熟、尋常性座瘡、脂漏症、及び多毛症等の疾患の発症を防ぐか遅延させることが期待できるので、これらの疾患の予防剤となることも期待できる。

【書類名】 要約書


【要約】

【課題】 長期投与によるアンドロジェン抵抗性の発現、及び／又は肝毒性などの副作用を示さない抗アンドロジェン剤と期待される化合物、及び／又は物質を提供すること。

【解決手段】 一般式 (I)



【式中、X¹ 及び X² は、独立して水素原子、又は一般式 (II)



で表される基を示し、R^a は、水素原子又は水酸基の保護基を示し、R^b 及び R^c は、それらが結合している 3 位の炭素原子と一緒に、保護されていてもよい $-(C=O)-$ を示し、破線は、実線と共に、単結合又は二重結合を形成していることを示す。

更に、Ar は、単結合又は芳香族炭化水素基を示し、A は、メチレン基又は $-O-$ を示し、R¹ は、置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいアルケニル基、又は置換されていてもよいアルキニル基を示す。

ただし、X¹ 及び X² は、同時に水素原子であることはない。]

で表される化合物又はその薬学上許容しうる塩あるいはそれらのプロドラッグ。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	平成11年 特許願 第338334号
受付番号	29920100025
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成11年12月14日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】	申請人
【識別番号】	000003311
【住所又は居所】	東京都北区浮間5丁目5番1号
【氏名又は名称】	中外製薬株式会社

特平11-338334

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000003311]

1. 変更年月日	1990年 9月 5日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都北区浮間5丁目5番1号
氏 名	中外製薬株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)